

ENUMERACION
DE LAS
CRYPTOGAMAS DE ESPAÑA Y PORTUGAL,

POR
D. MIGUEL COLMEIRO,

catedrático del Jardín Botánico de Madrid.

PARTE SEGUNDA.

TALOGENAS:

HONGOS, LÍQUENES, COLLEMACEAS, ALGAS.

(Revista de los progresos de las Ciencias, t. 17 y 18.)

MADRID:
POR AGUADO, IMPRESOR DE CÁMARA DE S. M. Y DE SU REAL CASA.
—
1867.

ANNUAL REPORT
OF THE BOARD OF EDUCATION

FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1878.

PUBLIC EDUCATION

TEACHERS.

EXERCISES IN PUBLIC EDUCATION.

STUDY.

EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE STATE.

ENUMERACION

DE LAS

CRIPTOGAMAS DE ESPAÑA Y PORTUGAL.

VII. HONGOS.

AGARICACEAS.

AGARICINEAS.

Agaricus.

A. radiatus Bolt., t. 39, f. c. **A. stercorarius** Bull., t. 68, 342, f. 2.

Hab. España (Colm.) en los estercoleros, May., Oct. (v. v.)
Castilla la Nueva (Colm.)

Aragon (Pardo, Loscos): *Castelserás* (Pardo, Loscos).

Baleares: Menorca (Oleo).

A. ephemerus Bull., t. 542, f. 1. **Fr. A. momen-**
taneus Bull., t. 128. **A. stercorarius** Scop.

Hab. España (Colm., Texid.) y Portugal (Brot.) en los es-
tercoleros. May., Oct. (v. v.)

Cataluña (Colm., Texid.)

Aragon (Pardo, Loscos).

- Galicia* (Colm.)
Castilla la Nueva (Colm.)
Portugal (Brot.)
Baleares (Oleo).
Nomb. vulg. Catal. Bolet de femer (Texid.)
A. ephemerooides Bull., t. 582, f. 1.
Hab. España en Aragon (Pardo, Loscos) en los estercole-
ros. Set., Oct. (n. v.)
A. niveus Pers., *Flor. dan.*, t. 1671.
Hab. España en Aragon cerca de Castelserás (Pardo, Los-
cos) sobre el estiercol de caballo. Ag., Nov. (n. v.)
A. cinereus Bull., t. 88. *Fungus venenatus* VII Quer.
A. fimetarius L. Schaff., t. 100.
Hab. España (Quer., Lag.) y Portugal (Vand.), sobre el
estiercol, la tierra y los troncos de los árboles en varias pro-
vincias. Jul., Oct. (v. v.)
Aragon (Xarne): Villarluengo (Xarne), Tarazona (Ju-
bera.)
Castilla la Nueva (Lag.): Madrid dentro del Jardin Botá-
nico (Lag.)
Valencia (Clem.): Titáguas (Clem.) (*)
Andalucia (Prol.): Málaga (Prol.)
Portugal (Vand.)
-

(*) Los hongos de Titáguas descritos por Clemente ascienden
á unas 140 especies, que consideró como nuevas en su mayor
parte, denominándolas en concepto de tales, y que no son fáciles
de reconocer por las descripciones originales mas ó menos com-
pletas actualmente depositadas en la Biblioteca de la Academia
de Ciencias exactas, físicas y naturales de Madrid. Pocos son los
agáricos que Clemente refirió á las especies conocidas, y llegan á
77 los que tuvo por nuevos; hizo otro tanto respecto de dife-
rentes géneros, siendo 27 las especies presentadas por el mismo
como descritas por primera vez. Resulta por tanto ser 36 sola-
mente los hongos indicados en Titáguas, que puedan admitirse
sin un comparativo examen, bastante largo y penoso, cuyo re-
sultado sería quizá disminuir considerablemente el número de
las especies nuevas aun en la época del descriptor de ellas.

Baleares (Ramis, Weyler): Menorca (Ramis.)

Nomb. vulg. Cast. Hongo de los estercoleros (G. Ort.) *Catal.* Bolet de femer (Palau), Pixacá (Oliver.) *Val.* Fongo de corral (?): *Balear.* Pixacá (Ramis.)

A. pseudo-extinctorius D. C. A. extlectorius Bull., t. 437, f. 1, non L.

Hab. España (Lag.) en los estercoleros y cerca de los árboles. Set., Nov. (v. v.)

Aragon (Jubera): Tarazona (Jubera.)

Castilla la Nueva (Lag.): Madrid entre el Puente de Segovia y el Soto de Migas-Calientes, y dentro del Jardin Botánico (Lag.)

Nomb. vulg. Cast. Hongo matacandelas (G. Ort.?)

A. micaceus Bull., t. 246, 565. A. lignorum Scop., Schæff., t. 66. A. truncorum Scop. Schæff., t. 6. A. Cloacæ Clem.

Hab. España en los prados y huertas cerca de Titáguas, pueblo de Valencia (Clem.) Set., Nov. (n. v.)

A. deliquescens Bull., t. 437, f. 2, t. 558, f. 1.
A. fuscescens Schæff., t. 17. A. aqueus Brot.

Hab. España (Colm.) y Portugal (Brot.), en los prados y huertas. Ag., Oct. (v. v.)

Aragon (Pardo, Loscos.): Castelserás (Pardo, Loscos).

Castilla la Nueva (Colm.)

Portugal (Brot.): cercanías de Coimbra (Brot.)

Baleares: Menorca (Oleo.)

A. atramentarius Bull., t. 164. A. luridus Bolt., t. 54. A. fimetarius Sow., t. 188. A. deliquescens Flor. dan., t. 1370. A. fugax Schæff., t. 67, 68. Amanita cinerea Lam. Agaricus ovatus. Curt.

Hab. España en Cataluña (Colm.) y Aragon cerca de Castelserás (Pardo, Loscos), al pie de los árboles y en los sitios húmedos. En., Dic. (v. v.)

A. sterquilinus Fr. Mich., t. 80, f. 3.

Hab. España en Aragon cerca de Castelserás (Pardo, Loscos) sobre la boñiga. Set., Oct. (n. v.)

A. comatus Mull. Flor. dan., t. 834. A. fimetarius Bolt., t. 44. Clem. A. porcellaneus Schæff., t. 46-47, Brot.

Hab. España (Asso, Clem.) y Portugal (Brot.), en las huertas y entre los escombros en varias provincias. Set., Oct. (v. v.)

Aragon (Asso).

Castilla la Nueva (Colm.)

Valencia (Clem.): Titáguas (Clem.)

Portugal (Brot.): cercanías de Coimbra (D. Bapt.), Extremadura (Brot.)

Var. β ovatus *Fr.* *Agaricus ovatus* Schäff., t. 7. Brot.
Portugal (Brot.)

A. cylindricus *Fr.* Schäff., t. 8. Brot.

Hab. Portugal cerca de Coimbra (Brot.), en sitios arenosos y húmedos. Oct., Nov. (n. v.)

A. digitaliformis Bull., t. 22, 225, f. 1. *A. congregatus* Bull., t. 94? *A. pallescens* Schäff. Brot.

Hab. España en Cataluña cerca de Barcelona y Gerona (Texid.), y Portugal cerca de Coimbra (Brot.), sobre los troncos y raíces de los sauces y álamos. Set., Marz. (n. v.)

Nombr. vulg. Catal. Pitjol? Bolet de pila (?).

A. striatus Bull., t. 552, f. 2. *A. plicatus* Schäff., t. 31.

Hab. España en Aragón? (Pardo, Loscos), sobre la tierra en los bosques y prados. Oct.? (n. v.)

A. fimicola *Fr.* Buxb. cent. IV, t. 28, f. 4.

Hab. España en Aragón cerca de Castelserás (Pardo, Loscos) en las huertas y praderas. Oct. (n. v.)

A. fimiputris Bull., t. 66. *A. clypeatus* Bull., t. 57.

Hab. España en Cataluña (Texid.) y Aragón (Xarne) sobre la boñiga y el estiercol de caballo. Set., Oct. (n. v.)

A. separatus L. *A. nitens* Bull., t. 84. *A. semiovalus* Sow., t. 131.

Hab. España en Aragón (Xarne) Santander (Salcedo) y Portugal (Vand.) sobre la boñiga en los prados y bosques. Ag. (n. v.)

A. stercorarius Fr. A. adnatus Huds.

Hab. España en Cataluña (Texid.) y Aragon cerca de Castelserás (Pardo, Loscos), sobre el estiercol y la boñiga en los sitios húmedos y selvosos. Ag., Oct. (n. v.)

Nombr. vulg. Cat. Bolet de femer (Texid.)

A. præcox Pers. A. æstivus Auct. A. candicans Schæff.
t. 217.

Hab. España en Aragon cerca de Castelserás (Pardo, Loscos), en los campos. May., Jul. (n. v.)

A. campestris L. Flor. dan., t. 704. Schæff. t. 33.

Fungus esculentus I Quer. A. edulis Bull., t. 134, 514. A. arvensis Schæff. Brot. Clem.

Hab. España (Lagun., Quer.) y Portugal (D. Bapt.), en los campos y bosques de todas las provincias. Ag., Oct. (v. v.)

Cataluña (Quer.)

Aragon (Asso, Jubera): Tarazona (Jubera.)

Santander (Salcedo.)

Galicia (L. Alonso): Ferrol (L. Alonso), Tuy (R. Bust.)

Castilla la Vieja (Larruga): Avila (Larruga.)

Castilla la Nueva (Lag.): Madrid dentro del Jardin Botánico y cerca del Manzanares (Lag.)

Valencia (Clem.): Titáguas (Clem.), Villafranca del Cid (S. Bened.)

Andalucia (Prol.): cercanías de Málaga (Prol.)

Extremadura (Villaescusa): Alange (Villaescusa.)

Portugal (D. Bapt., Brot.): Coimbra (D. Bapt.)

Baleares (Weyler): Menorca (Ramis, Oleo.)

Nombr. vulg. Cast. Xeta (Lob. de Av.), Hongo (Lagun., Cienf.), Geta (Huerta), Seta (Cienf., Sarm.), Lobito? Seta de arenales y tierras enjutas? Seta de Cañaherla? (Cienf.), Hongo comun ó vulgar (Quer.), Hongo, Hongo de comer ó bueno, Hongo negro, el adulto (Clem.), Hongo comestible (Prol.), Hongo campesino, Seta campesina (G. Ort.). *Port.* Cogumelo, Cugumelo (A. Lus., Lagun., Mont., Brot.), Cocumelo, Cogumelo do campo, Agarico dos campos, Cogumelo das ignarias (Brot.) *Gall.* Pan de Lobo (Sobr.) *Catal.* Bolet (Lagun.), Bolet de

camp., Bolet comú (Bassag.), Camparol (Texid.) *Vat.* Fongo (S. Bened.) *Balear.* Bolet (Ramis), Girgola blanca (Barceló). *Vasc.* Zuzac, Cizac, Susac (Larram.)

Var. γ flavescens Kicks. *Agaricus Georgi Gmel.* España en varias partes (Palau): Aragon en Val de Linares (Asso), y en Villarluengo (Xarne). *Cast.* Cagarrias segun algunos (Asso, Palau.)

A. Loscosii Rabenh.

Hab. España en Aragon cerca de Castelserás al pie del hinojo (Pardo, Loscos.) Oct.? (n. v.)

A. bombycinus Schæff., t. 98. *A. incarnatus* Batsch.
Amanita incarnata Pers.

Hab. España en Galicia cerca de Tuy (R. Bust.), sobre los troncos de los árboles. Ag., Set. (n. v.)

A. variabilis Pers. *Obs.* 2, t. 5, f. 12. *A. sessilis* Bull., t. 152, 581, f. 3. *A. niveus* Jacq. *Flor. austr.*, t. 288.

Hab. España (?) é Islas Baleares, en Menorca (Oleo), sobre los troncos podridos y la tierra. Oct. (n. v.)

A. olearius DC. *Fungus venenatus* V Quer.

Hab. España (Quer.), en Aragon (Pardo, Loscos), sobre las raíces de los olivos y otros árboles. Oct., Marz. (n. v.)

A. involutus Batsch. *A. contiguus* Bull., t. 240, 576, f. 2. *Sow.*, t. 98.

Hab. España (?) é Islas Baleares, en Mallorca (Trias, Camb.) y Menorca (Oleo), sobre la tierra en los bosques. Ag., Nov. (n. v.)

A. tenellus Lag. Stipite albo-fusco, gracili; pileo tenuissimo, superne concaviusculo, margine undulato-crispo, lamellis undulatis. Lag. Ms.

Hab. España en Madrid, dentro del Retiro, entre los escombros (Lag.) Nov., Dic. (n. v.)

A. flavidus Schæff., t. 35. *A. lignatilis* Bull., t. 554, f. 1.

Hab. España en Aragon cerca de Castelserás (Pardo, Loscos), sobre los troncos podridos. Set., Nov. (n. v.)

A. mutabilis Schæff., t. 9. *Fungus esculentus* VIII Quer.

Hab. España (Quer.), sobre los troncos de los árboles. May., Nov. (v. v.)

Var. a caudicinus Fr. *Agaricus caudicinus* Pers. *A. xylophilus* Bull., t. 530, f. 2.

Nombr. vulg. Catal. Cua tendre? Bolet d'arbre ó de soca, Pollancró, Pollaten (?)

A. togularis Bull., t. 595, f. 2.

Hab. España en Aragon cerca de Torrecilla y Castelserás (Pardo, Loscos), sobre la tierra. Ag., Set. (n. v.)

A. mammosus L. *A. decipiens* Pers. non W.

Hab. España en Galicia cerca del Ferrol (L. Alonso), en los prados. Ag., Nov. (n. v.)

A. cinnamomeus L. *Bolt.*, t. 150. *Sow.*, t. 205. *A. croceus* Schæff., t. 3, non Bull. *A. ileopodius* Bull., t. 586, f. inf.

Hab. España en los bosques de Aragon (Xarne), Santander (Salcedo) y en las Islas Baleares (Weyler), particularmente en Menorca (Ramis, Oleo). Jul., Dic. (n. v.)

Nombr. vulg. Balear. Esclatasanch (Ramis.)

A. violaceus L. *A. araneosus violaceus* Bull., t. 250, 598, f. 2, A.

Hab. España en Aragón cerca de Villarluengo (Xarne), y hacia Tarazona (Jubera), en sitios sombríos. Set., Oct. (n. v.)
Nombr. vulg. Cast. Seta de pie azul? (Cienf.)

A. umbrinus Pers. *A. araneosus Bull.*, t. 600.

Hab. España cerca de Madrid, en la Casa de Campo (Lag.) en sitios sombríos. Ag., Oct. (n. v.)

A. Prunulus Pers. *Fungus esculentus III Quer.* *A. albellus Schäff.*, t. 78. *A. Mousseron Bull.*, t. 142. *A. palidus Sow.*, t. 143.

Hab. España en los Pirineos de Cataluña, cerca de Olot, Berga, Bagá (Quer, Lavedan), y en Aragón (Xarne) sobre la tierra, en los bosques. Abr., May. (v. v.)

Nombr. vulg. Cast. Moserñon (Quer, Palau), Mucerón (Barn. padre), Mojardon, Hongo moscado (Bassag.) *Catal.* Mu-xernun (Quer), Muxarnun (Lavedan), Moxernon, Moxarnon, Moxarnó (Bassag.)

A. perpusillus Lumm. *A. applicatus Flor. dan.*, t. 1295, f. 1. *A. cucullatus Brot.*

Hab. España (?) y Portugal (Brot.), sobre los árboles, en las cercanías de Coimbra (Brot.) Set., Dic. (n. v.)

A. stypticus Bull., t. 140, 507, f. 1. *A. betulinus Bolt.*, t. 72, f. 1. *A. flavelliformis Sow.*, t. 109.

Hab. Portugal en la Beira boreal (Brot.), sobre los troncos secos en los bosques. Oct., Dic. (n. v.)

A. ulmarius Bull., t. 510. *Fungus venenatus VI Quer.*

Hab. España (Quer.) sobre los troncos de los olmos, álamos y otros árboles, en Asturias cerca de Oviedo (Pastor, L. P. Ming.) y en otras provincias. Oct., Dic. (n. v.)

Nombr. Vulg. Cast. Hongo de olmo (Cienf.)

A. petaloïdes Bull., t. 226, 557, f. 2.

Hab. España (?) é Islas Baleares en Menorca (Oleo), sobre los troncos de los árboles. Set., Oct. (n. v.)

A. salignus Pers. *Tratt. aest. Schw.*, t. 4, f. 8.

Hab. España (Clem.) sobre los troncos de los sauces y otros árboles en diversas provincias. Oct., En. (n. v.)

Aragon (Pardo, Loscos): Castelserás (Pardo, Loscos).

Valencia (Clem.): Titáguas (Clem.)

A. ostreatus Jacq. *Flor. austr.*, t. 288. *A. dimidiatus Bull.*, t. 508.

Hab. España en Cataluña, cerca de San Juan de las Abadesas, sobre los maderos (Texid.) Ag., Oct. (n. v.)

Nomb. vulg. Catal. Bolet d'orella (?)

A. suffrutescens Brot.

Hab. Portugal sobre los leños húmedos de las despensas, en Coimbra. Oct., Dic. (n. v.)

A. corticalis Bull., t. 519, f. 1. *A. corticola Pers.*

Hab. España en Madrid sobre los árboles del Prado. (Lag.) Oct., Febr. (v. v.)

A. lacteus Pers. *A. nanus Bull.* 563 exclus. *R. S. T. A. papillatus Hoffm.* *Nom.*, t. 3, f. 2.

Hab. España (?) é Islas Baleares, en Menorca (Oleo), sobre la tierra, en los brezales, é igualmente sobre los ramillos y hojas de los pinos. Ag., Nov. (n. v.)

A. galericulatus Schæff., t. 52, *A. fistulosus Bull.*, t. 518 excl. *H. P. A. campanulatus L. A. griseus Lag.* *Ms.?* Stipite cylindrico, fistuloso, basi radicante, hirsuto; pileo orbiculari, subplano, villosa, crenulato, lamellis griseis triplicis seriis. *Lag. Ms.*

Hab. España, en Aragon (Xarne) y en Madrid, dentro del Retiro (Lag.), entre los despojos de los árboles. Dic. (n. v.)

Var. β affinis Lag. Ms. Stipite albo, fistuloso, basi flexuoso, superne striato; pileo campanulato, lamellis griseis,

triplicis ordinis. Lag. Ms. Jardin Botánico de Madrid, entre los rosales, y pegado á trocitos de leña (Lag.) Dic. (n. v.)

A. Hudsoni Pers. *A. pilosus Huds. Sow.*, t. 164.

Hab. España en Aragon? cerca de Chiprana y Castelserás? (Pardo, Loscos) al pie de algunas plantas. Set., Oct. (n. v.)

A. caulinicalis Bull., t. 522, f. 2. *A. stipitarius* *Fr.*

Hab. España en Madrid cerca del río Manzanares (Lag.) y en Aragon cerca de Castelserás (Pardo, Loscos) junto á los estípites de los equisetos muertos. Oct.? (n. v.)

A. Mori Lev.

Hab. España en Aragon cerca de Castelserás (Pardo, Loscos) y Valencia en Tilágua? (Clem.) Oct.? (n. v.)

A. Rotula Scop. *A. androsaceus Bull.*, t. 64, 569, f. 3, non *L. A. nigripes Schrad. Flor. dan.*, t. 1134, f. 1.

Hab. España en Madrid dentro del Jardin Botánico (Lag.) y en Aragon (Xarne) sobre los troncos de los árboles y sus hojas. En., Dic. (v. v.)

A. Vaillantii Fr. *A. nitidus Gunn. Vail.*, t. 11, f. 21—24.

Hab. España en Aragon cerca de Castelserás (Pardo, Loscos) sobre los ramos y hojas caidas. Ag., Set. (n. v.)

A. ramealis Bull., t. 336. *A. candidus Bolt.*, t. 39, f. D. *A. candidus* *Lag. Ms.?* Stipite capillari, incurvo, albido, basi hirto; pileo albo, convexo, margine crenulato, lamellis candidissimis, triplicis seriei. Lag. Ms.

Hab. España en Madrid dentro del Jardin Botánico y Retiro (Lag.), en las grietas de las cortezas de los olmos. Dic. (n. v.)

A. Clavus Bull., t. 148.

Hab. España en Galicia, cerca del Ferrol (L. Alonso), sobre los ramos, hojas y troncos podridos. Ag., Oct. (n. v.)

A. esculentus Wulf. *Jacq. Coll.* 2, t. 14, f. 4. *A. perpendicularis Bull.*, t. 422, f. 2. *A. Clavus Schäff.*, t. 59.

Hab. España en Madrid dentro del Jardin Botánico (Lag.) sobre la tierra. En., Marz. (v. v.)

A. oreades Bolt., t. 151. *A. tortilis* DC. *A. pseudo-mousseron* Bull., t. 144, 528, f. 2. *A. pratensis* Sow., t. 247.

Hab. España en Cataluña (Colm.), principalmente en los Pirineos orientales (Texid.). May., Nov. (v. v.)

Nomb. vulg. Cat. Camaseca (Texid.), Correola (?)

A. pyxidatus Bull., t. 568, f. 2. *A. subhepaticus* Batsch., f. 211.

Hab. España en Aragón cerca de Castelserás (Pardo, Loscos) e Islas Baleares en Menorca (Oleo), sobre la tierra. May., Nov. (n. v.)

A. umbelliferus L. *A. pseudo-androsaceus* Bull., t. 276. *A. niveus* Flor. dan., t. 1015, f. 1. *A. ericetorum* Pers.

Hab. España en Galicia cerca del Ferrol (L. Alonso), y en Aragón (Xarne, Pardo, Loscos), sobre la tierra en los matorrales. May., Nov. (n. v.)

A. cespitosus Bolt., t. 41, f. C.

Hab. España en Aragón cerca de Castelserás (Pardo, Loscos), sobre la tierra, entre los musgos, y en los troncos viejos. Oct., Dic. (n. v.)

A. giganteus Sow., t. 244? *Fungus venenatus* III
Quer.

Hab. España (Quer.). Oct. (n. v.)

A. contortus Bull., t. 36.

Hab. España en Cataluña (Colm., Texid.) en los bosques al pie de los árboles. Oct. (v. v.)

Nomb. vulg. Catal. Alsinellas (Texid.), Alsinens, (?)

A. velutipes Curt. Lond. 4, t. 70. *A. nigripes* Bull., t. 344, 519, f. 2.

Hab. España en Aragón cerca de Castelserás (Pardo, Loscos), sobre la tierra y los troncos de los árboles. Oct., Dic. (n. v.)

A. arcuatus Bull., t. 443, 589, f. 1.

Hab. España en las cercanías de Madrid (Lag.), sobre la tierra. Oct., Nov. (n. v.)

A. laccatus Schæff., t. 13. *A. amethysteus* Bull., t. 570, f. 1.

Hab. España en Extremadura, cerca de Alange (Villaescusa), é Islas Baleares (Barceló), sobre la tierra. Jun., Nov. (n. v.)

Var. a. subcarneus Dub. *Agaricus farinaceus* Bolt., t. 64. *Sow.* t. 208.

A. coccineus Wulf. *A. scarlatinus* Bull., t. 570, f. 2. *A. kermesinus* Flor. dan., t. 715. *Fungus venenatus* VIII Quer?

Hab. España en los Pirineos de Cataluña y en los de Aragón cerca de Jaca? (Quer.) Set., Oct. (n. v.)

A. dentatus L. *A. conicus* Schaff., t. 2, f. 9. *A. croceus* Bull., t. 30, 524, f. 3, et Brot.? *A. aurantiacus* Sow., t. 381.

Hab. España en Madrid dentro del Retiro (Lag.), en Galicia, cerca del Ferrol (L. Alonso), en Andalucía cerca de Osuna (Maldonado), y Portugal en Beira? (Brot.) sobre la tierra en las praderas. Set., Oct. (n. v.)

A. Eryngii DC. *Fungus esculentus* II Quer. *A. violaceus* G. Ort. non L.

Hab. España sobre el cuello del Cardo corredor en el circuito de Madrid (Quer., Colm.), en Aragón (Pardo, Loscos), y en Valencia cerca de Titaguas (Clem.) Set., Oct. (v. v.)

Nomb. vulg. Cast. Seta de cardo (Cienf., Quer, Palau), Seta de cardo corredor (Barn. padre), Chirigolas (Pardo, Loscos). *Val.* Bresquilles (?), Presquillas (S. Bened.) *Balear.* Girgola de cart (Barceló).

A piperatus Scop. *Bolt.*, t. 21. *A. acris* Bull., t. 200 non *Bolt.* *A. amarus* Schæff., t. 83.

Hab. España (Xarne) y Portugal (?) en los bosques. Oct., Nov. (v. v.)

Cataluña (Colm.): Gerona (Texid.)

Aragon (Xarne): Villarluengo (Xarne.)

Santander (Salcedo.)

Valencia (S. Bened.): Villafranca del Cid (S. Bened.), Peñagolosa (?).

Baleares (Weyler): Menorca (Ramis, Oleo.)

Nombr. vulg. Cast. Hongo pimentero (Barn. padre.) *Catal.* Pebrás, Pebrero, Pebrot (?), Farinera? Escaldabechs, Tarrandós, Terrandós (Texid.) *Val.* Pebrasa, Girgola (S. Bened.) *Balear.* Girgol (Ram.), Esclatasanch de llet (Barceló).

A. zonarius Bull., t. 104. *A. flexuosus* Pers. *A. flexuosus* β Fr.

Hab. España en Cataluña (Colm.), sobre la tierra en los bosques. Jul., Oct. (v. v.)

Nombr. vulg. Catal. Cabras, Bolet de cabra? (Texid.)

A. subdulcis Pers. *A. dulcis* Bull., t. 224. *A. B. A. lactifluus* Bolt., t. 3.

Hab. España en Cataluña (Colm.) y Santander (Salcedo) sobre la tierra en los bosques. Agost., Oct. (v. v.)

Nomb. vulg. Catal. Llaterolas? (Texid.), Lleterolas blancas y vermellos (?).

A. deliciosus L. *Fungus esculentus* VII Quer. *A. zonarius* Bolt., t. 141. *A carneus* Clem.?

Hab. España (Huerta, Quer.) y Portugal (Vand.) sobre la tierra en los pinares de varias provincias. Jul., Nov. (v. v.)

Cataluña (Colm., Texid.)

Aragon (Xarne, Pardo, Loscos): Villarluengo (Xarne.)

Castilla la Nueva (Huerta): Escalona (Huerta), Alcarria (Clem.)

Valencia (Clem.): Titaguas (Clem.), Peñagolosa (?), Villafranca del Cid (S. Bened.)

Var. β albidus Clem. Titaguas (Clem.)

Var. γ crocatus Clem. Titaguas (Clem.)

Nomb. vulg. Cast. Mizcalo (Huerta), Niscalo (Lavedan), Misco (Clem.). *Port.* Mizcarro? (Lagun.), Miscares? (Mont.). *Catal.* Rovellon (Lavedan), Rovello (Texid.), Rovellonina ó Vinatell, el avinado, Rovellón groch ó Vinatell groch, el amarillo. *Val.* Revelló, Rovelló, Revellon, Rovellon (Clem.), Re-

bollon blanco (Clem.), la var. *albida*, Rebollon del rodeno ó Rodenal, Misclo de Aragon (Clem.), la var. *crocata*.

A. acris Bolt., t. 60, non Bull. *Fungus venenatus* II Quer. **A. deliciosus** var. Batsch, Cont. I, f. 68.

Hab. España en Extremadura cerca de Alange (Villaescusa), sobre la tierra en los bosques y sitios sombríos. Ag., Nov. (n. v.)

A. necator Bull., t. 14. *Fungus venenatus* I Quer.

Hab. España (Quer.), en los bosques y sitios sombríos. Ag., Oct. (n. v.)

A. torminosus Schæff., t. 12. **A. piperatus** L. **A. necator** Bull., t. 529, f. 1.

Hab. España (?) é Islas Baleares en Mallorca (Trias, Camb.) y Menorca (Oleo). Jul., Oct. (n. v.)

A. furcatus Pers. **A. bifidus** Bull., t. 26.

Var. β *heterophyllus* Fr. **A. pectinaceus** α Bull., t. 509, f. L. M. N. **A. lacteus**, *virescens et lividus* Pers. Cataluña (Colm.) Nomb. vulg. Catal. Verderol (?)

A. ruber DC. **A. sanguineus** Bull., t. 42. **Amanita rubra** Lam.

Hab. España en Aragon cerca de Villarluengo (Xarne), y Portugal (Vand.), en Alentejo y Beira (Brot.), en los bosques. Jul., Set. (n. v.)

Nomb. vulg. Catal. Bolet vermall (?)

A. pectinaceus DC. excl. var. α **A. integer** Bolt., t. 1. **A. emeticus** Fr.

Hab. España en Aragon (Xarne) é Islas Baleares en Menorca (Oleo), sobre la tierra en los bosques. Ag., Oct. (n. v.)

A. alutaceus Pers. **A. campanulatus**, *griseus*, *cæruleus*, *olivaceus*, *ochraceus* Pers.

Hab. España en Cataluña (Colm.) sobre la tierra en los bosques sombríos. Ag., Oct. (v. v.)

Nomb. vulg. Catal. Cualbras blancas, negras y vermellas? (Texid.); Cuagras blancas, negras y vermellas? Puagras blancas, negras y vermellas? Lloras blancas, negras y vermellas? Llorell? Palomins, las blancas (?), Criambres blancas, pardas

y coloradas? (Martorel), Crueldas ó Cruellas blancas, róseas y de color sanguíneo? (Pardo, Loscos).

A. nudus Bull., t. 439.

Hab. España en Madrid dentro del Retiro (Lag.) sobre la tierra. Oct., Nov. (n. v.)

A. bulbosus Huds. *non Sow. Pers. nec Bull.* **A. violaceus Vill. Flor. dan., t. 1133.** **A personatus Fr.** **A. bicolor Pers.**

Hab. España en Asturias cerca de Oviedo (Pastor, L. P. Ming.) sobre la tierra en las huertas y sitios sombríos. Oct., Nov. (n. v.)

A. leucocephalus Bull., t. 428, f. 1. **A. albus Pers.**
A. Columbetta Fr.

Hab. España en Cataluña y las cercanías de Madrid (Colm.) é Islas Baleares en Menorca (Oleo) en los bosques. Oct., Nov. (v. v.)

Nomb. vulg. Catal. Cul gros? Cogoma? (?)

A. equestris L. **A. luteus Batsch.** **A. aureus Schäff., t. 41.** **A. flavo-virens Pers.**

Hab. España (Xarne) sobre la tierra en los bosques de varias provincias. Set., Dic. (n. v.)

Aragon (Xarne): Villarluengo (Xarne).

Santander (Salcedo.)

Baleares: Menorca (Ramis, Oleo).

Nomb. vulg. Balear. Camaseca (Ramis).

A. pustulatus Pers.

Hab. España (Lavedan, Xarne) sobre la tierra en los bosques. Oct., Nov. (n. v.)

Nomb. vulg. Cast. Tetas (Laved.)

A. pilulæformis Bull., t. 112. Fungus venenatus IX

Quer.

Hab. España (Quer.) y Portugal (Brot.) al pie de los árbo-

les entre los musgos en los campos, selvas y huertas. Oct., Nov. (n. v.)

A. cristatus Bolt., t. 7. *A. subantiquatus* Bastch. *A. colubrinus* γ Pers. Mich., t. 78, f. 7, 8.

Hab. España en Aragón cerca de Castelserás (Pardo, Loscos), sobre la tierra en los montes. Set., Nov. (n. v.)

A. procerus Scop. *Brot. Schæff.*, t. 22, 23. *A. colubrinus* Bull., t. 78, 583. *A. extinctorius* L. Fr.

Hab. España en Cataluña (Colm.) y Portugal (A. Lus., Brot.), sobre la tierra en los bosques y huertas. Set., Nov. (v. v.)

Nomb. vulg. Cast. Hongo matacandelas (G. Ort.), Agárico apagador (Palau), Parasol, Cogumelo, Cogomelo (Roques), *Port.* Tortulho, Turtulho (A. Lus., Brot.), Capão dos pobres. (Brot.) *Catal.* Camaseca de algunos? Cugumellas (Texid.)

A. muscarius L. *Schæff.*, t. 27, 28. *A. pseudo-aurantiacus* Bull., t. 122. *Amanita muscaria* Pers.

Hab. España (Salcedo, Colm.) y Portugal (Vand.) sobre la tierra en los bosques. Ag., Oct. (v. v.)

Cataluña (Colm.)

Aragon (Lletget, Pardo, Loscos.)

Santander (Salcedo.)

Portugal (Vand.)

A. cæsareus Schæff., t. 258. *A. aurantiacus* Bull., t. 120. *Amanita aurantiaca* Pers.

Hab. España (Lag., Colm.), sobre la tierra en los bosques de varias provincias. Jul., Oct. (v. v.)

Cataluña (Colm.): Vallés (Colm.), Gerona (Texid.)

Castilla la Nueva? (Lag.)

Nomb. vulg. Catal. Auriola, Reits (Texid.), Reig (?) Ous de Reig, antes de su salida de la volva, ó Rovell d'ou (Texid.)

A. vaginatus Bull. t. 98, 512. *Amanita vaginata et involuta* Lam.

Hab. España en Cataluña (Colm., Texid.) sobre la tierra en las márgenes de los pinares. Otoñ., Primav. (v. v.)

Nomb. vulg. Catal. Pantinella? Pimpinella (Texid.)

A. phalloides Bull., t. 2, 577. *A. bulbosus et verrucosus* DC. *A. vernalis* Bolt., t. 48. *Amanita venenata* Pers. *Amanita venenosa* Clem.

Hab. España (Clem.) en los bosques y sitios sombríos sobre la tierra en diversas provincias. Jul., Oct. (n. v.)

Valencia (Clem.): Titáguas (Clem.)

Extremadura (Villaescusa): cercanías de Alange (Villaescusa).

Baleares: Mallorca (Barceló).

A. verna Bull., t. 108. *Amanita verna* Pers. *Fungus venenatus* IV Quer.

Hab. España (Quer) en Aragón, entre los pinos de Monroyo y Peñaroya (Pardo, Loscos), é Islas Baleares (Barceló) sobre la tierra en los bosques. Prim., Veran. (n. v.)

Nomb. vulg. Cast. Cogomasa (Pardo, Loscos).

Cantharellus.

C. lăevis Fr. *Telephora muscigena* Pers. *T. vulgaris* Pers., t. 7, f. 6.

Hab. España en Valencia cerca de Titáguas (Clem.) entre los musgos. Set., Nov. (n. v.)

C. cibarius Fr. *Fungus esculentus* V et VI Quer. *Agaricus cantharellus* L. Schäff. t. 82. Bull. t. 62, 505, f. 1. *Merulius cantharellus* Pers.

Hab. España (Quer, Xarne) é Islas Baleares (Barceló) sobre la tierra en los bosques de varias provincias. Ag., Nov. (v. v.)

Cataluña (Colm., Texid.)

Aragón (Xarne): Villarluengo (Xarne).

Nomb. vulg. Catal. Rosiñol, Rusiñol (Texid.), Pa y carn (?), Cresta de gall (?) Cabrillo (Roques), Cabrid ó Cabrito? (Martorel). *Balear.* Oreyanes, Oreya de llebra (Barceló).

C. aurantiacus Fr. *Agaricus aurantiacus* Wulf. in Jacq. Misc. 2, t. 14, f. 3. *Merulius aurantiacus* Pers.

Hab. España en Madrid dentro del Retiro sobre la madera de las norias (Lag.), si no es otro parecido. Dic. (n. v.)

Nomb. vulg. Balear. Pixacá (Barceló).

Schizophyllum.

S. commune Fr. *Agaricus alneus* L. Schæff. t. 246, f. 1. Bull. t. 346, 581, f. 1. A. *multifidus* Batsch.

Hab. España (Cav., Lag.) y Portugal (Brot.) sobre los troncos de los árboles en diversas provincias. Inv., Prim. (v. v.)

Cataluña (Cav., Pourr.): Barcelona (Cav.), Montagut (Pourr.)

Aragon (Pardo, Loscos): Castelserás, Torrecilla (Pardo, Loscos).

Castilla la Nueva (Lag.): Madrid dentro del Jardin Botánico (Lag.)

Valencia (Clem.): Titáguas (Clem.)

Murcia (Herb. Madr.)

Andalucía (Clem.): cercanías de Córdoba, Sierra del Valle cerca de Jerez de la Frontera (Clem.)

Portugal (Brot.)

Baleares: Mallorca (Trias, Camb.), Menorca (Oleo).

POLIPOREAS.

Boletus.

B. luteus L. Schæff. t. 114. *B. annularis* Bull. t. 332.

Hab. España (Xarne, Pastor) sobre la tierra en los bosques de varias provincias. Oct., Nov. (n. v.)

Aragon (Xarne): Villarluengo (Xarne), Torrecilla, Castelserás (Pardo, Loscos).

Asturias (Pastor).

Portugal (Brot.)

Baleares: Menorca (Oleo).

Nomb. vulg. Catal. Estaperol (?), Bolet de bestiá (Pardo, Loscos).

B. luridus Schæff., t. 107. *B. rubeolarius* Bull. t. 100, 490. *B. tuberosus* Schrad.

Hab. España en Cataluña (Colm.) sobre la tierra en los bosques. Ag., Nov. (n. v.)

Nomb. vulg. Catal. Mata-parens (?)—Este nombre, ó sea el de Mata-parientes, aplicable á los boletos venenosos, se da en Titáguas, pueblo de Valencia, á los agáricos fugaces, y principalmente á los Coprinos, segun Clemente.

B. edulis Bull., t. 60, 494. *B. bovinus* Gmel. non L. *B. esculentus* Pers.

Hab. España (Asso) y Portugal (D. Bapt.) sobre la tierra en los bosques de varias provincias. Ag., Nov. (v. v.)

Aragon (Asso): cercanías de Linares (Asso).

Cataluña (Colm.)

Asturias (Pastor): Oviedo (L. P. Ming.)

Galicia (L. Alonso): cercanías del Ferrol (L. Alonso), Tuy (R. Bust.)

Portugal (D. Bapt.): Coimbra (D. Bapt.)

Nomb. vulg. Catal. Cigró, Raurich (?)

B. æreus Bull., t. 385.

Hab. España en Cataluña cerca de Mataró (Colm., Texid.) sobre la tierra en los bosques. Set., Nov. (v. v.)

Nomb. vulg. Catal. Cigró? Pinatell, Mollaró, Multarich (?), Ubarell (Texid.)

B. cyanescens Bull., t. 363. *B. constrictus* Pers.

Hab. España en Cataluña (Colm., Texid.) sobre la tierra en los bosques. Ag., Nov. (v. v.)

Nomb. vulg. Catal. Mata-parens (Texid.)

B. capricida Clem.

Hab. España en Titáguas, pueblo de Valencia (Clem.) Otoño? (n. v.)

Nomb. vulg. Cast. Matacabras amarillo, Matacabras (Clem.)

Polyporus.

P. perennis Fr. *Boletus perennis* L. Flor. Dan. t. 1075, f. 1. *B. coriaceus* Schaff. t. 125. Bull. t. 28, 449, f. 2.

Hab. España (L. Alonso, Pastor) sobre la tierra y los troncos viejos en diversas provincias. Oct., Nov. (v. v.)

Aragon (Pardo, Loscos).

Asturias (Pastor).

Galicia (L. Alonso, Colm.)

Portugal (Vand.)

Nomb. vulg. Port. Cucumello, Cucumellus (Vand.) *Catal.* Esca falsa, Esca de soca morta (Texid.), nombres aplicables á diversas especies.

P. rufescens Fr. *Sistotrema rufescens* Pers. *Ic. pict.* t. 6.

Var. β biennis Dub. *Boletus biennis* Bull. t. 449, f. 1. España y Portugal (?) sobre la tierra. Oct., Nov. (n. v.)

P. lucidus Fr. *Boletus lucidus* Leyss. *Sow. t. 134.* *B. laccatus* Timm. *Polyporus laccatus* Pers. *Boletus obliquatus* Bull. t. 459. *Boletus verniceus* Brot.

Hab. España sobre los troncos de los árboles en los Pirineos orientales (Texid.) y Portugal en Tras-os-Montes (Brot.) é islas Baleares en Mallorca (Trias, Camb.) Veran. (n. v.)

Nomb. vulg. Port. Miscaro rabudo (Brot.)

P. frondosus Pers. *Boletus frondosus* Schranck. *Flor. dan. t. 952.* *Barr. t. 1272.*

Hab. España en Cataluña (Texid.) sobre las encinas. Otoñ. (n. v.)

P. imbricatus Fr. *Boletus imbricatus* Bull. t. 366.

Hab. España sobre los troncos viejos en Guadalajara (Colecc. Madr.) Oct., Nov. (v. s.)

P. hispidus Fr. *Boletus hispidus* Bull. t. 210, 493. *B. velutinus* Sow. t. 345.

Hab. España sobre los troncos de los árboles, entre ellos la morera, en Moixent (Duf.) y Titaguas (Clem.), pueblos de Valencia. Veran. (n. v.)

P. croceus Fr. *Boletus croceus* Pers.

Hab. España en Cataluña (Texid.) sobre los troncos cariosos de las encinas. Otoñ. (n. v.)

P. suaveolens Fr. *Boletus suaveolens* L. *Sow. t. 228,* non Bull. *Polyporus suberosus* Bolt. t. 162.

Hab. España sobre los troncos de los sauces y álamos, en

Galicia cerca de Tuy (R. Bust.), y en Aragon cerca de Torrecilla y Castelserás (Pardo, Loscos). Otoñ., Inv. (v. v.)

P. populinus Fr.

Hab. España en Cataluña y Galicia cerca de Santiago (Texid.) Otoñ. (n. v.)

P. versicolor Fr. *Boletus versicolor L. Bull. t. 86.*
B. atro-rufus Schæff. *t. 268.*

Hab. España (Asso, Xarne) y Portugal (Brot.) sobre los troncos de los árboles en diversas provincias. Veran., Otoñ. (v. s.)

Aragon (Asso, Xarne): cercanías de Epila (Asso), Villaluengo (Xarne), Castelserás (Pardo, Loscos).

Santander (Salcedo).

Galicia (L. Alonso): Ferrol (L. Alonso).

Valencia (Clem.): Titáguas (Clem.)

Andalucía (Clem., Lag.): Granada (Clem.)

Portugal (Brot.)

Var. β olearum Pers. Cataluña en Gerona (Texid.)

P. Sabinæ. *Boletus Sabinæ Clem.*

Hab. España en Valencia cerca de Titáguas, sobre los ramos del *Juniperus phænicea* (Clem.) Otoñ.? (n. v.)

P. abietinus Fr. *Boletus abietinus Dicks, t. 9, f. 9.* *B. incarnatus Schum. Flor. dan. t. 1298.* *Hydnnum parasiticum Timm.* *Willd. H. decipiens Schrad.*

Hab. España en Santander (Salcedo), y en Andalucía cerca de Córdoba (Clem.) sobre los troncos caídos. Otoñ. (n. v.)

P. cinnabarinus Fr. *Boletus cinnabarinus Jacq. Fl. austr. t. 304.* *B. coccineus Bull. t. 501, f. 1.*

Hab. España en Valgrande de Asturias (Lag.) sobre los troncos y ramos de diferentes árboles. Otoñ. (n. v.)

P. pinicola Fr. *Agaricus I Quer, tab. XXIII?* *Boletus pinicola Sw.* *B. ignarius Fl. dan. t. 953.* *Pers. non L.*

Hab. España sobre los abetos en Cataluña, particularmente en los Pirineos, monte de San Juan del Herm, bosque próximo á Fornols y bosque del Coll de Barata, camino de Barcelona á Manresa (Quer). Perenne (n. v.)

P. fraxineus Fr. *Boletus fraxineus Bull. t. 433, f. 2.*

Hab. España en Asturias cerca de Oviedo (Pastor, L. P. Ming.) sobre los fresnos. Perenne (n. v.)

P. piniperda. *Boletus piniperda Hoffm. et Link, voy. Dendalea?*

Hab. Portugal sobre los abetos en el bosque de Leiria (Link, Voy.) Perenne? (n. v.)

P. fomentarius **Fr.** *Agaricus III Quer. Boletus fomentarius L. Palau, Sow. t. 133. B. unguilatus Bull. t. 491. Tourn. Inst. t. 330. Boletus igniarius Brot. non L.*

Hab. España (Quer) y Portugal (Brot.) sobre las encinas, hayas y otros árboles en diversas provincias. Perenne (v. v.)

Cataluña (Colm., Salvañá): Mataró (Salvañá).

Aragon (Xarne, Pardo, Loscos): Villaruengo (Xarne).

Castilla la Nueva (Quer): Pardo y dehesa de la Alcudia en la Mancha (Quér).

Valencia (Clem.)

Andalucía (Clem.)

Portugal (Brot.)

Baleares (Weyler): Menorca (Oleo).

Var. **β appланatus Pers.** *Boletus appланatus Pers.* Galicia (Texid.)

Nomb. vulg. Cast. Hongo de que se hace yesca (Lagun.), Yesca (Palau), Agárico de encina, Agárico yesquero (M. Jimen.) *Port.* Boleto da isca de coiro (Brot.), Boleto da isca de couro, Agarico dos carvalhos (Figueir.) *Catal.* Bolet d'esca (Bassag.), Esca (Texid.) *Val.* Esca de carrasca (S. Bened.) *Balear.* Esclatasanch? (Serra).

P. nigricans Fr.

Hab. España en Cataluña cerca de Gerona (Texid.) Perenne. (n. v.)

P. igniarius Fr. *Boletus igniarius L. Bull. t. 454. Sow. t. 132. B. obtusus Pers.*

Hab. España (Lag., Clem.) sobre los fresnos, sauces y otros árboles en varias provincias. Perenne. (v. v.)

Aragon (Xarne): Villaruengo (Xarne), Castelserás (Pardo, Loscos).

Castilla la Nueva (Lag.): Madrid dentro del Jardín Botánico (Lag., Colm.)

Valencia (Clem.): Titáguas (Clem.)

Andalucía (Clem.): Juscar, Alcalá de los Gazules (Clem.)

Nomb. vulg. Cast. Geta, Seta en *Granada* (Clem.), Hongo del Negral en *Valencia* (Clem.)

P. torulosus Pers. *Boletus igniarius C. Bull. t. 454.*

Hab. España sobre el pino carrasco en Titáguas, pueblo de Valencia (Clem.), y en Aragón entre Castelserás y Torrecilla, sobre los troncos de los olivos (Pardo, Loscos). Perenne (n. v.)

P. Medulla-panis Fr. *Boletus Medulla-panis Jacq.*

Misc. 1, t. 11. Bolt. t. 166, f. 1.

Hab. España en las cercanías de Barcelona (Cav.) y en Titáguas, pueblo de Valencia (Clem.) sobre los morales. Primav.? (n. v.)

P. vulgaris Fr. *Agaricus IV Quer. Boletus papyraceus Schrank. B. inversus Vill. B. cellulosus Flor. dan. t. 716. f. 1. B. proteus Bolt. t. 166.*

Hab. España sobre los sauces y el espino de majuelas en las inmediaciones del río Manzanares, camino del Pardo (Quer). Todo el año. (n. v.)

P. Cerasi Fr. *Agaricus V Quer, Sistotrema Cerasi Pers. Hydnus Cerasi DC.*

Hab. España en los cerezos y otros árboles de las huertas de Aranjuez (Quer). Veran., Otoñ. (n. v.)

P. gallicus Fr. *Boletus Favus Bull. t. 421. Nees non L.*

Hab. España sobre los troncos de los árboles en las montañas de Santander (Salcedo). Raro. (n. v.)

P. rhombiporus Pers.

Hab. España en Aragón cerca de Torrecilla, Castelserás y Chiprana (Pardo, Loscos) sobre diversas matas. Veran. (n. v.)

Dædalea.

D. maxima Fr. *Boletus maximus Brot.*

Hab. Portugal en las cercanías de Coimbra sobre la tierra en el pinar de Marrocos (Brot.) Otoñ., Inv. (n. v.)

D. unicolor Fr. *Boletus unicolor* Bull. t. 408, 501, f. 3. Bolt. t. 163. Sow. t. 325.

Var. β cinerea Pers. Aragon cerca de Castelserás (Pardo, Loscos) sobre los troncos. Otoñ. (n. v.)

D. pini Fr. *Boletus pini* Brot.

Hab. Portugal sobre los pinos viejos (Brot.) Perenne? (n. v.)

D. sepiaria Sw. *Agaricus sepiarius* Wulf. in Jacq. Coll. A. *hirsutus* Schaeff. t. 76. A. *betulinus* All.

Var. β tricolor Fr. *Agaricus tricolor* Bull. t. 541, f. 2. Jaen? (Lag.) sobre los pinos podridos, y Aragon en los huertos de Codoñera (Pardo, Loscos). Perenne. (n. v.)

D. betulina Rebent. *Agaricus betulinus* L. Sow. t. 182. A. *coriaceus* Bull. t. 537, f. A. F. Bolt. t. 158. Pers. *Dædalea coriacea* Clem.

Hab. España sobre los troncos secos en Santiago de Galicia (Camiña), Santander (Salcedo), Pardo cerca de Madrid (Cav.), Titáguas, pueblo de Valencia (Clem.) Perenne. (n. v.)

D. quercina Pers. *Agaricus quercinus* L. Bolt. t. 73. Sow. t. 181. A. *labyrinthiformis* Bull. t. 352, 442, f. 1. A. *dubius* Schaeff. t. 331.

Hab. España sobre los robles, encinas y otros árboles en Valgrande de Asturias (Lag.), Santander (Salcedo), Galicia (Texid.) y Portugal (Vand.) é islas Baleares en Menorca (Oleo). Perenne. (v. s.)

HIDNEAS.

Hydnium.

H. repandum L. *H. flavidum, rufescens et squamosum* Schaeff. t. 318, 141, 278. *H. carnosum et clandestinum* Batsch. f. 136, 44.

Hab. España en los bosques sobre la tierra en Aragon cerca de San Juan de la Peña (Asso), en Cataluña (Colm.) y en Mallorca (Trias, Camb.) Otoñ. (v. v.)

Nomb. vulg. Catal. Llenguas de bou, Llemanas (?). *Balear.* Picornell (Barceló).

H. pelleum Clem. *H. repandum L. var.?*

Hab. España en Valencia cerca de Titáguas (Clem.) Otoñ. (n. v.)

H. cyatiforme Bull., t. 156. *H. concrescens Pers.*

Hab. España (?) é Islas Baleares (Barceló) sobre la tierra en los bosques. (n. v.)

H. pusillum Brot. *H. gelatinosum Schäff. var.?*

Hab. Portugal en los bosques cerca de Coimbra (Brot.) Otoñ. (n. v.)

H. fraceolens Brot. *H. eleosma Pers.*

Hab. Portugal sobre la tierra en el pinar de Marrocos cerca de Coimbra (Brot.) Otoñ., Inv. (n. v.)

Irpex.**I. fusco-violaceus Fr.** *Agaricus decipiens W. Hydnum fusco-violaceum Fr. Dædalea fusco-violacea Ficin.*

Hab. España en Andalucía cerca de San Roque (Wk.) sobre los pinos piñoneros. Abr. (n. v.)

AURICULARINEAS.**Thelephora.****T. laciniata Pers.** *Fr. Helvella pineti L. H. caryophyllea Bolt.* t. 173. *Auricularia caryophyllea Sow.* t. 213.

Hab. Portugal (Vand., Brot.) sobre los pinos y otros árboles. Otoñ. (n. v.)

T. hirsuta W. *Helvella acaulis Huds. H. villosa Reth. Auricularia reflexa Bull.* t. 274, 483, f. 3, 4. *Sow.* t. 27. *Stereum hirsutum Pers.* *Link.*

Hab. España (Lag.) y Portugal (Brot.) sobre los troncos de los árboles y los maderos en muchas provincias. Persistente. (v. v.)

Aragon (Pardo, Loscos): Castelserás, Peñarroya (Pardo, Loscos).

Asturias (Lag.): Valgrande (Lag.)

Castilla la Nueva (Lag.): Madrid (Lag.)

Andalucia (Clem., Wk.): montes del reino de Sevilla
Clem.), Medina-Sidonia, Arcos (Wk.), Alosno (Colm.)

Portugal (Brot.)

Baleares: Mallorca (Trias, Camb.)

T. rugosa Fr. *Stereum rugosum Pers.*

Hab. España en Andalucía en la Sierra de Palma (Wk.)
sobre los troncos podridos de los alcornoques. Marz. (n. v.)

T. rubiginosa Schrad. *Flor. dan. t. 1619, f. 2. T. ferruginea DC. Sow. t. 26. Auricularia ferruginea Bull. t. 378.*

Hab. Portugal (Brot.) sobre los troncos viejos y secos.
Persistente. (n. v.)

T. purpurea Pers. *Auricularia reflexa Bull. t. 483,*
f. 1-5. A. persistens Sow. t. 383, f. 1.

Hab. España en Aragon cerca de Castelserás (Pardo, Los-
cos) sobre los troncos de los álamos. Otoñ. (n. v.)

T. corticalis DC. *Auricularia corticalis Bull. t. 436.*
f. 1. Telephora carneae Brot.

Hab. Portugal en la Serra de Estrella y en la de Gerez
(Brot.) sobre las cortezas de los árboles. Primav., Otoñ.
(n. v.)

T. cœrulea DC. *T. fimbriata Roth. Byssus phosphoreus*
L. Auricularia phosphorea Sow. t. 383.

Hab. España (Colm.) y Portugal (Vand., Brot.) sobre las
cortezas podridas de los olivos y otros árboles en las cercanías
de Coimbra (Brot.). Inv. (v. v.)

Auricularia.

A. mesenterica Pers. *A. tremelloides Bull. t. 290.*

*Telephora mesenterica Pers. T. tremelloides DC. Phlebia tre-
melloides Fr. Mich. t. 66, f. 4.*

Hab. España sobre los troncos de los árboles (Lag.) y
sobre las latas de los emparrados en Granada (Clem.) Inv.?
(n. v.)

CLAVARIEAS.

Clavaria.

C. pistillaris L. Schæff. t. 169, 170. Bull. t. 244. Sow. t. 277.

Hab. España sobre la tierra en Aragon (Xarne, Pardo, Loscos) en las cercanías de Villarluengo (Xarne). Ag., Nov. (n. v.)

C. rugosa Bull. t. 448, f. 2. **C. coralloides**. Sow. t. 278, f. inf. **C. laciniata** Schæff. t. 291. - Vaill. Bot. t. 8, f. 2. **C. deformis** Brot. non Lam.

Hab. Portugal sobre la tierra en los bosques cerca de Coimbra (Brot.) Otoñ., Ihv. (n. v.)

C. pratensis Pers. **C. fastigiata** Bull. t. 358, f. D. E. An. Linn.? **C. muscoides** Flor. Dan. t. 836, f. 2. Bolt. t. 114 non Linn. nec Bull.

Hab. España (Xarne) entre los musgos y la yerba de los prados en varias provincias. Set., Nov. (n. v.)

Aragon (Xarne): Villarluengo (Xarne), Castelserás (Pardo, Loscos).

Santander (Salcedo).

Asturias (Pastor).

C. cinerea Vill. Bull., t. 354. **C. grisea** Pers.

Hab. España (?) é Islas Baleares (Barceló) sobre la tierra en los bosques. (n. v.)

Nomb. vulg. Balear. Peus de Pata (Barceló).

C. coralloides L. **C. alba** Pers. **C. Holmskoldiana**

Fr. Sow. t. 278, f. sup.

Hab. España (Salv., Xarne) y Portugal (S. Brand.) sobre la tierra en los bosques de muchas provincias. Otoñ. (v. v.)

Cataluña (Salv., Colm.): montes de San Gerónimo del valle de Hebron (Salv.).

Aragon (Xarne): Villarluengo (Xarne).

Santander (Salcedo.)

Valencia (Clem.): Titáguas (Clem.).

Portugal (S. Brand.): Caldas da Rainha (S. Brand.)

Nomb. vulg. Cast. Manecillas (Barnad. padre, Palau), Colflor (Clem.), Pie de raton (Martorel), Patitas de rata (S. Bened.) *Catal.* Potas ó Dits de rata (Barnad. padre), Manetas, Gratapeus, Peus de rata (Bassag.), Dens de rata, Cuxabarbas (Texid.)

C. flava Pers. *C. coralloides lutea* Bull. t. 222, 496, f. L. Schæff. t. 173, 285, 287. *Tourn. Inst.* t. 332. *Barr. ic.* 1260.

Hab. España en Valencia (Clem.) y Cataluña (Colm., Texid.) sobre la tierra en los bosques. Otoñ. (v. v.)

Nombr. vulg. Catal. Cagarrias, Colménicas (Clem.), nombres aplicables más bien á la *Morchella esculenta* Pers. Los de la *Clavaria coralloides* L. convienen igualmente á la *C. flava* Pers.

C. Lauri Brot. *Calocera Lauri Fr.*

Hab. Portugal sobre los laureles cerca de Coimbra y en Caldas da Rainha (Brot.) May., Jul. (n. v.)

TREMELINEAS.

Tremella.

T. mesenterica Retz. *Engl. bot.* t. 709. *T. chrysocoma* Bull. t. 174. *T. auriformis Hoffm.* t. 6, f. 4. *T. expansa* Chevall.-Vaill. *Bot.* t. 14, f. 4. *T. mesenteriformis* Brot.

Hab. España en Castilla (Colm.), y Portugal en Extremadura y Beira (Brot.), sobre las ramas de los árboles. Inv., Primav. (v. v.)

T. albida Huds. *Engl. bot.* t. 2117. *T. candida* Pers. *T. cerebrina* α *alba* DC. *Bull.* t. 386. A.

Hab. España en Castilla la Nueva (Colm.) y Asturias (Pastor) sobre las ramas de los fresnos y otros árboles. Inv., Primav. (v. v.)

Exidia.

E. Auricula Judæ Fr. *Agaricus II Quer. Peziza Auricula L.* Bull. t. 427, f. 2. Engl. bot. t. 2447. *Auricularia Sambuci Pers.*

Hab. España (F. Nav., Quer) y Portugal (Vand.) en muchas provincias, sobre los troncos de los saucos principalmente. Otoñ., Inv. (v. v.)

Aragon (Jubera): Tarazona (Jubera).

Asturias (H. de Greg., Pastor).

Galicia (R. Bust.): Tuy (R. Bust.)

Castilla la Vieja (Quer): monte llamado Arroyo de la Yedra, jurisdicción del Tiemblo, en el partido de Avila (Quer).

Castilla la Nueva (Quer): Aranjuez (Quer, Colm.)

Andalucía (F. Nav.): Cartuja de Granada (F. Nav.), Gibraltar (Talbot.)

Portugal (Vand.)

Nomb. vulg. Catal. Oreja de Judas (F. Nav., Barnad. padre, Palau), Oreja de judía (Quer), Oreja judaica, Hongo de Sauco (Mártrias). *Port.* Orelha de Judas, Cogumelo dos sábados (Brot.)

E. glandulosa Fr. *Tremella glandulosa* Bull. t. 420, f. 1. *T. spiculosus Pers.* *T. arborea Huds.* Dill. *Musc.* t. 10, f. 15.

Hab. España en Castilla la Nueva (Colm.) sobre los troncos y ramos de los árboles. Otoñ., Inv. (v. v.)

LICOPERDACEAS.**FALOIDEAS.****Phallus.**

Ph. impudicus L. Schæff. t. 196-198. Bull. t. 182. Bolt. t. 92. *Phallus foetidus Sow.*, t. 329.

Hab. España (Cienf., Clem.) y Portugal (Brot.) sobre la tierra en los bosques de varias provincias. Veran., Otoñ. (n. v.)

Cataluña (Graells).

Castilla la Nueva (Cienf.): Talavera (Cienf.).

Valencia (Clem.): Titáguas (Clem.).

Extremadura (Cienf.).

Portugal (Brot.): cercanías de Coimbra y en Alentejo (Brot.).

Baleares (Weyler).

Chlathrus.

Ch. cancellatus L. *Boletus III et IV Quer. Bull. t.*

441. *Barr. ic. 1263, 1265.*

Hab. España (Quer, Clem.) y Portugal (Vand., Brot.) sobre la tierra en los setos y bosques de varias provincias. Primav., Otoñ. (v. v.)

Cataluña (Quer): Gerona (Quer), inmediaciones del río Noya hacia Gelida (Texid.).

Aragón (Pardo, Loscos).

Galicia (L. Alonso): Ferrol (L. Alonso), Rubianes (Colm.).

Valencia (Clem.): Titáguas (Clem.).

Andalucía (Clem.): Puerto de Santa María (Clem.).

Portugal (Vand., Brot.): cercanías de Coimbra (Brot.).

Baleares: Mallorca (Trias, Camb.).

TRICOGASTREAS.

Tulostoma.

T. brumale Pers. *Lycoperdon III Quer. Licoperdon pedunculatum L. Bull. t. 294, 271, f. 2.*

Hab. España (Quer) en sitios arenosos de diversas provincias. Inv., Primav. (v. s.)

Aragón (Xarne, Pardo, Loscos).

Castilla la Nueva (Quer): Aranjuez (Quer), inmediaciones de Madrid en la pradera del Manzanares (Cav.)

Valencia (Clem.): Titaguas (Clem.)

T. squamosum Pers. *Lycoperdon squamosum* Gmel.
Mich. t. 97, f. 7.

Hab. Portugal en las cercanías de Coimbra (Brot.) sobre la tierra arenisca. Primav., Otoñ. (n. v.)

Lycoperdon.

L. excipuliforme Scop. Schäff., t. 187, 292. *L. proteus* λ Bull., t. 450, f. 2.

Hab. España cerca de Madrid en el Soto de Migas-calientes (Graells) sobre la tierra. Oct., Nov. (n. v.)

L. pyriforme Bull. t. 32, Schäff., t. 189. *L. proteus* β, γ DC. *Flor. franc.* Bull., t. 435, f. 3, 475, f. N.

Hab. España en Valencia cerca de Titaguas (Clem.) sobre la tierra arenisca y en los troncos podridos. Otoñ. (n. v.)

L. hirtum Bull. t. 340, 475. *L. Bovista* 2. Asso.
Mich. t. 97, f. 1.

Hab. España en Aragón cerca de Tronchon (Asso) é Islas Baleares en Mallorca (Trias, Camb.), sobre la tierra en los bosques. Otoñ. (n. v.)

L. pratense Pers. *Lycoperdon* I Quer. *L. Bovista* G. Ort. Palau non Linn. *L. proteus* a Bull., t. 435, f. 2.

Hab. España (F. Nav., Quer) y Portugal (Brot.) sobre la tierra en las praderas de muchas provincias. Otoñ. (v. v.)

Cataluña (Colm., Texid.): Olot (Texid.)

Castilla la Vieja (F. Nav.): San Ildefonso (F. Nav.), Rioseco (Molina).

Castilla la Nueva (Quer): Madrid en la Casa de Campo, Pardo, Dehesa de la Villa (Quer), praderas del Manzanares (Colm.)

Portugal (Brot.)

Nombr. vulg. Cast. Pedo de lobo (Cienf., Sarm., Palau), Cuesco de lobo, Vejin (G. Ort., Palau), Bejin (S. de Riv.), Huevo de la luna (F. Nav.), Pedo pequeño ó Cuesco pequeño de lobo (Bassag.) *Gall.* Pea de lobo (Sarm.) *Catal.* Pet de llop

(Bassag., Texid.) *Balear.* Esclata-saneh? (Serra), Bufas del dimoni (Barceló).

L. cœlatum Bull. t. 430. *L. Bovista* Pers. *L. geminatum et areolatum* Schæff., t. 189, 190.

Hab. España (Clem., R. Bust.) sobre la tierra en algunos cerros de varias provincias. Otoñ. (n. v.)

Aragon (Pardo, Loscos): Chiprana (Pardo, Loscos).

Galicia (R. Bust.): inmediaciones de Tuy (R. Bust.)

Valencia (Clem.): Titáguas (Clem.)

Nombr. vulg. Cast. Pedo de lobo, Turma *en algunas partes* (Clem.)

L. tinctorium Brot.

Hab. Portugal en Extremadura y otras partes en los matorrales (Brot.) Otoñ.? (n. v.)

Nombr. vulg. Port. Fungão (Brot.)

L. graniluteum Brot.

Hab. Portugal en las cercanías de Coimbra y otras partes en Beira, sobre la tierra estéril y en los matorrales (Brot.) Otoñ., Primav. (n. v.)

Geastrum.

G. hygrometricum Pers. *Lycoperdon stellatum* Bull., t. 238, 471, f. M. N. Schmid. ic. t. 26, f. 27.

Hab. España (Quer, Asso) sobre la tierra arenisca en los bosques de varias provincias. Otoñ. (v. v.)

Cataluña (Salv.): cercanías de Sarrià y selvas de Begás (Salv.), Olot (Texid.)

Aragon (Asso): Orihuela de Albarracín (Asso), Villarluengo (Xarne), Belmonte (Pardo, Loscos).

Castilla la Nueva (Colm.): cercanías de Madrid en el Pardo (Colm.)

Valencia (Clem.): Titáguas (Clem.)

Nombr. vulg. Catal. Pet de llop. (Texid.)

Var. β multifidum Colm. *Geastrum multifidum* W. *Lycoperdon multifidum* Brot. Mich. t. 100, f. 5. Portugal en los bosques de Beira y Extremadura (Brot.) Otoño.

G. rufescens Pers. Schäff. t. 182. *Lycoperdon stellatum* B. Bull., t. 471, f. L. Schmid. ic. 43, 50, f. 1-3.

Hab. España sobre la tierra arenisca en Valencia (Clem.) é islas Baleares en Mallorca (Trias, Camb.) Otoñ. (n. v.)

Nomb. vulg. Balear. Busas del dimoni (Barceló).

G. mammosum Chev. *Lycoperdon corollinum* Batsch Brot. Mich. 100, f. 3.

Hab. Portugal en los bosques de Beira y Extremadura (Brot.) Otoñ. (n. v.)

Bovista.

B. gigantea Nees. *Lycoperdon* II Quer. *Lycoperdon giganteum* Batsch. t. 20, f. 165. *L. Bovista* Bull. t. 447, *L. protéus* Sow., t. 332. Brot.?

Hab. España (Salv., Quer) y Portugal (Vand.) sobre la tierra en las praderas y bosques de todas las provincias. Otoñ. (v. v.)

Cataluña (Salv.): Pirineos (Texid.)

Aragon (Asso): Pago de Pesasens, Tronchon (Asso), Villarluengo (Xarne), Tarazona (Jubera).

Santander (Salcedo): valle de Toranzo (S. Ruiz).

Galicia (L. Alonso): Ferrol (L. Alonso), Tuy (R. de Bust.)

Castilla la Vieja (M. Jimen.): San Ildefonso (M. Jimen.)

Castilla la Nueva (H. de Greg.); Madrid en las praderas del Manzanares (H. de Greg.), Navalcarnero (Negro).

Valencia (Clem.): Titaguas (Clem.), Peñagolosa (?), Portell, Villafranca del Cid (S. Bened.)

Andalucía (H. de Greg., Clem.) Córdoba (H. de Greg.), Grazalema, cerro de San Cristobal (Clem.), Lanjaron (Mérida).

Extremadura (Guijo).

Baleares (Serra, Weyler): Mallorca (Serra).

Portugal (Vand.): Coimbra (D. Bapt.)

Nombr. vulg. Cast. Pedo de lobo (Asso, Palau), Cuesco de lobo, Vegin (Palau), Vejiño (Guijo), Pedo grande ó Cuesco grande de lobo (Bassag.) Port. Fungão (Vand.), Fungam (Mont.), Buffa de lobo, Licopérdo bovino (Brot.) Gall. Pea de

lobo (Sarm.) *Catal.* Pet gros de llop (Texid., Bassag.) *Val.*
Pet de llop, gran (S. Bened.) *Balear.* Esclata-sanch (?), Busas
del dimoni (Barceló).—Llaman tambien Veginas ó Begines en
Cuenca, segun Clemente, á los agáricos fugaces, y principal-
mente á los coprinos.

B. plumbea Pers. *Lycoperdon ardosiaeum* Bull.,
t. 192.

Hab. España (Lag., Clem.) sobre la tierra en los campos
y praderas de diversas provincias. Otoñ. (v. y.)

Aragón (Pardo, Loscos); Chiprana (Pardo, Loscos).

Castilla la Nueva (Lag.): cercanías de Madrid (Lag.), Al-
calá de Henares (Texid.)

Valencia (Clem.): Titáguas (Clem.)

Andalucía (Clem.): Sierra de Baza (Clem.)

Nombr. vulg. Cast. Pedo de lobo (Clem.)

B. nigrescens Pers. *Lycoperdon Bovista* Sow.
t. 331.

Hab. España en Andalucía cerca de San Roque? (Wk.)
Otoñ. (n. v.)

Scleroderma.

S. verrucosum Pers. *Lycoperdon verrucosum* Bull.,
t. 24.

Hab. España (?) sobre la tierra en los bosques de algunas
provincias. Otoñ. (n. v.)

S. pedunculatum Link.

Hab. Portugal (Link) sobre la tierra. Otoñ. (n. v.)

MIXOGASTREAS.

Spumaria.

S. alba DC. *S. Mucilago Pers.* *Reticularia alba* Bull.,
t. 326. Mich. t. 96, f. 2.

Hab. España en Castilla la Nueva sobre los tallos, ramos
y hojas. Veran. (v. v.)

Stemonites.

S. fasciculata Pers. *S. typhina* W. non Pers. *Trichia axifera* Bull., t. 477, f. 1. *Chlathrus nudus* L. Sow., t. 50.

Hab. España en Andalucía cerca de Conil y Tarifa (Clem.) sobre los troncos muertos. Otoñ. (n. v.)

S. typhina Pers. Schæff., t. 297. *S. typhoides* DC. *Trichia typhoides* Bull., t. 477, f. 2. *Embolus pertusus* Batsch. t. 30, f. 176.

Hab. España (?) sobre los troncos de los árboles. Veran., Otoñ. (n. v.)

S. leucopodia DC. *S. leucostyla* Pers. *Trichia leucopodia* Bull., t. 502, f. 2.

Hab. España en Aragón (Pardo, Loscos) sobre los ramos y hojas. Otoñ. (n. v.)

S. ovata Pers. *Mucor Embolus* L.

Hab. España en Málaga (G. de la Leña) y Portugal (Vand.) sobre los ramos descortezados y podridos. Todo el año. (v. v.)

Cibraria.

C. candida Rabenh.

Hab. España en Aragón sobre las hojas de los álamos negros (Pardo, Loscos). Otoñ. (n. v.)

Trichia.

T. clavata Pers.

Hab. España (?) sobre los troncos podridos en los montes de las provincias septentrionales. Veran., Otoñ. (n. v.)

NIDULARIEAS.

Cyathus.

C. striatus Hoffm. *Nidularia striata* Bull., t. 40, f. 1.
Peziza lentifera β L. *P. hirsuta* Schrank. Schäff., t. 178.
Cyathella striata Brot. *Nidularia plumbea* Clem.?

Hab. España en Valencia cerca de Titáguas (Clem.) y Portugal en las cercanías de Coimbra (Brot.) é Islas Baleares (Barceló), sobre la tierra y leños podridos. Ag., Nov. (v. v.)

C. vernicosus DC. *C. Olla* Pers. *C. lævis* Hoffm., t. 8, f. 2, non DC. *Nidularia vernicosa* Bull., t. 40, f. 2, t. 488, f. 1. *Peziza lentifera* L. *Cyathella lævis* Brot.

Hab. España (Lag.) y Portugal (Brot.) sobre la leña en las huertas y sobre la tierra arenisca en varias provincias. Veran., Otoñ. (v. v.)

Cataluña (Colm.): Pirineos orientales (Texid.)

Aragon (Pardo, Loscos): Torrecilla, Castelserás (Pardo, Loscos).

Castilla la Nueva (Lag.): Madrid dentro del Jardin botánico (Lag., Colm.)

Portugal (Vand.): cercanías de Coimbra (D. Bapt., Brot.)

C. crucibulum Hoffm. *C. lævis* DC. non Hoffm. *Nidularia lævis* Bull., t. 40, f. 3, t. 488, f. 2. Schäff., t. 179.

Hab. España en los Pirineos orientales (Texid.) sobre los leños y cortezas muertas. Veran., Otoñ. (n. v.)

C. catiniformis. *Cyathella catiniformis* Brot. *Cyathus crucibulum* Hoffm. var.?

Hab. Portugal en las cercanías de Coimbra, no lejos de la Quinta das sette fontes (Brot.) sobre las ramas medio podridas en los setos. Otoñ., Inv. (n. v.)

UREDINACEAS.

~~~~~

## ESFERONEMEAS.

## Phoma.

**Ph. exigua Desm.**

*Hab.* España en Aragon cerca de Peñarroya, Castelserás, Torrecilla (Pardo, Loscos), sobre los tallos secos del *Asteriscus spinosus*. (n. v.)

## Cryptosporium.

**C. hypodermium Awd.**

*Hab.* España en Aragon cerca de Jaca (Wk.) sobre los ramos muertos de la Dulcamara. Jun. (n. v.)

## Sphæronema.

**S. conicum Fr.** *Sphaeria conica Tod.*, f. 116.

*Hab.* España cerca de Madrid en el Soto de Migas-calientes (Lag.) sobre los álamos. Abr. (n. v.)

## Sphæropsis.

**S. Ephedræ Awd.**

*Hab.* España en Valencia (Wk.) sobre los tallos muertos del Belcho ó Uva de mar. Ag. (n. v.)

## MELANCONIEAS.

## Stilbospora.

**S. pyriformis Hoffm?** t. 13, f. 4.

*Hab.* España cerca de Madrid en el Soto de Migas-calientes (Lag.) sobre las cortezas de los arces. Abr. (n. v.)

## FRAGMOTRICACEAS.

## Excipula.

**E. graminum Corda.**

*Hab.* España en los Pirineos (Wk.) sobre las hojas de la *Festuca Eskia*. Jun. (n. v.)

## TORULEAS.

## Torula.

**T. Oleæ Castagne.**

*Hab.* España en Cataluña y otras provincias (Colm.) sobre los olivos. Otoñ., Primav. (v. v.)

*Nombr. vulg.* *Cast.* Mangla, Tizne, Negrura del Olivo (Agricult.), Negra del Olivo (Pardo, Loscos). *Catal.* Malura de la Olivera (Bassag.), Rovell (?), Socarrell, Sucarrell (Texid.)

## PUCCINIEAS.

## Phragmidium.

**P. Ulmi Dub.** *Puccinia Ulmi DC.* *Mucor articulatus* Bull., t. 504, f. 14.

*Hab.* España en Aranjuez (Lag.) sobre las hojas de los olmos. Veran. (n. v.)

**P. incrassatum Linck.**

*Var.  $\alpha$  mucronatum Linck.* *Puccinia Rosæ Schum.* Grev., t. 15. Cercanías de Madrid en San Fernando y Ribas (Lag.) Jul. (v. v.)

*Var.  $\beta$  bulbosum Linck.* *Puccinia Rubi Schum.* Castilla la Nueva sobre las hojas de las zarzas. Veran. (v. v.)

**P. asperum Wallr.**

*Hab.* España en Aragon cerca de Castelserás (Pardo, Loscos) sobre las hojas de las zarzas. Veran.? (n. v.)

**Cystopus.****C. candidus Lev.**

*Hab.* España en Aragon cerca de Castelserás (Pardo, Loscos) y las Castillas (Colm.) sobre las crucíferas. Primav. (v. v.)

**Puccinia.****P. Menthæ Pers.**

*Hab.* España en Aragón cerca de Castelserás (Pardo, Loscos) sobre la Menta silvestre y otras. Otoñ. (n. v.)

**P. Graminis Pers.**

*Hab.* España (Colm.) sobre las cereales y otras gramíneas. Primav. (v. v.)

*Nombr. vulg.* *Cast.* Niebla, Anublo (Agricult.), Lodon, Botieco (Soc. econ. de Liébana). *Vasc.* Añon, Erdoya, Gorriña (Laram.)

**P. arundinacea Hedw. fil., t. 7. P. Graminis 3 DC.**

*Hab.* España en Cataluña cerca de Barcelona (Texid.) sobre los carrizos. Veran., Otoñ. (n. v.)

**P. compositarum Schlecht.**

*Hab.* España en el Pardo cerca de Madrid (Graells) y en la serranía de Cuenca (Wk.), sobre las hojas de varias compuestas. Ag. (v. v.)

**P. syngenesiarum Corda.**

*Hab.* España cerca de Madrid, en el Pardo, Sierra de Guadarrama y Molina de Aragon (Wk.) sobre algunas compuestas cinareas. Veran., Otoñ. (n. v.)

**P. Eryngii DC.**

*Hab.* España en Cataluña cerca de Figueras y Olot (Texid.), sobre las hojas del Cardo corredor. Veran., Otoñ. (v. v.)

**P. umbelliferarum DC.**

*Hab.* España (Colm.) sobre las hojas de varias umbelíferas. Veran., Otoñ. (v. v.)

**P. Asphodeli Dub.**

*Hab.* España en Galicia cerca de Santiago (Texid.) sobre los gamones. Veran., Otoñ. (n. v.)

**P. Trifolii Pers. Lag.**

*Hab.* España cerca de Madrid en la Casa de Campo (Lag.) sobre los árboles. Veran., Otoñ. (n. v.)

**Gymnosporangium.****G. Juniperi Linck. G. conicum DC. Tremella juniperina L. Hoffm., t. 6, f. 4.**

*Hab.* España en Aragón cerca de Villarluengo (Xarne) sobre los enebros y sabinas. Primav. (n. v.)

**CEOMEAS.****Uredo.****U. candida Pers.**

*Hab.* España en Cataluña, Galicia, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva (Texid.), sobre las hojas, tallos y frutos de las crucíferas y otras plantas pertenecientes a diversas familias. Veran., Otoñ. (v. v.)

**U. Alliorum DC.**

*Hab.* España en Cataluña cerca de Barcelona (Texid.), sobre varios ajos. Veran. (n. v.)

**U. Rhododendri DC.**

*Hab.* España en los Pirineos (Wk.) sobre las hojas del Rododendro ferrugíneo. Veran. (n. v.)

**U. linearis Pers.**

*Hab.* España en Cataluña (Texid.), Castilla la Nueva (Colm.), Aragón (Pardo, Loscos), Galicia cerca de Tuy (R. Bust.), sobre las hojas de las céráeles y otras gramíneas. Primav. (v. v.)

*Nomb. vulg. Cast.* Roya, Herrumbre, Argeña, Sarro  
(Agricult.)

**U. Jasoniae Awd.**

*Hab.* España en la Serranía de Cuenca (Wk.) sobre las hojas de la *Jasonia tuberosa*. Ag. (n. v.)

**U. Quercus Brondeau.**

*Hab.* España en Aragón cerca de Peñarroya sobre las hojas de las carrascas (Pardo, Loscos). (n. v.)

**U. Senecionis DC.**

*Hab.* España en Aragón (Wk.) y Galicia (Texid.) sobre algunos senecios. Primav., Veran. (n. v.)

**U. Rosæ Pers.**

*Hab.* España en Aragón cerca de Peñarroya (Pardo, Loscos), Cataluña y Galicia en los nogales (Texid.) y sobre los rosales. Veran., Otoñ. (v. v.)

**U. Ruborum DC.**

*Hab.* España en las Prov. Vascongadas cerca de Irún (Wk.) y en Cataluña cerca de Gerona (Texid.), sobre las hojas de las zarzas. Jun. (n. v.)

**U. Potentillarum DC. Cæoma Potentillarum Linck.**

*Hab.* España en Aragón cerca de Peñarroya (Pardo, Loscos) debajo de las hojas de la *Potentilla verna*. Veran. (n. v.)

**U. punctata DC.**

*Hab.* España en Cataluña (Texid.) sobre diversas lecheterznas. Primav., Veran. (n. v.)

**U. Campanulæ Pers.**

*Hab.* España en Galicia (Texid.) sobre algunas campáulas. Veran., Otoñ. (n. v.)

**U. Euphorbiæ Rebent.**

*Hab.* España en Aragón (Pardo, Loscos) y en Galicia (Texid.) sobre las hojas y frutos de varias lecheterznas. Primav., Veran. (n. v.)

**U. Lini DC.**

*Hab.* España en Navarra junto á Liédena (Wk.) sobre las hojas del Lino narbonense. Veran. (n. v.)

**U. scutellata Pers.**

*Hab.* España en Aragón (Pardo, Loscos) y Castilla la Nue-

va, entre Chesa y Setiles (Wk.), sobre las hojas de algunas lecheterenzas. Ag. (n. v.)

**U. chicoracearum DC.**

*Hab.* España en Cataluña (Texid.) sobre diferentes centaureas y chicoráceas. Veran., Otoñ. (n. v.)

**U. leguminosarum Rabh.**

*Hab.* España en las Prov. Vascongadas en el valle del Bidasoa (Wk.) sobre la Vicia bitinica. Jun. (n. v.)

*Var. β sporis rotundis non pedicellatis Wk.* Navarra sobre las hojas del Latiro palustre (Wk.)

**U. Fabæ Pers. Cæoma rubiginosum Bouvré.**

*Hab.* España en Cataluña (Texid.) y Aragon cerca de Castelserás (Pardo, Loscos), sobre las habas y otras leguminosas. Primav.

**U. Iridis Dub.**

*Hab.* España en Cataluña entre Figueras y Castellon de Ampurias (Texid.), sobre el Lirio fetidísimo. Primav., Veran. (n. v.)

**U. Rubigo-vera DC.**

*Hab.* España en Castilla, etc. (Lag., Clem.) y Cataluña (Colm., Texid.) sobre las cereales y otras gramíneas. Primav. (v. v.)

*Nomb. vulg. Cast.* Roya, Herrumbre, Argeña, Sarro, (Agricult.) *Vasc.* Añon, Érdoya, Gorriña (Larram.)

**U. Polygonorum DC.**

*Hab.* España en Cataluña (Texid.) sobre varios polígonos. Veran., Otoñ. (n. v.)

**U. Romicum DC.**

*Hab.* España en Cataluña, Galicia (Texid.) y Castilla la Nueva, cerca de Madrid (Rodr.), sobre diferentes rumices. Veran., Otoñ. (n. v.)

**U. Betæ Pers.**

*Hab.* España en Cataluña cerca de Olot (Texid.) sobre las acelgas. Veran., Otoñ. (v. v.)

**U. Terebinthi DC.**

*Hab.* España en Aragon cerca de Peñarroya (Pardo, Loscos) sobre las hojas del Terebinto. (v. s.)

**U. Gladioli Requien.**

*Hab.* España en Cataluña cerca de Tortellá (Texid.) sobre los gladiolos. Primav., Veran. (n. v.)

**U. Bistortarum DC.**

*Hab.* España en Cataluña en los montes de Nuria (Texid.) sobre la Bistorta y el Polígono vivíparo. Veran. (n. v.)

**U. Carbo DC.** *U. segetum Pers. Reticularia segetum Bull.*, t. 472, f. 1. *Reticularia Ustilago Brot. Ustilago segetum Dillm.*

*Hab.* España (Lag., Clem.) y Portugal (Brot.) sobre las glumas y ovarios de las cereales y otras gramíneas. Primav. (v. v.)

*Nomb. vulg. Cast.* Carbon, Carboncillo (Agricult.) *Catal.* Carbó (Texid.) *Port.* Carvão das searas (Brot.)

**U. Maydis DC.**

*Hab.* España sobre los maices en Castilla y Andalucía (Lag., Clem.), Galicia (Colm.), Asturias (L. P. Ming.), Cataluña (Texid.) Veran. (v. v.)

*Nomb. vulg. Cast.* Tizon del maiz (Clem.), Carboncillo del maiz, Congorcio (L. P. Ming.), Bolsas del maiz (Pardo, Loscos). *Catal.* Carbó (Texid.)

**U. Caries DC.**

*Hab.* España (Lag., Clem.) en los trigos dentro de los granos. Primav. (v. v.)

*Nomb. vulg. Cast.* Tizoncillo (Cienf.), Tizon del trigo (Clem.), Caries (Agricult.)

**Uromyces.**

**U. phæosporà Rabenh.** *Uredo scutellata Pers. et Auct. pro parte.*

*Hab.* España en Aragón cerca de Castelserás (Pardo, Loscos). Primav. (n. v.)

**Cronarcium.**

**C. Vincetoxici Fic. et Schub.**

*Hab.* España en Aragón cerca de Peñarroya (Pardo, Loscos) sobre las hojas del *Vincetoxicum nigrum*. (n. v.)

**Æcidium.**

**Æ. cancellatum** Pers. *Lycoperdon cancellatum* L.  
*Jacq. Flor. austr. t. 17.*

*Hab.* España en Cataluña (Texid.) y Aragón cerca de Peñarroya (Pardo, Loscos) sobre las hojas de los perales. Veran., Otoñ. (n. v.)

**Æ. laceratum** Sow. *Fung.*, t. 318.

*Hab.* España en Aragón (Pardo, Loscos) sobre el *Crataegus brevispina*. (n. v.)

**Æ. cornutum** Pers. *Sow.*, t. 319.

*Hab.* España en Asturias (Dur.) sobre las hojas del Serval de cazadores. Veran., Otoñ. (n. v.)

**Æ. Erythronii** DC.

*Hab.* España en Asturias hacia el Pico de Arvas (Dur.) y en Galicia cerca de Santiago (Texid.) sobre el Diente de perro. Veran. (n. v.)

**Æ. Urticæ** DC.

*Hab.* España en Cataluña cerca de Besalú (Texid.) sobre la Ortiga dioica. Veran. (n. v.)

**Æ. Allii** Pers.

*Hab.* España en Cataluña (Texid.) sobre algunos ajos Primav., Veran. (n. v.)

**Æ. Convallariæ** Schum. *Flor. dan.* t. 1435.

*Hab.* España en Cataluña cerca de Olot (Texid.) sobre las convallarias. Primav., Veran. (n. v.)

**Æ. Clematitis** DC.

*Hab.* España en Cataluña cerca de Gerona y Olot (Texid.) y en Aragón cerca de Castellote y Peñarroya (Pardo, Loscos) sobre las hojas, pedúnculos y frutos de la Vid alba. Veran., Otoñ. (n. v.)

**Æ. Schoberiæ** Awd.

*Hab.* España en el Bajo Aragón entre Alagón y Borja (Wk.) sobre las hojas de la Schoberia fruticosa. Jul. (n. v.)

**Æ. Euphorbiarum** DC.

*Hab.* España en Aragón cerca de Castelserás y Peñarroya

(Pardo, Loscos), é igualmente en Aranda (Calavia) sobre diferentes lechetreznas. Veran., Otoñ. (n. v.)

**Æ. chicoracearum DC.** *Sow. Fung. t. 397, f. 2.*

*Hab.* España en Aragón alrededor de Calaceite (Pardo, Loscos) sobre varias chicoráceas. (n. v.)

**Æ. Aristolochiæ Rabenh.**

*Hab.* España en Aragón (Pardo, Loscos) sobre las aristolochias. Veran., Otoñ. (n. v.)

**ESCLEROCIEAS.**

---

**Sclerotium.**

**S. Clavus DC.** *Spermoedia Clavus Fr. Bull. t. 3.*

*Hab.* España dentro de las glumas de las gramíneas y del centeno en particular, ocupando el lugar del grano. Primav., Veran. (v. v.)

*Cataluña* (Colm.): Mataró (Salvañá), Gerona (Exp. de Agr.), Olot (Texid.)

*Asturias* (L. P. Ming.)

*Galicia* (R. Bust.): Tuy (R. Bust.), Lugo (Exp. de Agr.), Santiago (Texid.)

*Castilla la Vieja* (Graells): Navas del Marqués (Graells.)

*Extremadura* (Guijo).

*Nomb. vulg. Cast.* Cornezuelo, Espolon, Espuela, Semilla espoleada (Seman. Agric. de Londres), Cornezuelo, El Moro (L. P. Ming.), Cornezuelo del Centeno (Bassag.), Breva del centeno (Guijo). *Catal.* Segol cornut ó banyut. (Bassag.)

**S. Tulipæ Lib. Corda.**

*Var. β Euphorbiæ Awd.* Pirineos sobre los tallos muertos de la *Euphorbia Cyparissias* (Wk.) Jun. (n. v.)

BOTRITACEAS.

ISARIEAS.

**Isaria.**

**I. epiphylla Pers.**

*Hab.* España en Aragon (Pardo, Loscos) sobre las hojas de los álamos y hayas, é igualmente de las gramíneas. Veran., Otoñ. (n. v.)

ESTILBACEAS.

**Tubercularia.**

**T. vulgaris Tode.** *Tremella purpurea L.* *Sphaeria miniata Bolt.* t. 127, f. 1.

*Hab.* Portugal (Vand.) sobre los troncos jóvenes y los ramos muertos de los árboles y arbustos. Inv. (n. v.)

DEMACIEAS.

**Exosporium.**

**E. hispidulum Linck.** *Conoplea hispidula Linck, non Pers.*

*Hab.* España en el Moncayo de Aragon (Wk.) sobre las hojas muertas de la Avena asurcada. Jul. (n. v.)

**E. Rubi Nees.**

*Hab.* España en Galicia cerca de los Nogales (Texid.) sobre las hojas de las zarzas. Veran., Otoñ. (n. v.)

## Septosporium.

### **S. atrum Corda.**

*Var. β foliicolum Corda, t. 3, f. 175.* Segorbe en Valencia (Wk.) sobre el envés de las hojas de la Adelfa. Ag. (n. v.)

### **Dematium.**

**D. arachnoideum Clem.** *Flor. bat. ined.* Fila tenuissima, incano-subcærulescentia, intertexta, effusa, muscum quasi tela aranea exilissima, pellucida, cooperientia. Clem. loc. cit.

*Hab.* España en la Sierra-Nevada de Andalucía (Clem.) sobre los musgos vivos y muertos. (n. v.)

## Cladosporium.

**C. herbarum Linck.** *Nees. f. 64.* **B. Dematium herbarum Pers.** *Byssus herbarum DC.*

*Hab.* España en Galicia cerca de Tuy (R. Bust.) sobre las plantas secas y los maderos viejos expuestos á la lluvia. Primav. (n. v.)

### **C. Fumago Linck.** *Torula Fumago Chevall.*

*Hab.* España en el Moncayo de Aragon (Wk.) sobre las hojas del Rododendro ferrugineo y de la Jara con hoja de laurel. Jun., Jul. (v. v.)

## MUCEDINEAS.

---

### **Aspergillus.**

**A. glaucus Linck.** *Mucor Aspergillus Bull.*, t. 504, f. 10. *Mucor glaucus L. Asso, Brot.*

*Hab.* España (Asso y Portugal (Brot.) sobre las frutas y otros objetos podridos. Todo el año. (v. v.)

*Nomb. vulg. Cast.* Moho de la fruta. *Port.* Bolor da fruta  
(Brot.)

### Botrytis.

**B. Polyactis Linck.** *Polyactis vulgaris Linck. Monilia vulgaris Pers. Penicillium racemosum Pers. Mich., t. 91, f. 4.*

*Hab.* España (Colm.) sobre los tallos herbáceos en putrefaccion. Todo el año. (v. v.)

**B. racemosa DC.** *Mucor racemosus Bull., 504, f. 7.*

*Hab.* España (Colm.) sobre las patatas, zanahorias y otras hortalizas en putrefaccion. Todo el año. (v. v.)

**B. cinerea Pers.**

*Hab.* España en Galicia (R. Bust.) sobre los hongos y tallos podridos. Todo el año. (v. v.)

### Penicillium.

**P. glaucum Linck.** *P. expansum Linck. Mucor penicillatus Bull., t. 504, f. XI, II. Monilia digitalis Pers. Mucor cæspitosus a L.*

*Hab.* España (Colm.) y Portugal (Vand.) sobre las sustancias blandas en putrefaccion. Todo el año (v. v.)

### Sporotrichum.

**S. virescens Linck.** *Cladosporium virescens Pers.*

*Hab.* España (Colm.) y Portugal (?) sobre las maderas húmedas y las cortezas de los árboles en putrefaccion. Inv. (v. v.)

### Sporendonema.

**S. casei Desmaz.** *Mucor crustaceus Bull., t. 504, f. 2.*

*Oidium rubens Linck.*

*Hab.* España (Colm.) y Portugal (Vand.) sobre los quesos viejos. Todo el año. (v. v.)

### Oidium.

#### O. Tuckeri Berk.

*Hab.* España sobre la Vid. Veran. (v. v.)

*Nomb. vulg. Cast.* Cenizo, Polvillo de la uva (Agricult.)

*Catal.* Malura de las viñas (Bassag.)

### HELVELACEAS.



### HELVELEAS.

#### Morchella.

**M. esculenta Pers.** *Phallus esculentus L. Schæff.*, t. 199. *Bull.*, t. 218. *Bolt.*, t. 95. *Chlathrus cancellatus Asso*, *Mant. non Linn.*

*Hab.* España (F. Nav., Sarm., Quer) y Portugal (?) sobre la tierra en muchas provincias. Primav. (v. v.)

*Cataluña* (Quer, Palau): Gerona (Quer), Caldas de Mom-  
buy (Graells).

*Aragon* (Asso, Palau): Linares, San Juan de la Peña (Asso), Villarluengo (Xarne), Tarazona (Jubera), Maestrazgo (Pardo, Loscos).

*Galicia* (Sarm.): Vivero (Sarm.), Ferrol (L. Alonso).

*Leon* (Nipho): Torrelobaton (Nipho).

*Castilla la Vieja* (Roques): cercanías de Burgos (Roques).

*Castilla la Nueva* (F. Nav.): cercanías de Madrid (F. Nav.)

*Valencia* (Clem.): Titáguas (Clem.), Peñagolosa (Barreda).

*Andalucia* (F. Nav.): inmediaciones de Ronda (Clem.).

*Baleares* (Barceló): Mallorca (Barceló).

*Var. α rotunda Fr.* *Boletus II Quer. Mich.*, t. 85, f. 1.

*Var. β vulgaris Pers.* *Boletus I Quer. Mich.*, t. 85, f. 2.

*Nomb. vulg. Cast.* Oreja, Crespilla, Cagarria (Cienf.), Hongo arrugado, Crespilla, Cagarria (F. Nav.), Colmenilla,

Cagarria, Múrgula (Barnad, padre), Cagarria (Quer), Colmenilla, Crespilla (Palau), Murúgula (Asso), Morogulles (Martorel), Colmenica, Cagarria (Clem.) *Port.* Morilha (Brot.) *Gall.* Cagarria (Sarm.) *Catal.* Múrgura (Palau), Múrgula (Texid., Bassag.), Múrbula, Rabassola (Lab. Dicc.), Crespiñella (?) *Val.* Fongo esvarador? (?) *Balear.* Gitat de bruxa (Barceló).

### M. deliciosa Fr.

*Hab.* España en Aragon entre Peñarroya y Beceite (Pardo, Loscos). Primav. (v. s.)

### Helvella.

#### H. lacunosa Afzel.

*Hab.* España (Clem.) y Portugal (Vand., Brot.) sobre la tierra y los troncos enmohecidos en diversas provincias. Primav., Otoñ. (v. v.)

*Var. a major Fr.* *Helvella mitra Schæff.*, t. 154.

*Cataluña* (Colm.)

*Aragon* (Pardo, Loscos).

*Valencia* (Clem.): Titáguas (Clem.)

*Andalucía* (Gutierr.): Coto del Puerto de Santa María (Gutierr.)

*Portugal* (Vand., Brot.): Alentejo (Brot.)

*Baleares*: Mallorca (Trias, Camb.)

*Nomb. vulg. Cast.* Bonetes, Orejetas (Pardo, Loscos), Cagarria (Clem.), nombre aplicable mas bien á la *Morechella esculenta Pers.*

### Verpa.

#### V. agaricoides Pers., t. 7, f. 4, 5. V. morechellula Fr. *Morechella agaricoides DC.*

*Hab.* España cerca de Madrid en la Casa de Campo (Graells) sobre la tierra. Abr. (n. v.)

### Geoglossum.

**G. glabrum Pers.** *Clavaria ophioglossioides L. Bull.*, t. 372.

*Hab.* Portugal en las selvas cerca de Tabeiro, inmediaciones de Coimbra y en otras partes de Beira (Brot.) sobre la tierra. Otoñ., Inv. (n. v.)

### Spathularia.

**S. flavid Pers.** *Elvella clavata Schæff.*, t. 149. *Clavaria spathulata Flor. dan.*, t. 658.

*Hab.* España en las Provincias Vascongadas cerca de Irún (Wk.) sobre las hojas pôdridas de los castaños, y en otras partes sobre las hojas caídas de los pinos. Abr. (n. v.)

### Peziza.

**P. Acetabulum L.** *Bull.*, t. 485, f. 4. *Sow.*, t. 59.

*Hab.* España cerca de Madrid en el Pardo (Graells), y en Aragón (Pardo, Loscos), sobre la tierra en sitios sombríos. Primav. (n. v.)

*Nomb. vulg.* *Cast.* Cabacitos (Pardo, Loscos). *Val.* Caba-sets (Pardo, Loscos).

**P. lycoperdoides DC.** *P. vesiculosa Bull.*, t. 487, f. 1. *E. F. Elvella lycoperdoides Scop.*

*Hab.* España en Cataluña en los Pirineos orientales (Texid.), Aragón cerca de Castelserás (Pardo, Loscos) y Castilla la Nueva (Colm.) sobre el estiercol y la tierra abonada. Primav., Otoñ. (v. v.)

**P. leucoloma Revent.** *Octospora leucoloma Hedw.* *Musc. frond.* II, t. 4, f. A.

*Hab.* España en Aragón cerca de Castelserás y Chirivána (Pardo, Loscos) entre los musgos. Primav., Otoñ. (n. v.)

**P. xanthomela Pers.**

*Hab.* España en Aragón cerca de Peñarroya (Pardo, Loscos) sobre la tierra. (n. v.)

**P. ollaris Fr.**

*Hab.* España en Aragon cerca de Castelserás (Pardo, Loscos) sobre la tierra en los olivares. Otoñ. (n. v.)

**P. populnea Pers.** *P. fascicularis Alb. et Schwein.*, t. 12, f. 2.

*Hab.* España en Asturias (Pastor) sobre los troncos podridos de los álamos, sauces y fresnos. Inv., Primav. (n. v.)

**P. coccinea Jacq.** *Flor. aust.*, t. 169, non *Bull. DC.*

**P. epidendra Bull.**, t. 467. *Sow.*, t. 13.

*Hab.* Portugal en las cercanías de Coimbra (Brot.) sobre los ramos medio podridos. Inv., Primav. (n. v.)

**P. scutellata L.** *P. ciliata Hoffm.*, t. 7, f. 3. *Octospora hirta Hedw.*, t. 3. *B. Peziza hirta Brot.* *Elvella ciliata Schæff.*, t. 284.

*Hab.* España en Aragon (Pardo, Loscos) y Portugal en Beira y otras partes (Brot.) sobre el mantillo húmedo. Inv. (n. v.)

**P. crinita Bolt.**, t. 416, f. 2.

*Hab.* España en Aragon cerca de Castelserás (Pardo, Loscos) en los ribazos. (n. v.)

**P. stercorea Pers.** *P. ciliata Bull.*, t. 438, f. 2. *P. scutellata Bolt.*, t. 108, f. 1. *Brot. non Linn.* *Octospora scutellata Hedw.*, t. 3, f. A.

*Hab.* España en Asturias (Pastor) y Aragon cerca de Castelserás (Pardo, Loscos) y Portugal (Brot.) sobre el estiercol de los caballos y hueyes, é igualmente sobre el excremento humano-en sitios húmedos. Otoñ., Inv. (n. v.)

**P. virginea Pers.** *P. nivea Sow.*, t. 66. *P. lactea Bull.*, t. 376, f. 3.

*Hab.* Portugal en Beira (Brot.) sobre la tierra húmeda, los leños, cortezas y hojas muertas. Inv. (n. v.)

**P. metaphia Sch.**

*Hab.* España en Aragon cerca de Castelserás (Pardo, Loscos). Otoñ.? (n. v.)

**P. coriacea Bull.**, t. 438, f. 1.

*Hab.* España cerca de Madrid en el Retiro (Rodr.) sobre el estiercol de caballo y asno. Otoñ.? (n. v.)

## TUBEREA.

## Tuber.

**T. cibarium** Bull., t. 356. *Tubera*, *Tubera da terra* Grisl. *Tubera I Quer.* *Licoperdon Tuber L.* *Tuber gulosorum* Web. *Brot.*

*Hab.* España (Lagun., Salv.) y Portugal (Grisl., Vand.) bajo la tierra en sitios arenosos de muchas provincias. Inv. (v. v.)

*Cataluña* (Salv.): Plana de Vich, selvas de Villafranca (Salv.), Olot (Texid.)

*Aragon* (Asso): Tarazona (Jubera).

*Castilla la Nueva* (Quer): Pardo, Aranjuez, Sierra de Miraflores, Sierra-Morena, Mancha, Alcarria (Quer).

*Valencia* (Clem.): Titágua (Clem.)

*Murcia* (Quer).

*Andalucia* (Clem.): Sierra-Morena, montes de Granada, Zujar, Gor, Don Diego (Clem.), Lanjaron (Medina).

*Extremadura* (Quer): Alange (Villaescusa).

*Portugal* (Grisl., Vand.): cercanías de Montemor, Ançâa y otras partes en Beira, inmediaciones de Thomar, Beja y otras partes en Alentejo (Brot.)

*Baleares*: Mallorca (Serra).

*Nomb. vulg. Casf.* Turma de tierra (Nebr., A. Lus., Lagun.), Criadilla de tierra, Turma de tierra (Cienf.), Turmas (Quer, Palau), Criadillas de tierra (S. de Rib., E. Nav., Sarm., Quer, Palau), Criadillas del campo (Clem.), Trufa negra (Villaescusa), Turma de monte (Pardo, Loscos). *Port.* Tuberas da terra (Lagun., Grisl., Vigier, Vand., Brot.), Tuberas porcinas, Tortulho ou Tortulo, Maçâa de porco ou porcina (Brot.) *Gall.* Zarrotes, Trufas (Sarm.) *Catal.* Tófenas (Lagun.), Tófanas, Turmas (Salv.), Tofunas (Bassag., Texid.) *Vasc.* Boillurac, Grisolac (Lárram.)

**T. albidum** Cæs. Parvum, subterraneum, carne albissima, eduli, cute nigra. Clem. Flor. bæt. ined.

*Hab.* España en Andalucía cerca de Zújar y en otras partes bajo la tierra con la especie comun (Clem.) Inv. (n. v.)

*Nomb. vulg. Cast.* Monegrillo (Clem.)

**T. moschatum** Bull., t. 479.

*Hab.* España (Cienf.) bajo la tierra en algunas partes.

*Nomb. vulg. Cast.* Turma almizclada, Mizclo, Almizcleño (Cienf.)

### Elaphomyces.

**E. cervinum** Nees. *Lycoperdon cervinum* L. *Scleroderma cervinum* Pers. *Phymacium fulvum* Chev. *Flor. par.* t. 10, f. 6. *Mich.*, t. 99, f. 4.

*Hab.* España (Xarne) bajo la tierra en los bosques y sitios montuosos. Otoñ. (v. s.)

*Aragon* (Xarne): Villarluengo (Xarne).

*Castilla la Vieja* (Cut.): Soria (Cut.)

*Andalucia* (Colm.)

*Nomb. vulg. Cast.* Turmas ó Criadillas de ciervo, Boleto de ciervo (Palau), Algallaras en Soria (Cut.)

### FACIDIEAS.

### Rhytisma.

**R. acerinum** Fr. *Mucor granulosus* Bull., t. 504, f. 13.

*Hab.* España en Aragon cerca de Peñarroya (Pardo, Loscos) sobre las hojas del *Acer opulifolium*. (n. v.)

### Hysterium.

**H. pulicare** Pers. *Mich.*, t. 54, f. 2. *Lichen alneus* Ach. *Prodr.*

*Hab.* España en Andalucía cerca de Medina-Sidonia, y en la Algaida de Sanlúcar de Barrameda (Clem.) sobre las cortezas de los olivos. Todo el año. (n. v.)

**H. Fraxini Pers.** *Hypoderma Fraxini DC.* *Sphæria*  
*sulcata* Bolt., t. 124.

*Hab.* España cerca de Madrid en el Soto de Migas-calientes (Lag.) sobre las ramas secas de los fresnos. Abr. (n. v.)

**H. rugosum Fr.** *Lichen rugosus L.*

*Var. a faginea Fr.* *Opegrapha faginea Pers.* *Opegrapha*  
*epiphega Ach.* Alcalá de los Gazules á la altura de 6.000' (Clem.) sobre las cortezas de los árboles. Todo el año. (n. v.)

**H. Pinastri Schrad.** *Tourn.*, t. 3, f. 4. *Hypoderma*  
*Pinastri DC.* *Lophodermium Pinastri Chevall.*

*Hab.* España en la Sierra de Guadarrama (Wk.) entre ambas Castillas, sobre las hojas caídas de los pinos. Set. (n. v.)

**H. commune Fr.** *Hypoderma virgultorum DC.*  $\beta$  et  $\gamma$ .  
*Lophodermium herbarum Chevall.*

*Hab.* España (?) sobre los tallos de varias yerbas bastante consistentes. Otoñ., Primav. (n. v.)

**H. culmigenum Fr.**

*Var. c. Airarum Fr.* Moncayo de Aragón (Wk.) sobre las hojas muertas del *Aira flexuosa*. Jul. (n. v.)

**H. apiculatum Corda.**

*Hab.* España en los Pirineos de Aragón (Wk.) sobre las hojas muertas de la *Festuca Eskia*. Jun. (n. v.)

### ESFERIEAS.

---

#### *Sphæria.*

**S. digitata Ehr.** *Brot.* *Clavaria digitata L.* *Bull.*, t. 220. *C. hypoxylon Schæff.*, t. 265.

*Hab.* España (?) y Portugal (Vand.) en Extremadura (Brot.) sobre las maderas medio podridas. Perenne. (n. v.)

**S. punctata Sow.**, t. 54. *S. Poronia Pers.* *Peziza*  
*punctata L.* *Bull.*, t. 252. *Poronia fimetaria Pers.* *Poronia*  
*punctata Fr.* *Peziza fimeli Brot.*?

*Hab.* España (Clem.) y Portugal (Brot.) sobre el estiércol ásnal y caballar comunmente, y algunas veces sobre la boñiga en muchas provincias. Todo el año. (v. v.)

**Aragon** (Pardo, Loscos): Torrecilla, Castelserás, (Pardo, Loscos).

**Castilla la Nueva** (Wk.): Molina de Aragon (Wk.)

**Valencia** (Clem.): Titáguas (Clem.)

**Andalucia** (Clem.): Sierra de Gador (Clem.)

**Portugal** (Brot.): Beira (Brot.)

**T. nebulosa Pers.** *Nees, f. 341.*

*Hab.* España en la Sierra-Nevada de Andalucía á la altura de 8.000' (Wk.) sobre la Reseda complicada. Ag. (n. v.)

**S. Oleæ DC.** *Marsypodium Oleæ Berol. Vogl.*

*Hab.* España en Aragon cerca de Peñarroya, Castelserás, Torrecilla (Pardo, Loscos) sobre las hojas muertas de los olivos. (n. v.)

**S. Loniceræ Sow.**, *t. 393, f. 6.*

*Hab.* España en Aragon cerca de Peñarroya (Pardo, Loscos) sobre los ramos secos de la *Lonicera implexa* (n. v.)

**S. barbara Fr.** *Nees, f. 344. Hysterium cinereum Pers.*

*Hab.* España en Andalucía en la Algaida de Sanlúcar de Barrameda (Clem.) sobre las ramas secas de diversos árboles. Primav. (n. v.)

**S. herbarum Fr.**

*Hab.* España en la Peña-Gorveya de las Provincias Vascongadas (Wk.), sobre los tallos muertos del *Arabis hirsuta*; y sobre otras yerbas. May. (n. v.)

**S. septem-septata Awd.**

*Hab.* España en los Pirineos (Wk.) y en Aragón (Pardo, Loscos) sobre las hojas y vainas de la *Festuca Eskia*. Jun. (n. v.)

### Combosira.

**C. reticulata Rabh.** *Phæropisidium*

*Hab.* España en Aragon cerca de Peñarroya (Pardo, Loscos) sobre las hojas del Cardo corredor. (n. v.)

**Spilosphaeria.**

**S. sonchicola Rabh.**

*Hab.* España en Aragón cerca de Torrecilla, Castelserás, Peñarroya (Pardo, Loscos) sobre las cerrajas. Primav., Veran. (n. v.)

*leptiforme?*

**Depacea.**

**D. castaneæcola DC.** *Sphaeria castaneæcola Fr.* *Lichen castanarius Lam.* *Brot.* *leptiforme castaneæcola Desm.*

*Hab.* España en las Provincias Vascongadas cerca de Irun (Wk.) y Portugal en Beira (Brot.) sobre las hojas muertas ó medio podridas de los castaños. (n. v.)

**Dothidea.**

**D. Ulmi Fr.** *Sphaeria ulmaria Sow.*, t. 374, f. 3. *S. Ulmi Duv. Nees.*

*Hab.* España en la Sierra de Guadarrama cerca del Paular (Wk.) sobre las hojas caídas de los olmos. Veran. (n. v.)

**PERISPORIEAS:**

**Erysiphe.**

**E. macularis Fr.** *E. humilis DC.* *Mucor Erysiphe* *Brot.*

*Hab.* España en Madrid (Rodr.) y Portugal (Brot.) sobre las hojas del Lúpulo y otras plantas. Veran., Otoñ. (v. v.)

**E. communis Linck.**

*Hab.* España sobre muchas plantas. Veran., Otoñ. (v. v.)

## MUCORACEAS.

## ANTENNARIEAS.

## Antennaria.

**A. ericophila** Link.

*Hab.* España en Asturias sobre los brezos arbóreos en el valle de Narceya y Peñas de San Pedro (Dur.) y Portugal (Link.) Veran. (n. v.)

**A. cellaris** Fr. *Dill. Musc.*, t. 1, f. 12. *Byssus septica* Auct. vet. *Brot. B. cryptarum* DC. *Racodium cellare* Pers.

*Hab.* España en Aragon (Pardo, Loscos), Galicia (R. Bust.) y Portugal (Brot.) dentro de las alacenas y bodegas. Todo el año. (v. v.) *Mycelium sternlini*

## MUCORINEAS.

## Mucor.

**M. Mucedo** Bolt., t. 3, t. 132, f. I.

*Hab.* España (Aso, Lag., Clem.) y Portugal (Vand., Brot.) sobre el pan podrido y otras sustancias. Todo el año. (v. v.)

*Nomb. vulg.* Cast. Moho (Lag., Clem.) Port. Mufflo (Vand.), Bolor (Brot.) Catal. Molsa (?). Balear. Pet de veya (Ramis). Vasc. Lizuna, Lizunqueria (Larram.)

**M. ascophorus** Linek. *M. Mucedo* Pers. *M. sphæ-rocephalus* Bull., t. 480, f. 2, non Linn.

*Hab.* España (G. de la Leña) y Portugal (Vand.) sobre varias sustancias podridas. Todo el año. (v. v.)

*Nomb. vulg.* Los del *M. Mucedo* Bolt.

**M. caninus Pers.** *Nees Fung.*, t. 79.

*Hab.* España en Aragón cerca de Peñarroya (Pardo, Loscos) sobre el excremento de perro durante las nieves. (n. v.)

**Eurotium.****E. herbariorum Linck.** *Nees, t. 97.* *Mucor herbariorum Wigg. DC.*

*Hab.* España sobre las plantas secas en putrefacción, particularmente en los herbarios mal conservados. Todo el año. (v. v.)

**BISINEAS.****Erineum.****E. Juglandis DC.** *Grev. Cript.*, t. 263, f. 2.

*Hab.* España en las Castillas (Colm.) y en Aragón cerca de Peñarroya (Pardo, Loscos) en las hojas de los nogales. Veran. (v. v.)

**E. ilicinum DC.** *Grev. Edinb.*, t. 2, f. 5.

*Hab.* España en la Sierra-Nevada de Andalucía (Wk.) en las hojas de las encinas, y en Aragón cerca de Peñarroya en las de las coscojas (Pardo, Loscos). Ag. (n. v.)

**E. pyrinum Pers.** *Grev. Crypt.*, t. 22.

*Hab.* España en Cataluña sobre las hojas y peciolos de los perales, manzanos y otros frutales. Veran. (v. v.)

**E. purpureum DC.**

*Hab.* España en Aragón cerca de Torrecilla y Castelserás (Pardo, Loscos), y Galicia (Colm.) sobre las hojas de los abedules. Veran. (v. v.)

**E. Vitis DC.** *Grev. Edinb.*, t. 2, f. 3.

*Hab.* España en Cataluña (Texid.), Aragón (Pardo, Loscos), Castillas (Colm.), Galicia (R. Bust.) en las hojas de la Vid. Veran. (v. v.)

**E. populinum Pers.**

*Hab.* España sobre las hojas de los álamos (Colm.)

**E. alneum Pers.** *Grev. Crypt.*, t. 157, f. 2. *Mucor ferrugineus Bull.*, t. 514, f. 12.

Hab. España en Cataluña (Texid.) y Galicia (Colm.) en las hojas de los alisos. Veran. (v. v.)

**E. fagineum Pers.** *Grev. Crypt.*, t. 250, f. 1. *Rubigo faginea Nees.*

Hab. España en Cataluña (Texid.) en las hojas de las hayas. Veran. (v. v.)

### Byssus.

*Mycelia sterilia*  
**B. floccosa Mart.** *Hypha bombycina Pers.* *Dill. Musc.*, t. 1, f. 9.

Hab. España (Clem.) en las despensas y cuevas. Todo el año. (v. v.)

**B. argentea Dub.** *B. parietina*  $\beta$  *argentea DC.* *Hypha argentea Pers.* *Vail. Bot.*, t. 8, f. 1.

Hab. España en Cataluña (Texid.) y Aragón (Pardo, Loscos) en los subterráneos y sitios sombrios. Todo el año. (v. v.)



Además de los nombres vulgares dudosamente indicados después de las respectivas especies, ó de las que parecen serlo, y podrán confirmarse ó rectificarse, hay otros cuya correspondencia científica falta averiguar. Esto se refiere principalmente á los nombres catalanes, que son numerosos; y convendría hacer nuevos estudios é investigaciones en Cataluña con los hongos frescos á la vista, para dominar las dificultades, que circunstancias poco propicias no han permitido vencer anteriormente. He aquí bastantes nombres catalanes, algunos vascuences y pocos portugueses.

*Catal.* Aubarell.—Bolet de grex.—Bolet de poy.—Bos-sas.—Cama de perdiu, Morro de perdiu, Ull de perdiu.—Cuas de rata.—Flotas.—Forner, Furner, Bolet furner, Ru-biola.—Giragola, Girbula, Girgula, Girkola.—Gravolera.—Llanega, Mucosa.—Moliner, Muliner, Fariner.—Morro de

ovella, Fredolich, Fredulich.—Mudequin.—Muxin.—Negrentin.—Siurenj, Sureny, Mollaso, Gabaits.—Vinaté.—*Castellanizados* por Martorel, Historia de Tortosa (1627): Agelorla.—Bateon.—Brunete.—Cadorla.—Cuaderno.—Escrellon.—Hongo de buey, no comestible.

*Vasc.* Guibelurdin.—Gureto.—Onterroa.—Ontioa, Ontoa.—En general: Perrichicuac.

*Port.* Cilherqua (A. Lus.)—Gasalho (Lagun., Mont.)—Sanchinha (Lagun.)

Podrian añadirse en este momento algunas especies, que acrecentasen el número de las indicadas; pero se dejan para otra ocasion, y entretanto conviene advertir que al enumerar las *Mixogastreas* se puso *Stemenites* en lugar de *Stemonites*, y que entre las *Ceomeas*, donde se expresan las especies de *Uredo*, debe entenderse que el *U. Rosæ Pers.* se halla en los Nogales, localidad de Galicia, sobre los rosales.

## VIII. LIQUENES.

---

### CALICIOIDEAS.

---

#### Trachylia.

**T. tigillaris Fr.** *Lichen tigillaris Ach. Engl. bot.*, t. 1530. *Calicium tigillare Pers. Schær.*, t. 6, f. 1.

*Hab.* España en la Sierra-Nevada de Andalucía (L. Seoane) sobre los troncos de los árboles. (n. v.)

#### Calicium.

**C. paroicum Ach.** *C. chlorinum Stenh.*

*Hab.* España (Clem.) sobre la tierra y rocas (v. v.)

**C. trichiale Ach.** *Act. Holm.* 1816, t. 8, f. 14.

*Var.  $\beta$  stemoneum Fr.* *Calicium stemoneum Ach.* Andalucía en la Sierra-Nevada (L. Seoane) sobre los troncos de los árboles.

**C. subtile Pers.** *Mucor sphærocephalus L.* *C. debile Borr.* *Engl. bot., t. 2462.* *C. nigrum  $\gamma$  pusillum Schær.* *C. sphærocephalum  $\delta$  pusillum Ach.*

*Hab.* España sobre las rocas areniscas y las cortezas de los árboles en Andalucía cerca de Alcalá de los Gazules, y en la Talla de Pitres á la altura de 1.800-4.200' (Clem.) frecuentemente. (v. s.)—El *C. sphærocephalum  $\epsilon$  parasiticum Clem. Lich. bæt. ined.* se diferencia del anterior en que «carece de costra propia;» y se halla en las cercanías de Cadiz sobre el *Telotrema pertusum Ach.* y en el Desierto de las Nieves sobre la epidermis de los avellanos (Clem.)

**C. quercinum Pers.** *C. lenticulare Fr.* *Mucor lichenoides L.* *Lichen clavellus Ach.* *Prodr. Engl. bot. t. 1465.*

*Hab.* España principalmente sobre las cortezas de las encinas en Valencia (Cav.), Castilla la Nueva (Cut., Amo), Galicia (L. Seoane) y Portugal (Vand.) en diversas partes. (n. v.)

*Var.  $\beta$  curtum Nyl.* *Calicium curtum Borr.* *Engl. bot. t. 2503.* Prefiere los pinos y enebros.

**C. roscidum Flk.** *C. claviculare  $\beta$  roscidum Ach.* *Fl. dan., t. 1951.*

*Hab.* España sobre los leños y cortezas de las encinas en Andalucía cerca de Alcalá de los Gazules, Medina-Sidonia, cerro de los Santos y Sanlúcar de Barrameda, llegando á la altura de 1.800' (Clem.), é igualmente en otras provincias. (n. v.)

### Conioocybe.

**C. furfuracea Ach.** *Calicium furfuraceum Pers.* *Mucor furfurascens L.* *Engl. bot., t. 1539.* *Schær., t. 6, f. 3.*

*Hab.* España sobre la tierra, las piedras, raíces y cortezas de los árboles. (v. v.)

*Galicia* (L. Seoane): cercanías de Mondoñedo (L. Seoane).

*Var.  $\beta$  fulva Fr.* *Mucor fulvus L.* Portugal (Vand.)

## ESFEROFOREAS.

## Sphærophoron.

**S. compressum** Ach. *Lichen fragilis* Sm. Engl. bot., t. 114, non Linn.

*Hab.* España en la Sierra-Nevada (L. Seoane) sobre la tierra (n. v.)

**S. coralloides** Pers. Schær., t. 6, f. 4. *Lichen globiferus* L. Dill. Musc., t. 17, f. 35. Engl. bot., t. 115.

*Hab.* España (Lag., Salcedo) y Portugal (Guthnik) sobre los troncos de los árboles y las piedras en los montes algo elevados de varias provincias. (v. s.)

*Cataluña* (Villers): Valle de Aran (Villers).

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag., Dur.): Pico de Arvas (Lag., Dur.), Valgrande (Lag.)

*Andalucía?* (Clem.): Sierra-Nevada? (Clem.)

*Portugal* (Guthnik): Serra de Cintra (Guthnik).

**S. fragile** Pers. *Lichen fragilis* L. Fl. lapp., t. 11, f. 4. Dill. Musc., t. 14, f. 34, ex ic. Engl. bot., t. 2474.

*Hab.* España (Clem.) y Portugal (Brot.) sobre la tierra y las rocas graníticas en los montes de algunas provincias, llegando en las meridionales á la altura de 5.400-6.000' (Clem.) y acaso más arriba (v. s.)

*Andalucía* (Clem.): Puerto Oscuro en la Sierra del Algibe (Clem.), dehesa de Alfacar cerca de Granada (L. Seoane).

*Portugal* (Brot.): montes de Gerez, Serra de Estrella (Brot.)

## BEOMICEAS.

## Bæomyces.

**B. roseus** Pers. Schær. t. 6, f. 6. *Lichen ericetorum*  
*L. Dill. Musc.*, t. 14, f. 1. Engl. bot., t. 374.

*Hab.* España en Santander (Salcedo), en Galicia cerca del Ferrol (L. Seoane) y Portugal cerca de Coimbra (D. Bapt.) sobre la tierra arcillosa (n. v.).

**B. icmadophilus** Nyl. *Lychen icmadophilus* Ehrh.  
*Lecidea icmadophila* Ach. *Lichen ericetorum* Sm. non *L. Engl.*  
bot., t. 372. Jacq. Fl. austr., t. 275.

*Hab.* Pirineos centrales (Lge.) en sitios húmedos (n. v.).

## CLADONIEAS.

## Cladonia.

**C. endiviæfolia** Fr. Michel., t. 42, f. 3. Engl. bot.,  
t. 2361. *Cenomyce endiviæfolia* Ach. *Lichen endiviæfolius*  
Dicks. *L. convolutus* Lam. *L. endiviolus* Brot.

*Hab.* España (Lag., Clem.) y Portugal (Brot.) sobre la tierra en los montes de varias provincias, hallándose en las orientales á la altura de 4.000' (Wk.), y más arriba (Clem.) en las meridionales. (v. v.)

*Cataluña* (Colm.)

*Aragon* (Pardo, Loscos): montes de Sástago, Puimoreno, Peñarroya (Pardo, Loscos).

*Santander* (Salcedo).

*Galicia* (Colm.): Rubianes (Colm.)

*Castilla la Vieja* (Duf.): Burgos (Duf.)

*Castilla la Nueva* (Lag., Colm.): cercanías de Madrid en el Pardo (Colm.), Sierra de Guadarrama (Duf.)

*Valencia* (Clem., Wk.): Titáguas (Clem.), Sierra de Chiva en la Casoleta (Wk.)

*Murcia* (Lag.)

*Andalucía* (Lag., Clem.): Jaen (Lag., Clem.), Puerto de Santa María, Algaida de Sanlúcar de Barrameda (Clem.), Carratraca (Hæns., Boiss.), Bonanza (Wk.), Chiclana (Lge.), Granada (L. Seoane).

*Portugal* (Brot.): Almada y Caparica en Alentejo, cercanías de Coimbra (Brot.)

**C. alcicornis** Flk. *Cenomyce alcicornis* Ach. *Lichen alcicornis* Lightf. Dill. *Musc.*, t. 14, f. 12. *Cladonia soliacea*, *phyllophora et cornucopioides* Hoffm.

Hab. España (Cav., Clem.) sobre la tierra en los montes de varias provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 2.100-6.000' (Clem.), y más abajo en las orientales. (v. s.)

*Cataluña* (Cav., Arriete): Monserrat (Cav.), cercanías de Barcelona (Arriete).

*Prov. Vascongadas* (Fée): Vitoria (Fée).

*Valencia* (Cav.)

*Murcia* (Cav.): Hellín (Cav.)

*Andalucía* (Clem., Lge.): Picacho de Alcalá de los Gázares (Clem.)

**C. pyxidata** Fr. *Cenomyce pyxidata et Pocillum* Ach. *Lichen XXIV* Quer. *Lichen pyxidatus* L. Dill. *Musc.*, t. 14, f. 6. A-C, I-M, f. 9. A. *Engl. bot.*, t. 1393.

Hab. España (Quer, Asso) y Portugal (Vand., Brot.) sobre la tierra y las piedras en los montes de muchas provincias, llegando en las meridionales á la altura de 9.000' (Clem.) ó más. (v. v.)

*Cataluña* (Palau, E. Bout.): Monserrat (Palau, E. Bout.), Monjuich (Arriete), Vallés, Pirineos (Texid.)

*Aragón* (Asso, Lag.): Sierra de Arcos (Asso), Villarluengo (Xarne), Castelserás (Pardo, Loscos).

*Prov. Vascongadas* (Wk.): Peña-Gorveya (Wk.)

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.): Arvas (Lag.)

*Galicia* (Lag.): Santiago (Colm., Texid.)

*Castilla la Vieja* (Rodr., Alea): San Ildefonso (Alea).

*Castilla la Nueva* (P. de Escob.): cercanías de Madrid (P. de Escob.), Trillo (Conde).

*Valencia* (Cav.): monte Palomera (Cav.), Sierra de Engarceran (?).

*Andalucía* (Lag., Clem.): Jaen (Lag.), Málaga (Clem., Prol.), barranco de Trevélez, cercanías de Granada, Caniles de Baza, Cabo de Gata (Clem.), Sierra-Nevada (Boiss.)

*Portugal* (Vand., Brot.): cercanías de Coimbra (Brot.), Beira septentrional (Figueir.)

*Var.  $\alpha$  simplex* Ach. *Lichen simplex* Roth. *Dill. Musc.*, t. 14, f. 6. A. Cataluña en Vallvidrera (Texid.), Andalucía en Alcalá de los Gazules (Clem.) y Portugal (Brot.)

*Nomb. vulg. Cast.* Caracolillas de peñas (F. Nav.). Líquen de embudo ó embudado (Bassagaña). *Port.* Musgo copinho de tubérculos fuscos (Figueir.)

### C. gracilis Fr.

*Var.  $\alpha$  verticillata* Fr. *Cenomyce verticillata* Ach. *Lichen* XXV *Quer.* *Lichen pyxidatus*  $\beta$  L. *Dill. Musc.* t. 14, f. 6. D. H. f. 9. B. *Castilla la Vieja* en los montes de Avila, y *Castilla la Nueva* en Bustarviejo y el Paular (Quer), Galicia, cerca de Vigo (L. Seoane).

*Var.  $\beta$  cervicornis* Schær. *Lichen et Cenomyce cervicornis* Ach. *Engl. bot.*, t. 2574. Galicia cerca de Lugo y en el Pico Sagro (Lge.)

*Var.  $\gamma$  elongata* Ach. *Lichen elongatus* Jacq. *Misc.* t. 11, f. 1. *Lichen* XXVIII *Quer.* *L. gracilis* L. *Dill. Musc.* t. 14, f. 13. A-D. *Engl. bot.*, t. 1284. *Cladonia elongata et gracilis* Hoffm.

*Cataluña* (Villers): valle de Aran (Villers).

*Aragón* (Lge.): Pirineos centrales (Lge.)

*Santander* (Salcedo.)

*Asturias* (Dur.): monte situado al oriente del Naviego (Dur.)

*Galicia* (Camiña, Lge.)

*Castilla la Nueva* (Cut., Amo).

*Andalucía* (L. Seoane): Sierra-Nevada en los Borreguiles de Dilar (L. Seoane).

*Portugal (Brot.)*

*Var. δ aspera Flk.* *Cenomyce divulsa Del.* Galicia en el Pico Sagro (Lge.)

*Var. ε crispata Nyl.* *Cenomyce crispata Ach.* Jaen (Lag.)  
*Cast.* Jaboncillo de piedra (Lag.)

**C. degenerans Flork.** *Dill. Musc.*, t. 15, f. 20. *Cenomyce degenerans Duf.*

*Hab.* España en Andalucía cerca de Granada (L. Seoane) sobre la tierra en los montes. (n. v.)

**C. fimbriata Fr.** *Lichen XXVII Quer.* *Lichen fimbriatus α L.* *Dill. Musc.*, t. 14, f. 8. *Engl. bot.*, t. 1438. *Cenomyce fimbriata Ach.*

*Hab.* España (Quer) y Portugal (Brot.) sobre la tierra arcillosa en los montes y bosques de diversas provincias. (v. s.)

*Cataluña* (E. Bout.): Monserrat (E. Bout.)

*Aragon* (Asso): Tronchon (Asso).

*Asturias* (Lag.): Arvas (Lag.)

*Castilla la Vieja* (Lag.): Rioja (Lag.)

*Valencia* (Lag., Clem.): Alberique (Lag.), Titáguas (Clem.)

*Var. β tubaeformis Fr.* *Lichen tubaeformis Hoffm.* *L. fimbriatus β L.* *Vaill. Bot.*, t. 21, f. 6. Aragon (Pardo, Loscos), Galicia en Santiago (Texid.)

*Var. γ radiata Fr.* *Lichen radiatus Schreb.* *L. fimbriatus γ L.* *Dill. Musc.*, t. 15, f. 16. A-G. *Engl. bot.*, t. 1835. *Lichen XXIX et XXXI Quer.* *Cenomyce fimbriata β cornuta Ach.* *Cladonia cornuta Duf.* *Lichen cornutus G.* *Ort. Asso.* *Brot. non L.* *Cenomyce coniocraea Pardo, Loscos, non Flk.*

*Cataluña* (Villers): Valle de Aran (Villers), Monserrat (Pourr.)

*Aragon* (Asso): Tronchon (Asso).

*Santander* (Salcedo).

*Galicia* (Colm.): Rubianes (Colm.), Santiago (Texid.)

*Castilla la Nueva* (Quer): Alcarria, Serranía de Cuenca, particularmente en la Hoz de Beteta y en la de Carduente (Quer.)

*Portugal* (Brot.): montes de Gerez, Serra de Estrella (Brot.)

**C. squamosa** Hoffm. Schær., t. 7, f. 3. *Cenomyce squamosa* Delise. *Lichen stipite squamato, calycibus congestis.* Asso Syn.

*Hab.* España en Aragon cerca de Tronchon (Asso).

**C. furcata** Schær., t. 7, f. 4. *Lichen subulatus* β *furcatus* Huds. *Cenomyce furcata* Ach. et *C. muricata* Delise.

*Hab.* España (F. Nav., Salcedo, Clem.) y Portugal (Brot.) sobre la tierra en los montes y bosques de varias provincias. (v. v.)

*Cataluña* (Villers): Valle de Aran (Villers), Vallvidrera, Tordera, Pirineos orientales (Texid.)

*Aragon* (Pardo, Loscos).

*Santander* (Salcedo): Peña-Castillo cerca de Santander (Lge.)

*Asturias* (Lag.): Arvas (Lag.)

*Galicia* (Colm.): Rubianes (Colm.), Piedrafita, Lugo, Santiago (Texid.), Orense (L. Seoane).

*Leon* (Lge.): Villafranca del Vierzo (Lge.)

*Castilla la Nueva* (Colm.): monte del Pardo (Colm.)

*Andalucía* (Clem.): Cabo de Gata en el Mochuelo (Clem.), Sierra-Bermeja (Clem., Häns., Boiss.), Chiclana (Lge.), Granada (L. Seoane).

*Portugal* (Brot.)

*Baleares*: Menorca (Hern., Camb., Oleo).

*Var. a racemosa* Schær. et Fr. *Cladonia racemosa* Hoffm. *Cenomyce racemosa* Ach. Dill. Musc., t. 16, f. 25. Cataluña en el Monserrat (Graells), Vallvidrera, Tordera, Pirineos orientales (Texid.), Galicia cerca de Padron (L. Seoane).

*Var. β recurva* Schær. *Cladonia recurva* Hoffm. Dill. Musc., t. 16, f. 27. D. Cataluña (Colm.)

*Var. γ subulata* Schær., t. 7, f. 4. *Lichen subulatus* L. Aragon (Lag., Xarne), Portugal (Brot.)

*Var. δ pungens* Fr. *Cenomyce pungens* Delise. *C. rangiformis* δ *pungens* Ach. Dill. Musc., t. 16, f. 30. *C. D. Cladonia rangiformis* Hoffm. *C. furcata* ε *rangiformis* Schær. Peña-

Castillo cerca de Santander y Villafranca del Vierzo en Leon (Lge.), Valencia cerca de Alberique (Lag.)

*Var. ε spadicea Delise. Cenomyce spadicea Duf. C. fuscata spadicea Ach.* Andalucía en Chiclana (Lge.)

**C. rangiferina Hoffm.** *Lichen rangiferinus L. Dill. Musc., t. 16, f. 29. Engl. bot., t. 173. Cenomyce rangiferina Ach.*

*Hab.* España (Salv., Xarne) y Portugal (Brot.) sobre la tierra en los montes de varias provincias, llegando en las meridionales á la altura de 9.000' (Clem.) proximamente. (v. v.)

*Cataluña* (Salv., E. Bout.): montes de San Gerónimo en el valle de Hebron (Salv.), Monserrat (E. Bout.), cercanías de Barcelona (Graells), Esparraguera (Colm.)

*Aragon* (Xarne, Lag.): Villarluengo (Xarne), Puimoreno (Pardo, Loscos).

*Asturias* (Lag.): Arvas (Lag.)

*Galicia* (Camiña, Lge.): Lugo (Lge.)

*Valencia* (Cav., Clem.): Titáguas (Clem.)

*Andalucía* (Lag., Clem.): Sevilla (Lag.), Sierra de María, Conil, Portugos, Cabo de Gata (Clem.), Lomas del Alcornocal que cerca de Medina-Sidonia (Wk.)

*Portugal* (Brot.)

*Var. γ sylvatica Schær. Cladonia sylvatica Auct. Lichen rangiferinus β sylvaticus L. Dill., t. 16, f. 30. B.* Cercanías de Carratraca (Hæns., Boiss.), Galicia (L. Seoane).

*Nomb. vulg. Gall. Pantrigo das cabras?* (Sarm.)

**C. uncialis Hoffm.** *Muscus coraloides albus Grisl. Lichen uncialis L. Dill. Musc., t. 16, f. 22. Cenomyce uncialis Ach. Cladonia ceranoides α DC.*

*Hab.* España (Asso, Cav., Lag.) y Portugal (Vand.) sobre la tierra en los montes de varias provincias (v. s.)

*Cataluña* (Cav.): Monserrat (Cav.)

*Aragon* (Asso): Tronchon (Asso).

*Asturias* (Lag.): Arvas (Lag.), monte situado al Oriente del Naviego (Dur.).

*Castilla la Nueva* (Lag.): Madrid en la Casa de Campo (Lag.)

*Portugal* (Vand.)

**C. cornucopioides** Fr. *Lichen XXVI Quer. Lichen cornucopioides L. et L. cocciferus Auct. Engl. bot., t. 2051. Cenomyce coccifera Ach. Cladonia extensa Schær. Cl. coccinea et extensa Hoffm.*

*Hab.* España (Quer, Asso) y Portugal (Vand., Brot.) sobre la tierra y al pie de los árboles en los montes de diversas provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 2.400-6.000' (Clem.) próximamente (v. s.)

*Aragon* (Asso, Jubera): montes de Guara (Asso), Tarazona (Jubera).

*Navarra* (Née): Irali (Née).

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.)

*Galicia* (Camiña, Lge.): Lugo (Lge.), Tuy (L. Seoane).

*León* (Lag.): Vegalamosa (Lag.)

*Andalucía* (Clem.): Picacho de Alcalá de los Gazules (Clem.)

*Portugal* (Vand., Brot.): Beira boreal (Brot.)

*Nomb. vulg. Cast.* Yerba del fuego (Farmac.) *Port.* Musgo copinho (Brot.), Musgo copinho de tubérculos escarlates (Figueir.)

**C. bellidiflora** Schær., t. 7, f. 1. *Cenomyce bellidiflora* Ach.

*Var. β polycephala* Ach. *Cladonia polycephala* Hoffm. *Vaill. Bot., t. 21, f. 10.* Schær. t. 7, f. 1. *Aragon* (Pardo, Loscos).

**C. deformis** Hoffm. *Lichen XXX Quer. Lichen deformis L. Engl. bot., t. 1394. Cenomyce deformis* Ach. *Beomyces ex Sierra-Nevada Clem.? Lich. et Flor. bat. ined.*

*Hab.* España (Quer, Lag., Clem.) sobre la tierra y al pie de los árboles en los montes de varias provincias, hallándose á la altura de 12.000-12.150? (Clem.) en la Sierra-Nevada (n. v.)

*Cataluña* (E. Bout.): Monserrat (E. Bout.)

*Asturias* (Lag.)

*Andalucía* (Clem., Lag.): Sierra-Nevada (Clem.)

**C. digitata Hoffm.** *Lichen digitatus L. Cenomyce digitata Ach. Dill. Musc., t. 15, f. 18. B. Monstr.*

*Hab.* España (Lag., Clem.) sobre la tierra, los troncos y leños podridos en algunas provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 2.100-6.000 (Clem.) ó algo más (v. s.)

*Asturias* (Lag.): Arvas (Lag.)

*Andalucía* (Clem.): Picacho de Alcalá de los Gazules (Clem.)

**C. macilenta Hoffm.**

*Var.  $\alpha$  baccillaris Schær. Cenomyce baccillaris Ach. Lichen filiformis Reth. Engl. bot., t. 2028.* Castilla la Vieja en la Rioja y Andalucía (Lag.), sobre la tierra y los troncos podridos.

#### ESTEREOCAULEAS.

---

#### Stereocaulon.

**S. corallinum Schreb.** *Lichen paschalis Ehrh. Stereocaulon paschale Ach. Schær., t. 6, f. 5.*

*Hab.* Pirineos (Schær.) sobre las rocas graníticas. (n. v.)

**S. paschale Laur.** *Lichen paschalis L.*

*Hab.* España en el Monserrat de Cataluña (Pourr.), en Galicia cerca de Lugo (Lge.) y Portugal en la Serra de Gerez y en la de Estrella (Brot.), sobre las rocas. (n. v.)

**S. nanum Ach.** *S. quisquiliare Schær.*

*Hab.* Portugal (Dur.) sobre la tierra y en las hendiduras de las rocas (n. v.)

#### ROCCELEAS.

---

#### Roccella.

**R. phycopsis Ach.** *Dill. Musc., t. 22, f. 60.*

*Hab.* España (Lge.) sobre los peñascos marítimos en algunas provincias. (n. v.)

*Cataluña* (Texid.): Monjuich en las rocas (Texid.)

*Galicia* (Lge.): Coruña (Lge.)

*Andalucia* (Lge.): Cabo de Gata (Lge.)

**R. tinctoria** Ach. *Schær.*, t. 1, f. 3. *Lichen Roccella*

*L. Dill. Musc.*, t. 17, f. 39. *Engl. bot.*, t. 211.

Hab. España (Esteve, Sarm., Bowles) y Portugal (Vand., Brot.) sobre los peñascos marítimos en algunas provincias, llegando en las meridionales á la altura de 300' (Clem.) lo más. (v. v.)

*Asturias* (Lag.): Concha de Artedo (Lag.)

*Galicia* (Sarm.)

*Valencia* (Esteve).

*Andalucia* (Bowl., Clem.): Cabo de Gata en el cerro del Mochuelo, Antequera (Bowl., Clem.), Málaga (Talbot, G. de la Leña), Gibraltar (Clem., Boiss., Kel.), monte de Almoraina cerca de San Roque (Wk.)

*Portugal* (Vand., Brot.): islas Berlengas (Brot.)

*Baleares* (Salv., Serra, Camb.): Mallorca (Serra), Menorca en Mahon (Salv., Pourr.) y en Ciudadela (Oleo).

*Nomb. vulg. Cast.* - Urgilla (Esteve), Orchilla (Sarm., Palau.) *Port.* Urzella (Vand.), Orzella das ilhas, Orzella, Orzella, Urcella (Brot.) *Gall.* Orcela, Orcilla (Sarm.), Cogoradas dos penedos, Conchelon, Orxéla, Caspa dos penedos, Herba dos penedos, Herba da pena, Orcela, Orxela das fontes (Sobreira). *Catal.* Tull (?).

**R. fuciformis** Ach. *Lichen fuciformis* L. *Dill. Musc.*, t. 22 et 23, f. 61. *Engl. bot.*, t. 728.

Hab. España (Lag., Clem., Boiss.) sobre los peñascos marítimos en algunas provincias, llegando en las meridionales á la altura de 150' (Clem.) proximamente (v. s.)

*Asturias* (Lag.): Concha de Artedo (Lag.)

*Galicia* (Lge.): Coruña (Lge.)

*Andalucia* (Clem., Boiss.): Cabo de Gata (Clem.), Gibraltar (Boiss., Kel.)

## SIFULEAS.

## Thamnolia.

**T. vermicularis** Schær., t. 9, f. 7. *Lichen vermicularis* Sw. L. fil. *Cladonia vermicularis* DC. *C. subuliformis* Hoffm.

Hab. España en la Casa de Campo cerca de Madrid (Lag.) sobre la tierra entre los musgos (n. v.)

Var.  $\beta$  *taurica* Schær. *Cladonia taurica* Hoffm. *Lichen tauricus* Vulf. in Jacq. Coll., t. 12, f. 2. Valle de Aran (Vill.)

## USNEAS.

## Usnea.

**U. barbata** Fr. Schær.

Hab. España (Quer, Asso) y Portugal (Vand., D. Bapt.) sobre los árboles y arbustos en los Pirineos y demás montes, llegando en las provincias meridionales á la altura de 7.500' (Clem.), y presentando diferentes variedades, antes de ahora tenidas por especies (v. v.)

Var.  $\alpha$  *florida* Fr. Schær. *Usnea florida* Hoffm., t. 30, f. 2. *Lichen XVIII* Quer. *Lichen floridus* L. Dill. *Musc.*, t. 13, f. 13. *Engl. bot.*, t. 872.

Cataluña (Quer?, Villers): Valle de Aran (Villers).

Santander (Salcedo).

Asturias (Lag.): Arvas (Lag.)

Galicia (L. Seoane): cercanías de Cuntis (L. Seoane).

León (Lag.): Busdongo (Lag.)

Castilla la Nueva (Cul., Amo).

Andalucía (Clem.): Alcalá de los Gazules, Pajarete, Bornos, Algaida de Sanlúcar de Barrameda, Málaga (Clem.). Sierra de Palma (Wk.), Sierra-Nevada (L. Seoane).

*Portugal* (Brot.)

*Var.*  $\beta$  *hirta* *Fr. Schær.* *Usnea hirta Hoffm.* *Lichen XIX*  
*Quer.* *Lichen hirtus L.* *Dill. Musc.*, t. 13, f. 12. *Engl. bot.*,  
*t. 1354.*

*Cataluña* (E. Bout.): Pirineos (Poir.), Monserrat (E. Bout.)

*Aragon* (Pardo, Loscos): Valderrobles, Peñarroya (Pardo, Loscos).

*Santander* (Quer, S. Ruiz): Liébana (Quer), valle de Toranzo (S. Ruiz.)

*Asturias* (Quer, Lag.): Pravia (Lag.)

*Leon* (Quer).

*Castilla la Nueva* (Quer, Lag.): Alcarria, Señorio de Molina (Quer), Galapagar (Lag.)

*Andalucia* (Talbot, Cabr.): Gibraltar (Talbot), Sierra del Algibe, Alcalá de los Gazules (Cabr.), Picacho de Alcalá de los Gazules, Portugos, Jerez de la Frontera, montes del Valle, Grazalema (Clem.)

*Portugal* (Grisl., Vand., Brot.)

*Var.*  $\gamma$  *ceratina* *Schær.* *Usnea ceratina*  $\beta$  *scabrosa Ach.*  
*España* (Schousb.)

*Var.*  $\delta$  *plicata* *Fr. Schær.* *Usnea plicata Hoffm.* *Muscus arboreus, Musgo Grisl.* *Lichen XV* *Quer.* *Lichen plicatus L.* *Dill. Musc.*, t. 11, f. 1. *Engl. bot.*, t. 257.

*Cataluña* (Quer): Pirineos (Quer), Monserrat (E. Bout.)

*Aragon* (Quer): Pirineos (Quer), Tarazona (Jubera).

*Navarra* (Née): montes de Naval, Burguete, Irati (Née).

*Santander* (Perojo, S. Ruiz): Vargas (Perojo), valle de Toranzo (S. Ruiz.)

*Asturias* (Quer, Lag.): Pravia (Lag.)

*Leon* (Quer).

*Castilla la Vieja* (Quer): montes de Burgos (Quer).

*Castilla la Nueva* (Lag.): Galapagar (Lag.)

*Andalucia* (Clem., Cabr.): Medina-Sidonia (Clem.), Sierra del Algibe, Alcalá de los Gazules (Cabr.), provincia de Málaga en Guarcies, Sierra-Bermeja, Sierra de Tolox (Boiss.), Sierra-Nevada (L. Seoane).

*Portugal* (Grisl., Vand., Brot.)

*Var. ε articulata* Ach. *Schær.* *Usnea articulata* Hoffm. *Lichen articulatus* L. Dill. *Musc.*, t. 11, f. 4. *Engl. bot.*, t. 258, f. 1. Cataluña en el Monserrat (E. Bout.), Menorca (Ramis).

*Var. ζ dasypoga* Fr. *Schær.* *Usnea barbata* DC. *Lichen purpurascens lusitanicus, capillaceo folio, major* Tournef. Inst. 550. *Lichen arboreus, capillaceus, purpureus, major, lusitanicus* F. Nav. *Lichen XVI Quer.* *Lichen barbatus* L. Dill. *Musc.*, t. 12, f. 6. *Engl. bot.*, t. 258.

Cataluña (Quer, E. Bout.): Pirineos (Quer), Monserrat (E. Bout.)

Aragon (Asso); Villarluengo (Xarne).

Asturias (Quer).

Galicia (Colm., Lge.): Rubianes (Colm.), Pico Sagro (Lge.)

León (Quer).

Castilla la Vieja (Quer): montes de Burgos (Quer).

Castilla la Nueva (Colm., Wk.): Pardo (Colm.), Sierra de Guadarrama (Wk.)

Andalucía (Wk.): Sierra de Palma, Medina-Sidonia (Wk.), cercanías de Gibraltar (Wk., Kel.), Sierra de Andévalo (Colm.)

Baleares (Weyl.): Mallorca (Serra), Menorca (Ramis).

Portugal (Tournef., Vand.): Coimbra (D. Bapt.)

Nombr. vulg. Cast. *Usnea* (R. de Tud.), Barbas de encina, Barbas de arbol menudas (F. Nav.), Musgo de árboles (S. Ruiz). Port. *Anthele qu Anthelio*, *Musgo dos carvalhos* (Brot.)

Balear. Barba de ausina, Herba de pañal (Serra), Herba de roca (Ramis.)

### Chlorea.

*Ch. vulpina* Nyl. *Lichen vulpinus* L. *Flor. dan.*, t. 226. *Jacq. Misc.*, t. 10, f. 4. *Evernia vulpina* Ach. *Cornicularia vulpina* DC.

Hab. España (Clem.) y Portugal (Brot.) sobre los troncos de las coníferas y los maderos en los Pirineos y otros montes de varias provincias, hallándose en las meridionales á la al-

tura de 2.400-6.000' (Clem.), ó acaso á la de 4.000' por lo ménos. (n. v.)

*Andalucía* (Clem.): Picacho de Alcalá de los Gazules, Sauceda, Ubrique, Júscar, Baza (Clem.), Borreguiles de Dilar en la Sierra-Nevada (L. Seoane).

*Portugal* (Brot.): montes de Cintra, Serra de Estrella (Brot.)

#### RAMALINEAS.

---

#### Alectoria.

**A. jubata Ach.** *Lichen XVII Quer. Lichen jubatus L. Dill. Musc., t. 12, f. 7. Engl. bot., t. 1880. Cornicularia jubata DC.*

Hab. España (Quer, Lag.) y Portugal (Brot.) sobre las piedras y los troncos, principalmente de las coníferas, en los montes de varias provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 4.000-6000' (Boiss.) y más arriba (Clem.) la variedad (v. s.)

*Cataluña* (Quer): Pirineos (Quer).

*Aragon* (Quer): Pirineos, Jaca (Quer).

*Prov. Vascongadas* (Mieg): Gorbea (Mieg).

*Asturias* (Lag.): Arvas (Lag.)

*Castilla la Vieja* (Colm.): San Ildefonso (Colm.)

*Castilla la Nueva* (Wk.): Sierra de Guadarrama (Wk.)

*Andalucía* (Clem., Boiss.): Sierra de Tolox (Clem., Boiss.), Sierra-Nevada (L. Seoane).

*Portugal* (Brot.)

*Var. β chalybeiformis Ach.* *Lichen chalybeiformis L. Dill. Musc., t. 13, f. 10. Engl. bot., t. 180 β.* Aragon en Orihuela de Albarracín, Tronchon (Asso) y Villarluengo (Xarne), Asturias en Arvas, Leon en Busdongo, Castilla la Nueva en el Paular (Lag.), Andalucía en la Sierra de Tolox (Clem., Boiss.), y Portugal (Brot.).

### Dufourea.

**D. madreporeiformis Ach.** *Parmelia mollusca Clem.*  
*Ens. non Ach. Evernia madreporeiformis Fr.*

*Hab.* España sobre los árboles, rocas y tierra en Andalucía cerca de Medina-Sidonia, Alcalá de los Gazules, Júscar, Cabo de Gata, llegando á la altura de 2.400' (Clem.) próximamente (n. v.)

### Evernia.

**E. divaricata Ach.** *Lichen divaricatus L. Dill. Musc.*  
*t. 12, f. 5. Usnea flaccida Hoffm. Physcia divaricata Duby.*

*Hab.* España en el valle de Aran (Villers) y en Galicia (L. Seoane), pendiente de los ramos de las coníferas. (n. v.)

**E. Prunastri Ach.** *Lichen Prunastri L. Dill. Musc.,*  
*t. 21, f. 55. A. Engl. bot., t. 859 Physcia Prunastri DC.*

*Hab.* España (Lag., Salcedo) y Portugal (Brot.) sobre los árboles en todas las provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 3.000-4.000' (Boiss.), mucho más arriba y abajo (Clem.) hasta cerca del mar. (v. v.)

*Aragon* (Xarne, Pardo, Loscos): Villaruengo (Xarne), Peñarroya (Pardo, Loscos).

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.)

*Galicia* (Camiña, R. Bust.): Tuy (R. Bust.)

*Leon* (Lge.): Villafranca del Vierzo (Lge.)

*Castilla la Vieja* (Lag.): Rioja (Lag.)

*Castilla la Nueva* (Lag.): Madrid, Guadarrama (Lag.), Pardo (Colm.), Casa de Campo y la Herrería (Graells).

*Valencia* (Lag.)

*Andalucia* (Clem., Boiss.): Portugos (Clem.), Sierra-Bermeja (Boiss.), Medina-Sidonia (Wk.), Sanlúcar de Barrameda, Sierra de Andévalo (Colm.).

*Portugal* (Brot.)

*Nombr. vulg. Cast.* Musgo arbóreo (Farmac.) *Port.* Musgo das amexieiras, Orzella do reyno (Brot.)

*Var. ð phellina Ach.* España sobre los alcornoques (Schousb.)

**E. furfuracea Mann.** *Lichen XXIII Quer. Lichen furfuraceus L. Dill. Musc., t. 21, f. 52. Engl. bot., t. 984. Borrera furfuracea Ach. Physcia furfuracea DC.*

*Hab.* España (Quer, Asso) y Portugal (Brot.) en los montes sobre la tierra, los árboles y rocas en diferentes provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 3.000-6.000' (Boiss.) y más arriba (Clem.) en diversas localidades. (v. v.)

*Cataluña* (Quer, E. Bout.): Pirineos (Quer), Monserrat (E. Bout.)

*Aragon* (Asso): Villarluengo (Xarne), Peñarroya (Pardo, Loscos).

*Santander* (Salcedo, Lag.)

*Asturias* (Quer, Lag.): Arvas (Lag.)

*Galicia* (L. Seoane): cercanías de Santiago (L. Seoane).

*Leon* (Quer): Busdongo (Lag.)

*Castilla la Vieja* (Quer): montes de Burgos (Quer), Rioja (Lag.), San Ildefonso (Née, Colm.)

*Castilla la Nueva* (Lag., Wk.): Cuenca, Escorial (Lag.), Sierra de Guadarrama (Lag., Colm., Wk.), El Paular (Née).

*Valencia* (Clem., Lag.): Titáguas (Clem.), Alcoy (Lag.)

*Andalucia* (Clem., Bory, Hæns.): Carratraca (Clem., Hæns.), cerro de Trebenque (Bory, Clem.), Sierra de Baza, Sierra-Nevada, Sierra de Tolox, Sierra del Pinar, La Sagra, Grazalema (Clem.), Sierra del Algibe, Alcalá de los Gazules (Cabr.), Sierra de la Nieve, Sierra-Bermeja (Boiss.), Sierra de Yunquera (Wk.).

*Portugal* (Brot.): montes de Jerez, Serra de Estrella (Brot.)

### Ramalina.

**R. calicaris Fr.** *R. fraxinea Schær.*

*Hab.* España (Quer, Lag.) y Portugal (Brot.) sobre los troncos de los árboles y los leños en muchas provincias, llegando en las meridionales á la altura de 7.200' (Clem.) y pre-

sentando diferentes variedades antes de ahora tenidas por especies. (v. v.)

*Var.  $\alpha$  fraxinea Fr.* *Ramalina fraxinea Ach.* *Lichen III*  
*Quer.* *Lichen fraxineus L.* *Dill. Musc.*, *t. 22, f. 59. Engl.*  
*bot.*, *t. 1181. R. fraxinea  $\alpha$  ampliata Schær.* — Es forma suya  
 la *Ramalina fraxinea  $\beta$  tæniata Ach.* mencionada por Cle-  
 mente é indicada en la Talla de Pitres (Clem.)

*Cataluña* (Villers, E. Bout.): Valle de Aran (Villers, Lag.),  
 Monserrat (E. Bout.)

*Aragon* (Lag., Pardo, Loscos): Valderrobles, Peñarroya  
 (Pardo, Loscos).

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.): Arvas (Lag.)

*Castilla la Vieja* (Lag.): Rioja (Lag.), San Ildefonso (Colm.),  
 Torme (Pereda).

*Castilla la Nueva* (Lag.): Guadarrama, Escorial (Lag.)

*Valencia* (Lag., Clem.): Alcoy (Lag.), Titaguas (Clem.)

*Andalucía* (Clem.): Picacho de Alcalá de los Gazules,  
 Caniles, Talla de Pitres (Clem.), Sierra de Tolox (Clem.,  
 Boiss.), Sanlúcar de Barrameda (Lag.), Jaen (L. Seoane).

*Var.  $\beta$  fastigiata Fr.* *Ramalina fastigiata Ach.* *Lichen*  
*fastigiatus Pers.* *Dill. Musc.*, *t. 22, f. 62. C.*, *t. 21, f. 55. B.*  
*Engl. bot.*, *t. 890.*

*Valencia* (Lag.); Alcoy (Lag.)

*Andalucía* (Clem., Hæns.): Sierra de Baza (Clem.), inme-  
 diaciones de Carratraca (Clem., Hæns.)

*Var.  $\gamma$  canaliculata Fr.* *Ramalina fastigiata  $\gamma$  calicaris*  
*Ach.* *Lichen calicaris L.* *Dill. Musc.*, *t. 23, f. 62. A. B.*

*Cataluña* (E. Bout.): Monserrat (E. Bout.)

*Aragon* (Pardo, Loscos).

*Santander* (Salcedo).

*Castilla la Nueva* (Lge.): Sierra-Morena (Lge.)

*Valencia* (Clem.): Titaguas (Clem.)

*Andalucía* (Clem.): Córdoba, Málaga, Pajarete (Clem.),  
 Caniles (Lag.), Carratraca (Hæns., Boiss.), Sierra de Tolox  
 (Boiss.), Medina-Sidonia (Wk.)

*Portugal* (Brot.)

*Var.  $\delta$  farinacea Nyl.* *Ramalina farinacea Ach.* *Lichen*

*farinaceus* L. Engl. bot., t. 889. *Physcia farinacea* DC.—Son formas suyas la *Ramalina farinacea* e *phalerata* Ach. y la *R. farin.* ζ *pendulina* Ach. mencionadas por Clemente, y además la var. *canaliculata* Clem. Ens., todas indicadas en Andalucía: la primera en Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Cabo de Gata (Clem.); la segunda en Serón (Clem.); y la tercera en Pajarete, Sierra del Pinar, cerro de San Cristóbal (Clem.), así como en Valencia cerca de Titaguas (Clem.) También parece corresponder á este lugar como var. *rubens* el *Lichen rubens* Brot. designado en Portugal (Link, Brot.)

*Cataluña* (Villers): valle de Aran (Villers), Monserrat (E. Bou.).

*Aragón* (Asso, Xarne, Lag.): Villarluengo (Xarne), Cogulla (Loscos).

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.)

*Castilla la Nueva* (Cut., Amo).

*Valencia* (Clem.): Titaguas (Clem.)

*Andalucía* (Clem.): Pajarete, Picacho de Alcalá de los Gazules, Sierra del Pinar, Júscar, Grazalema, cerro de San Cristóbal, Málaga, Cabo de Gata, Serón (Clem.)

*Portugal* (Vand., Brot.)

*R. pollinaria* Ach. Schær., t. 1, f. 4. *Lichen pollinarius* Ach. Dill. Musc., t. 21, f. 57. Engl. bot., t. 1607.

*Physcia squarrosa* DC.

Hab. España (Lag., Salcedo) sobre los troncos de los árboles y arbustos, é igualmente sobre las rocas en diversas provincias. (v. s.)

*Aragón* (Wk., Pardo, Loscos).

*Prov. Vascongadas* (Wk.): Pirineos (Wk.)

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.)

*León* (Lag.): Busdongo (Lag.)

*Castilla la Nueva* (Lag.): Escorial (Lag.)

*Andalucía* (Lge.): Puerto de Santa María, Cabo de Gata (Lge.)

Var. β *rupestris* Flk. Schær. Pirineos (Schær.), Sierra-

Nevada en las rocas de Vacares á la altura de 7.500-10.000  
(Boiss.)

**R. polymorpha Ach.** *Lichen polymorphus* Ach. *Nov. act. Stockh.*, t. 11, f. 3. *L. tinctorius* Web. *Ramalina tinctoria* Schær.

*Hab.* España (Lag., Clem.) sobre las rocas en los montes de diversas provincias, llegando en las meridionales á la altura de 8.550' (Clem.) próximamente. (v. s.)

*Santander* (Salcedo): Taruey (Salcedo).

*Asturias* (Lag.): Valgrande, Arvas (Lag.)

*Castilla la Nueva* (Lge.): Guadarrama (Lge.)

*Valencia* (Clem.): Titaguas (Clem.)

*Andalucia* (Clem., Lag.): Sierra-Nevada (Clem., Boiss., Reut.), Algaida de Sanlúcar de Barrameda (Clem., Lag.), Cabo de Gata (Clem., Lag., Lge.)

*Var.  $\alpha$  ligulata* Ach. Algaida de Sanlúcar de Barrameda, Sierra-Nevada, llegando á la altura de 8.670 (Clem.)

*Var.  $\beta$  flabellulata* Ach. Cabo de Gata en el cerro del Fraile, Sierra-Nevada, llegando á la altura de 5.400' (Clem.)  
*Cast.* Lámaga en Gerez de la Frontera (Clem.), como los demás líquenes no crustáceos.

**R. scopulorum Ach.** *Lichen scopulorum* Retz. *L. calicaris* Flor. dan., t. 959. Dill. *Musc.*, t. 17, f. 38. Engl. *bot.*, t. 688. *Physcia scopulorum* DC.

*Hab.* España (Lag., Lge.) sobre los peñascos marítimos en algunas provincias. (v. s.)

*Asturias* (Lag.)

*Galicia* (Lge.): Coruña (Lge.)

*Valencia?* (Lag.)

#### CETRARIEAS.

#### Cetraria.

**C. islandica Ach.** Schær., t. 2, f. 2. *Lichen islandicus* L. Dill. *Musc.*, t. 28, f. 111. Engl. *bot.*, t. 1330. *Physcia islandica* DC.

*Hab.* España (Nipho, Larruga, Xarne, Née, Lag.) y Portugal (A. da Silveira) sobre la tierra en los montes de las provincias septentrionales y centrales á la altura de 6.000' (Wk.) en diversas localidades. (v. v.)

*Cataluña* (Villers, Salvañá): Valle de Arán (Villers), Mataró? (Salvañá), Pirineos (Bassag.), montes de Nuria (Texid.)

*Aragon* (Xarne, Lag.): Villarluengo (Xarne), Cantavieja (Lag.), Moncayo (Wk.), Tarazona (Jubera).

*Navarra* (Née): Roncesvalles, Alto Biscar (Née), Pirineos (Lag.)

*Santander* (Lag.)

*Asturias* (Lag., Dur., Pastor): Puerto de Pajares y cercanías de la Colegiata de Arvas (Lag.), Pico de Arvas (Dur.)

*Galicia* (R. Bust.): Tuy (R. Bust.), Pontevedra, Orense (L. Seoane).

*Leon* (Lag.)

*Castilla la Vieja* (Nipho, Larruga): Burgos (Nipho, Larruga).

*Castilla la Nueva* (Reut.): Guadarrama en San Rafael (Reut.)

*Portugal* (A. de Silveira).

*Nombr. vulg.* Líquen de Islandia (Palau). *Port.* Musgo islándico (A. de Silveira).

*C. aculeata* Fr. *Cornicularia aculeata* Ach. *Dill. Musc.*, t. 17, f. 31. *Lichen hispidus* Lightf. *Engl. bot.*, t. 452. *L. aculeatus* Ehrh. Schreb.

*Hab.* España (Lag., Colm.) y Portugal (Brot.) sobre la tierra en los matorrales y bosques de diversas provincias. (v. v.)

*Asturias* (Lag.): Arvas (Lag.)

*Galicia* (Lge.): cercanías de Lugo (Lge.)

*Leon* (Lge.): Villafranca del Vierzo (Lge.)

*Castilla la Nueva* (Colm., Graells): Pardo (Colm.), Escorial en los prados de Cubillos (Graells).

*Andalucía* (Wk.): Bonanza (Wk.)

*Portugal* (Brot.)

*Var.  $\alpha$  campestris* Schær. *Cornicularia spadicea* Ach. *Coralloides aculeatum* Hoffm., t. 55, f. 2. Cercanías de Madrid en

Chamartin, San Fernando y Ribas (Lag.); Andalucía en Alcalá de los Gazules, Sierra del Algibe, Ubrique, Cerro de la Fuente cerca de Medina-Sidonia, hallándose á la altura de 1.200-6.000' (Clem.) y Portugal (Brot.)

### Platysma.

#### **P. nivale Nyl.** *Cetraria nivalis Ach.*

Hab. España en el Valle de Arán (Villers, Lag.) y en la Sierra-Nevada (L. Seoane) en terrenos secos y estériles. (n. v.)

#### **P. juniperinum Nyl.** *Lichen juniperinus L. Hoffm., t. 22, f. 1. Cetraria juniperina Ach. Physcia juniperina DC.*

Hab. España (Villers, Xarne) sobre la tierra, los enebros, pinos y otros árboles. (v. s.)

Cataluña (Villers): valle de Arán (Villers).

Aragón (Xarne): Villarluengo (Xarne).

Andalucía (L. Seoane): Sierra-Nevada (L. Seoane).

Var.  $\alpha$  *terrestre* Schær. Pirineos (Lge.)

#### **P. glaucum Nyl.** *Lichen glaucus L. Dill. Musc., t. 25, f. 96. Engl. bot., t. 1606. Cetraria glauca Ach. Physcia glauca DC.*

Hab. España (Asso, Lag., Clem.) sobre los troncos de los árboles y las piedras en varias provincias, hallándose en las centrales á la altura de 4.500-5.000' (Wk.) y en las meridionales á la de 3.900-7.200' (Clem.) próximamente. (v. s.)

Cataluña (Texid.): Pirineos y demás montes (Texid.).

Aragón (Asso): cercanías de Tronchon (Asso), Palomar (Loscos).

Asturias (Lag.): Valgrande (Lag.)

Castilla la Nueva (Lag.): Guadarrama (Lag., Wk., Lge.).

Puerto de Fuenfría (Wk.), San Rafael, etc. (Graells).

Valencia (Clem.): Titáguas (Clem.)

Andalucía (Clem.): Sierra de Tolox y otras partes en la Serranía de Ronda, Sierra del Pinar, Grazalema, Júscar, (Clem.), Sierra de la Nieve, Sierra-Bermeja (Boiss.)

Var.  $\beta$  *fallax* Ach. *Lichen fallax* Web. Dill. Musc., t. 22, f. 58. Engl. bot., t. 2373. Pirineos (Texid.)

**P. sæpinolum Hoffm.** *Cetraria sæpincola* Ach.  
*Lichen scutatus* Wulf. in Jacq. Collect. IV, t. 18, f. 1.  
 Hab. España en Galicia cerca de Lugo (L. Seoane) sobre  
 los árboles. (n. v.)

PELTIGEREAS.

---

**Nephroma.**

**N. resupinatum** Ach. Schær. *Lichen XIII et XIV*  
*Quer. Lichen resupinatus* L. Dill. *Musc.*, t. 28, f. 105. *Peltigera resupinata* DC.

Hab. España (Quer, Xarne, Lag., Clem.) y Portugal  
 (Brot.) sobre la tierra, los árboles y rocas en diversas pro-  
 vincias, hallándose en las meridionales á la altura de 7.000'  
 (Clem.) y algo más (v. v.)

*Cataluña* (E. Bout.): Monserrat (E. Bout.)

*Aragon* (Xarne): Villaruengo (Xarne).

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Quer, Lag.): Arvas (Lag.)

*Galicia* (Quer, Colm.): Rubianes (Colm.), inmediaciones  
 de Tuy (L. Seoane).

*Leon* (Quer, Lag.): Busdongo (Lag.)

*Castilla la Vieja* (Quer): Burgos (Quer).

*Andalucia* (Clem.)

*Portugal* (Brot.): Cintra, Gerez, cercanías de Coimbra  
 (Brot.)

Var.  $\alpha$  *tomentosum* Schær. *Nephroma tomentosum* Nyl.

*Peltigera tomentosa* Hoffm. *Lichen resupinatus* Engl. *bot.*,  
 t. 305.

Var.  $\beta$  *lævigatum* Schær. *Nephroma lævigatum* Ach.—Es  
 forma suya la var. *papyracea* Ach., indicada en las montañas  
 de Santander (Salcedo), y parece serlo igualmente la var. *mi-  
 crocarpa* Clem. *Ens.*, designada en Andalucía á la altura de  
 2.400-5.400' (Clem.) en Medina-Sidonia, Picacho de Alcalá  
 de los Gazules, monte del Algibe, Ubrique, Caniles, Sierra  
 del Pinar, Grazalema (Clem.).

**N. lusitanicum Schær.**

*Hab.* Portugal (Rudeo) sobre los troncos de los árboles.  
(n. v.)

**Peltigera.**

**P. aphthosa Hoffm.** *Lichen aphthosus L. Dill. Musc., t. 28, f. 106. Engl. bot., t. 1119. Peltidea aphthosa Ach.*

*Hab.* España (Lag., Salcedo) sobre la tierra y los musgos en las provincias septentrionales principalmente (v. s.)

Santander (Salcedo, Lge.): cercanías de Santander en la Peña-Castillo (Lge.)

Asturias (Lag.): Arvas (Lag.)

Galicia (L. Seoane): cercanías de Vigo, Tuy, Ferrol (L. Seoane).

Andalucia (L. Seoane): Sierra-Morena, Sierra-Nevada (L. Seoane).

Baleares (Weyler).

**P. canina Hoffm.** Schær., t. 2, f. 4, *Lichen IV Quer. Lichen caninus L. Dill. Musc., t. 27, f. 102. Engl. bot., t. 2299. Peltidea canina Ach.*

*Hab.* España (Quer, Asso) y Portugal (Brot., Figueir.) sobre la tierra y piedras en los montes y selvas de muchas provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 5.000-7.500' (Boiss.) ó 3.000-9.000' (Clem.) más bien. (v. v.)

Cataluña (E. Bout., Graells): Monserrat (E. Bout.)

Aragon (Quer, Asso, Lag.): Pirineos; Moncayo (Quer), Tronchon (Asso), Villarluengo (Xarne), Castellote, Peñarroya (Pardo, Loscos).

Santander (Salcedo).

Asturias (Pastor).

Galicia (Quer, Colm.).

Leon (Lag.): Busdongo (Lag.)

Castilla la Vieja (Quer): montes de Avila (Quer).

Castilla la Nueva (Quer): circuito de Madrid, barranco de Cantarranas (Quer), Escorial (Lag.), Pardo (Colm.)

Valencia (Cav., Clem.): Titaguas (Clem.)

*Andalucía* (Quer., Clem.): Sierra-Nevada (Quer.), Jaén (Lag., Clem.), Sierra-Nevada en el barranco de Trevélez, Puerto del Rejon, Mecina de Buen Varon (Clem.), Sierra-Nevada en las rocas de Vacares (Boiss.), pinar de Grazalema (Häns., Boiss.), Sierra-Nevada en el Callejon de los Diablos (L. Seoane).

*Portugal* (Brot., Figueir.): cercanías de Coimbra (Brot., Figueir.)

*Nomb. vulg. Cast.* Hepática (A. Lus., Jarav.), Hepática de tierra ó terrestre (Quer.), Hepática terrestre (Farmac.), Li-  
quen perruno (M. Jimen.) *Port.* Figadella (A. Lus.), Musgo canino (Brot.), Musgo dos caês damnados (Brot., Figueir.)

*P. rufescens* Hoffm. *Lichen XII* Quer. *Lichen ru- fescens* Neck. Dill. *Musc.*, t. 27, f. 103. *Engl. bot.*, t. 2300. *Peltidea rufescens* Fr. exs.

*Hab.* España (Clem., Salcedo) sobre la tierra y los árboles en diversas provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 3.000' (Clem.) y más (v. s.)

*Santander* (Salcedo).

*Galicia* (Lge.): cercanías de Lugo (Lge.), inmediaciones de Padron, Cuntis y Puente San Payo (L. Seoane).

*Andalucía* (Clem.): Medina-Sidonia, Alcalá de los Gazules (Clem., Lag.)

*P. polydactyla* Hoffm. *Lichen polydactylus* Neck.  
*Dill. Musc.*, t. 28, f. 107, 108. *Peltidea polydactyla* Ach.

*Hab.* España (Lag., Salcedo) sobre la tierra en varias provincias. (v. s.)

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.): Arvas, Valgrande, Villamar (Lag.)

*Galicia* (L. Seoane): cercanías de Caabeiro (L. Seoane).

*Castilla la Nueva* (Lag.): Madrid en la Casa de Campo, Escorial (Lag.)

*Var.  $\beta$  scutata* Fr. *Lichen scutatus* Dicks. *Engl. bot.*, t. 1834. *Lichen rufescens* Wulf. *Peltidea hymænina* Ach. *P. scutata et collina* Ach. Galicia cerca de Vigo y Tuy (L. Seoane), Medina-Sidonia y Real de la Jara en Andalucía á la altura de 3.000' (Clem.)

*P. horizontalis* Hoffm. *Lichen horizontalis* L. *Dill.*

*Musc.*, t. 28, f. 104. *Engl. bot.*, t. 888. *Peltidea horizontalis Ach.*

*Hab.* España en las montañas de Santander (Salcedo) sobre las piedras y entre los musgos (n. v.)

**P. venosa Hoffm.** *Lichen venosus L. Dill. Musc.*, t. 28, f. 109. *Engl. bot.*, t. 887. *Peltidea venosa Ach.*

*Hab.* España en las montañas de Santander (Salcedo, Lag.) y en las de Castilla la Vieja cerca de San Ildefonso (Clem., Rodr.) sobre la tierra en sitios sombrios y húmedos. (v. s.)

### Solorina.

**S. saccata Ach.** *Schær.*, t. 2, f. 5. *Lichen saccatus L. Dill. Musc.*, t. 30, f. 121. *Peltigera saccata DC.*

*Hab.* España (Clem., Lag.) en los montes sobre la tierra al pie de los árboles y sobre las rocas en varias provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 8.000-9.000' (Boiss.) y más abajo (Clem.) en diversas localidades. (v. s.)

*Cataluña* (Cav.): Monserrat (Cav.)

*Aragon* (Pardo, Loscos): Castellote, Peñarroya (Pardo, Loscos).

*Santander* (Salcedo, Lge.): cercanías de Santander en la Peña-Castillo (Lge.)

*Asturias* (Lag., Dur.): Pico de Arvas (Lag., Dur.)

*Galicia* (L. Seoane): cercanías de Carballo (L. Seoane).

*Leon* (Lag.): Villadangos (Lag.)

*Valencia* (Clem.): Titáguas (Clem.)

*Andalucia* (Clem., Boiss.): Picacho de Alcalá de los Gázares, Sierra del Pinar y otras partes en la Serranía de Ronda, Júscar (Clem.), Sierra-Nevada en la vertiente occidental del Corral de Veleta (Boiss.)

**S. crocea Ach.** *Lichen croceus L. Dill. Musc.*, t. 30, *Engl. bot.*, t. 498. *Peltigera crocea Hoffm.*

*Hab.* España (Villers, Lge.) sobre la tierra y entre las hendiduras de las rocas en el valle de Arán (Villers), Puerto de Benasque (Lge.) y otras partes de los Pirineos. (n. v.)

## PARMELIAS.

## Sticta.

**S. pulmonacea** Ach. *S. pulmonaria* Schär., t. 3, f. 1. *Pulmonaria muscus* Grisl. *Muscus coralloides pulmonarius* Grisl. *Lichen I* Quer. *Lichen pulmonarius* L. Dill. *Musc.*, t. 29, f. 113. *Engl. bot.*, 572. *Lobaria pulmonaria* Hoffm.

Háb. España (Lagun., Quer) y Portugal (Grisl., Vand.) sobre los troncos de los árboles en muchas provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 4.000-6.000' (Boiss.) y más abajo (Clem.) en diversas localidades. (v. v.)

*Cataluña* (Palau, Villers, Lag.): valle de Arán (Villers), Monserrat (E. Bout.), Mataró (Salvañá), Vallés (Texid.)

*Aragon* (Palau, Xarne): Villarluengo (Xarne), Tarazona (Jubera).

*Navarra* (Née): Irati, Roncesvalles, Silveli, Orbaiceta, Articusa, valle de Bastan (Née, H. de Greg.)

*Santander* (Salcedo, Lag.): valle de Toranzo (R. de Salazar, S. Ruiz).

*Asturias* (Lag., Pastor): Arvas, Valgrande, (Lag.)

*Galicia* (Sarm., Colm.): Santiago (Colm.), Betanzos (L. Seoane).

*Leon* (Juan Rodr.): Ponferrada (Juan Rodr.).

*Castilla la Vieja* (Nipho, Larruga): Burgos (Nipho, Larruga), Rioja (Lag.)

*Castilla la Nueva* (Cav., Colm.): El Pualar (Cav.)

*Valencia* (Cav., Lag.): monte Palomera (Cav.), Ares, Cati. Benasel (J. Vilan.)

*Andalucía* (Clem., Boiss.): Picacho de Alcalá de los Gázaules, Sierra del Pinar, Júscar, Grazalema (Clem.), cerro de San Cristobal, Pinar de Grazalema (Hæns., Boiss.), Sierra de Palma (Wk.), cercanías de Gibraltar (Kel.)

*Extremadura* (Villaescusa): Alange (Villaescusa).

*Portugal* (Grisl., Vand., Brot.): Coimbra y norte del reino (Brot., Figueir.)

*Baleares* (Ramis, Weyler): Menorca (Ramis).

*Nombr. vulg. Cast.* Pulmonaria (Lagun., Jarav., Sarm.), Lichen, Pulmonaria de árbol (Quer), Lichen, Empeine, Pulmonaria de árbol (Palau), Pulmonaria mohosa (Nipho, Larrruga), Sarna de las peñas, Camisa de las peñas (F. Nav.), Pulmonaria arbórea (Farmac.), Pulmonaria de árboles (M. Jimen., S. Ruiz), Pulmonaria de roble (M. Jimen.), Pulmonaria de encina (M. Jimen., R. de Salazar). *Port.* Epática, Pulmonaria, Estrellada (Mout.), Hepática das árvoreas, Pulmonaria das árvores ou dos carvalhos (Brot.) *Balear.* Herba de roca (Ramis).

**S. scrobiculata Ach.** *Lichen scrobiculatus* Scop. Dill. Musc., t. 29, f. 114. Engl. bot., t. 497. *Lichen verrucosus* Huds. *Pulmonaria verrucosa* Hoffm. *Lobaria scrobiculata* DC.

*Hab.* España (Lag., Clem.) y Portugal (Brot.) sobre la tierra entre los musgos, al pie de los árboles y sobre las rocas en algunas provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 6.000' (Clem.) todo lo más. (v. s.)

*Santander* (Salcedo, Lag.)

*Asturias* (Lag.)

*Galicia* (Lge.): Pico Sagro (Lge.)

*Andalucía* (Clem.): Alcalá de los Gazules (Clem.)

*Portugal* (Brot.): cercanías de Coimbra (Brot.)

**S. sylvatica Ach.** *Lichen sylvaticus* L. Dill. Musc., t. 27, f. 101. Engl. bot., t. 2398. *Pulmonaria sylvatica* Hoffm. *Peltigera sylvatica* Hoffm.

*Hab.* España (Xarne, Salcedo) y Portugal (Brot.) en los montes entre los musgos junto á las rocas y al pie de los árboles, en las provincias septentrionales principalmente. (v. v.)

*Aragon* (Xarne): Villaruengo (Xarne).

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.): Arvas (Lag.)

*Galicia* (Colm.): Santiago (Colm.), Ferrol (L. Seoane).

*Portugal* (Brot.): Serra de Gerez (Brot.)

**S. contracta.** *Lichen contractus* Brot.

*Hab.* Portugal cerca de la Quinta das Sette Fontes y en otras partes de las inmediaciones de Coimbra sobre los troncos y raíces de los olivos viejos (Brot.)

**S. aurata** Ach. *Lichen auratus* Sm. Engl. bot., t. 2359. *Sticta crocata* DC. Fr. *Lichen crocatus* L. Engl. bot., t. 2110.

*Hab.* España (Xarne, Lag.) sobre la tierra y los troncos de los árboles entre los musgos en varias provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 2.700-3.900' (Clem.) en varias localidades. (n. v.)

*Aragon* (Xarne): Villarluengo (Xarne).

*Andalucia* (Clem.): Saucedo de Cortes, Ubrique, Alcalá de los Gazules (Clem.)

### Ricasolia.

**R. glomulifera** De Not. *Lichen glomuliferus* Lightf. *Dill. Musc.*, t. 26, f. 99. *Engl. bot.*, t. 293. *Lobaria glomulifera* Hoffm. *Sticta glomulifera* Delise.

*Hab.* España (Lag., Clem.) y Portugal (Brot.) sobre los árboles viejos y las rocas en varias provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 5.400' (Clem.) próximamente. (v. s.)

*Cataluña* (Villers): valle de Arán (Villers).

*Santander* (Lag., Salcedo): Reinosa (Lag.)

*Asturias* (Lag.): Valgrande, Arvas (Lag.)

*Leon* (Lge.): Las Medolas en el Vierzo (Lge.)

*Andalucia* (Clem.): Sierra del Pinar (Clem.)

*Portugal* (Brot.): montes de Arrabida en la Beira boreal y cercanías de Coimbra (Brot.)

**R. herbacea** De Not. *Lichen herbaceus* Huds. *Dill. Musc.*, t. 25, f. 98. *L. laetevirens* Lightf. *Engl. bot.*, t. 294. *Pulmonaria herbacea* Hoffm. *Sticta herbacea* Delise.

*Hab.* España (Poir.) en las montañas de Santander (Salcedo) sobre los árboles y rocas entre los musgos. (v. s.)

### Parmelia.

**P. caperata Ach.** *Schær.*, t. 3, f. 2. *Lichen XI*  
*Quer. Lichen caperatus L. Dill. Musc.*, t. 25, f. 97. *Engl. bot.*, t. 654. *Imbricaria caperata DC.*

*Hab.* España (Quer, Asso, Lag.) y Portugal (Brot.) sobre los árboles y rocas en varias provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 2.100-6.000' (Clem.), y más abajo en las demás. (v. v.)

*Cataluña* (Villers, E. Bout.): valle de Arán (Villers, Lag.), Monserrat (E. Bout.), Esparraguera (Colm.)

*Aragon* (Asso): cercanías de Epila (Asso), Peñarroya (Loscos).

*Prov. Vascongadas* (Fée): San Sebastian (Fée).

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.): Villamar (Lag.)

*Galicia* (Lge.): Coruña en los escollos marítimos (Lge.), Caldas de Reyes (L. Seoane).

*Castilla la Vieja* (Lag.): Rioja (Lag.), valle de Mena (Salcedo).

*Valencia* (Cav., Lag.): Titáguas (Clem.)

*Andalucía* (Clem., Hæns.): Carratraca (Clem., Hæns.), cerro de las Zorreras, Alcalá de los Gazules, Sierra del Pinar, Júscar (Clem.), Sierra de la Nieve (Boiss.), Granada (L. Seoane).

*Portugal* (Brot.): cercanías de Coimbra (Brot.)

**P. perlata Ach.** *Lichen perlatus L. Dill. Musc.*, l. 20, f. 39. *Lobaria perlata DC.*

*Hab.* España (E. Bout., Clem.) y Portugal (Brot.) sobre los árboles y rocas en diversas provincias, hallándose generalmente en las meridionales á la altura de 2.100-7.200' (Clem.), y al nivel del mar en las septentrionales. (v. s.)

*Cataluña* (Villers): valle de Arán (Villers), Monserrat (E. Bout.)

*Prov. Vascongadas* (Fée): San Sebastian (Fée).

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.): Valgrande (Lag.)

*Galicia* (Lge.): Coruña en los escollos marítimos (Lge.), inmediaciones de Lugo, Orense (L. Seoane).

*Andalucía* (Clem., Hæns.): Carratraca (Clem., Hæns.), cerro de las Zorreras, Picacho de Alcalá de los Gazules, Sierra del Pinar (Clem.), Granada (L. Seoane).

*Portugal* (Brot.): Beira y otras partes cerca de Coimbra (Brot.)

*Var.  $\beta$  olivetorum* Ach. *Lichen dubius* Wulf. Picacho de Alcalá de los Gazules (Clem.) y otras partes (Schousb.)

*Var.  $\gamma$  perforata* Colm. *Parmelia perforata* Clem. *Ens. non Ach.* Andalucía en la Algaida de Sanlúcar de Barrameda (Clem.), y Portugal en la Serra de Cintra (Guthnik).

*P. tiliacea* Ach. *Lichen tiliaceus* Ehrh. Hoffm., t. 16, f. 2. Engl. bot., t. 700. *L. quercifolius* Wulf. *L. quercinus* W. *Imbricaria quercina* DC.

*Hab.* España (Salcedo, Lag., Clem.) y Portugal (Brot.) sobre las cortezas de los árboles y las rocas en muchas provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 1.800-4.500' (Clem.) próximamente. (v. v.)

*Aragon* (Pardo, Loscos): Peñarroya (Pardo, Loscos).

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Pastor).

*Galicia* (L. Seoane): cercanías de Lugo (L. Seoane).

*Castilla la Nueva* (Colm.)

*Valencia* (Clem.): Titágua (Clem.)

*Andalucía* (Clem., Hæns.): Carratraca (Clem., Hæns.), Sanlúcar de Barrameda (Clem., Lag.), Alcalá de los Gazules Sierra del Pinar (Clem.), inmediaciones de Cadiz (Duf.), cercanías de Casares en la falda de la Sierra-Bermeja (Hæns., Boiss.), Granada (L. Seoane).

*Portugal* (Brot.): Gerez (Brot.)

*Baleares* (Weyler).

*Var.  $\beta$  scortea* Dub. *Parmelia scortea* Ach. Aragon en Peñarroya (Loscos).

*Santander* (Salcedo).

*Castilla la Vieja* (Duf.): Burgos, Sierra de Guadarrama  
(Def.)

*Castilla la Nueva* (Lag.): Chamartin, Escorial, Guadarrama (Lag.)

*Andalucia* (Clem., Haens.): Carratraca (Clem., Haens.),  
Picacho de Alcalá de los Gazules (Clem.)

**P. sinuosa Ach.** *Lichen lavigatus Sm. Engl. bot.*,  
*t. 1852. L. sinuosus Sm. Engl. bot.*, *t. 2050. L. sinuatus Clem.*

*Hab.* España en Titáguas (Clem.), pueblo de Valencia, y  
en Galicia cerca de la Coruña (L. Seoane) sobre los troncos  
de los árboles y las piedras (n. v.)

**P. Borreri Turn. Ach.** *Lichen Borreri Sm. Engl.*  
*bot.*, *t. 1780.*

*Hab.* España (Clem., Lag.) sobre las cortezas de los árboles  
y las vigas. (n. v.)

*Var.  $\beta$  stictica Dub.* Andalucía en Sanlúcar de Barrameda  
(Clem., Lag.)

**P. saxatilis Ach.** *Lichen saxatilis L. Dill. Musc.*, *t.*  
*24, f. 83. Engl. bot.*, *t. 603. Imbricaria retiruga DC.*

*Hab.* España (Quer, Asso) y Portugal (Vand., Brot.)  
sobre los árboles y rocas en varias provincias, hallándose  
en las meridionales á la altura de 4.000-6.000' (Boiss.), ó  
bien á la de 1.800-7.200' (Clem.), en diversas localidades.  
(v. v.)

*Cataluña* (E. Bout.): Monserrat (E. Bout.)

*Aragon* (Asso): Panticosa (H. Ruiz).

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Quer, Lag.): Arvas, Peñafurada (Lag.)

*Galicia* (Quer, Lag.): cercanías de Santiago (L. Seoane).

*Leon* (Quer, Lag.)

*Castilla la Vieja* (Quer, Lag.): Burgos (Quer), Rioja  
(Lag.)

*Castilla la Nueva* (Colm.): cercanías de Madrid (Colm.)

*Valencia* (Clem., Lag.): Titáguas (Clem.)

*Andalucia* (Clem., Boiss.): Alcalá de los Gazules, Caniles,  
Talla de Pitres, Júscar, Benaoceaz, Carratraca (Clem.), Sierra-  
Nevada (Lag., L. Seoane), Sierra de Tolox (Boiss.)

*Portugal* (Vand., Brot.)

*Nombr. vulg. Cast.* Parmelia de las peñas (Lag.) *Port.* Usnea dos cráneos, Usnea ordinaria (Brot.), Usnea saxatil (Figueir.)

*Var.  $\beta$  omphalodes Fr.* *Parmelia omphalodes Ach.* *Lichen omphalodes L.* *Dill. Musc.*, t. 24, f. 80. *Engl. bot.*, t. 604. *Imbricaria adusta DC.*

*Asturias* (Lag., Dur.): Arvas (Lag.), monte situado al oriente del Naviego (Dur.)

*Galicia* (Lge.): cercanías de Lugo (Lge.)

*León* (Lge.): Villafranca del Vierzo (Lge.)

*Valencia* (Clem.): Titáguas (Clem.)

*Andalucía* (Clem., Hæns.): Carratraca (Clem., Hæns.) Pícajho de Alcalá de los Gazules (Clem.), cercanías de Málaga (Prol.)

*Portugal* (Vand.)

*P. physodes Ach.* *Lichen V Quer.* *Lichen physodes L.* *Dill. Musc.*, t. 20, f. 49. *Engl. bot.*, t. 126. *Imbricaria physodes DC.* *Parmelia ceratophylla Schär.*

*Hab.* España (Quer, Lag.) y Portugal (Brot.) sobre los troncos de los árboles, las rocas y tierra en varias provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 4.000-6.000' (Boiss.), más arriba (Clem.) en algunas localidades. (v. s.)

*Cataluña* (Villers): Valle de Aran (Villers).

*Aragón* (Lag.): Peñarroya (Loscos).

*Santander* (Salcedo): Liébana (Salcedo).

*Asturias* (Quer, Lag.)

*Galicia* (Quer): Cuntis, Caldas de Reyes (L. Seoane).

*León* (Lge.): Villafranca del Vierzo (Lge.)

*Castilla la Vieja* (Quer): cercanías de Burgos, montes de Navalengua (Quer).

*Castilla la Nueva* (Quer): El Paular (Quer).

*Valencia* (Clem.): Titáguas (Clem.)

*Andalucía* (Clem.): Sierra de Tolox y otras partes de la Serranía de Ronda, Júscar (Clem.), Sierra de la Nieve (Boiss.)

*Portugal* (Brot.): provincias septentrionales (Brot.)

**P. encausta Ach.** *Lichen encaustus Sm. Trans. Linn., t. 4, f. 6. Engl. bot., t. 2049. Imbricaria encausta DC. Parmelia physodes β encausta Fr.*

*Hab.* España en los Pirineos (Duf.), Asturias al oriente del Naviego (Dur.) y la Sierra-Nevada (Boiss., L. Seoane) sobre las rocas. (n. v.)

**P. conspersa Ach.** *Lichen conspersus Ehrh. Engl. bot., t. 2097. Imbricaria conspersa DC. Lichen centrifugus Auct. non L. Squammaria centrifuga Hoffm.*

*Hab.* España (Lag., Salcedo) y Portugal (Brot.) sobre las piedras en varias provincias. (v. s.)

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.): Valgrande (Lag.)

*Galicia* (L. Seoane): inmediaciones de Tuy (L. Seoane).

*Castilla la Nueva* (Lag.): cercanías de Madrid, Retiro, Chamartín, Galapagar, Escorial (Lag.)

*Andalucía* (L. Seoane): cercanías de Granada (L. Seoane).

*Portugal* (Brot.)

**P. Acetabulum Fr.** *Lichen VII Quer. Lichen Acetabulum Neck. Dill. Musc., t. 24, f. 79. Imbricaria Acetabulum DC.*

*Hab.* España (Quer, Pozo) sobre los troncos de los árboles en varias provincias. (v. s.)

*Cataluña* (Quer): Monserrat y Pirineos (Quer).

*Aragón* (Pardo, Loscos): Castelserás (Pardo, Loscos).

*Castilla la Vieja* (Pozo): Rioja (Pozo).

*Castilla la Nueva* (Quer): Hoz de Beteta, Señorío de Molina (Quer).

**P. olivacea Ach.** *Lichen II Quer. Lichen olivaceus L. Dill. Musc., t. 24, f. 77, 78. Engl. bot., t. 2180. Imbricaria olivacea DC.*

*Hab.* España (F. Nav., Quer, Lag.) y Portugal (Vand., Brot.) sobre las cortezas de los árboles y las rocas en muchas provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 1.500-7.200' (Clem.) y más abajo. (v. v.)

*Cataluña* (E. Bout.): Monserrat (E. Bout.)

*Aragón* (Pardo, Loscos): Peñarroya (Loscos).

*Santander* (Salcedo).

*Castilla la Vieja* (Salcedo): valle de Mena (Salcedo).

*Castilla la Nueva* (Lag.): Escorial (Lag.) cercanías de Madrid (Colm.), El Paular, Sierra de Guadarrama (Wk.)

*Valencia* (Clem.): Titáguas (Clem.)

*Andalucía* (Clem., Hæns.): Carratraca (Clem., Hæns.), Picacho de Alcalá de los Gazules, Córtes, Benaozaz, Grazalema, Talla de Pitres, monte Javalcol, Júscar, Desierto de las Nieves, Sierra del Pinar, Portugos, Ujíjar, Cabo de Gata, Albox, Huércal, Sierra de Baza, La Sagra (Clem.), cercanías de Córdoba, Granada, Sierra-Elvira, Sierra-Nevada en el barranco de San Juan (L. Seoane).

*Portugal* (Vand., Brot.): cercanías de Coimbra (Brot.)

*Nombr. vulg. Cast.* Sarnosa cenicienta (F. Nav.)

*Var.  $\beta$  aspidota* Ach. Picacho de Alcalá de los Gazules (Clem.)

**P. stygia** Ach. *Lichen stygius* L. Hoffm., t. 14, f. 2.

*Imbricaria stygia* DC. *Parmelia fahlunensis*  $\beta$  *stygia* Schær. Engl. bot., t. 2048.

*Hab.* España en las cercanías de Madrid, camino del Pardo (Clem.) y en los Pirineos (Duf.) sobre las piedras. (n. v.)

**P. fahlunensis** Ach. *Lichen fahlunensis* L. Hoffm., t. 12, f. 2. Engl. bot., t. 653. *Imbricaria fahlunensis* DC.

*Hab.* España (Salcedo, Clem.) y Portugal (Brot.) sobre las rocas en los montes de algunas provincias. (n. v.)

*Santander* (Salcedo).

*Andalucía* (L. Seoane): Sierra-Nevada en lo alto (L. Seoane).

*Portugal* (Brot.): montes de Gerez (Brot.)

*Var.  $\beta$  hepatizon* Ach. Andalucía á la altura de 2.700' en el Picacho de Alcalá de los Gazules (Clem.) sobre las piedras entre los musgos.

**P. lanata** Nyl. *Lichen lanatus* L. Engl. bot., t. 846.

*Cornicularia lanata* Ach. *Parmelia stygia*  $\beta$  *lanata* Mey. Fr.

*P. fahlunensis*  $\delta$  *lanata* Schær.

*Hab.* España (Villers, Dur.) y Portugal (Brot.) sobre las piedras en algunas provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 9.000' (Boiss.), y más abajo en las septentrionales. (v. s.)

*Cataluña* (Villers): Valle de Aran (Villers).

*Asturias* (Dur.): monte situado al oriente del Naviego (Dur.)

*Andalucía* (Boiss.): Sierra-Nevada (Boiss.)

*Portugal* (Brot.): montes de Gerez, Serra de Estrella (Brot.)

**P. tristis Nyl.** *Lichen tristis* Web. *Dill. Musc.*, t. 17, f. 37. *Engl. bot.*, t. 720. *Cornicularia tristis* Hoffm. *Cetraria tristis* Fr. *Parmelia fahlunensis* y *tristis* Schær.

*Hab.* España (Villers, Dur.) y Portugal (Brot.) sobre las rocas, en los Pirineos y otros montes de varias provincias. (v. v.)

*Cataluña* (Villers): valle de Arán (Villers).

*Asturias* (Dur.): monte situado al oriente del Naviego (Dur.)

*Castilla la Vieja* (Colm.): San Ildefonso (Colm.)

*Castilla la Nueva* (Lge.): Cuelga-Muros sobre el Escorial (Lge.)

*Portugal* (Brot.): montes de Gerez (Brot.)

### Phycia.

**Ph. flavicans DC.** *Lichen flavicans* Sw. *Dill. Musc.*, t. 13, f. 16. *Engl. bot.*, t. 2113. *Parmelia seu Borrera flavicans* Ach. *Evernia flavicans* Fr. *Cornicularia flavicans* Schær.

*Hab.* España (Duf., Féé) y Portugal (Guthnik) sobre los troncos de los árboles, y entre los musgos en los Pirineos y otros montes de algunas provincias. (v. s.)

*Galicia* (Lge.): Pico Sagro (Lge.)

*Portugal* (Guthnik): Serra de Cintra (Guthnik).

**Ph. villosa Schær.** *Parmelia seu Borrera villosa* Ach. *Dill. Musc.*, t. 21, f. 53. *Evernia villosa* Fr.

*Hab.* España (Lag., Clem.) y Portugal (Link, Holl.) sobre los árboles y arbustos en algunas provincias, y principalmente en las meridionales, llegando en ellas á la altura de 600' (Clem.) ó algo más. (v. s.)

*Andalucía* (Lag., Clem.): Granada (Lag.), Sanlúcar de Barrameda, Coto de Oñana, Marismillas, Cabo de Gata, (Clem.), inmediaciones de Cádiz (Duf.), Coto del Puerto de Santa María (Wk., Lge.)

*Portugal* (Link, Holl.)

*Ph. intricata* Schær. *Lichen intricatus* Desf. *Flor. atl.*, t. 253, f. 3. *Parmelia seu Borrera atlantica* Ach. *Evernia intricata* Fr.

Hab. España (Clem., Duf.) sobre los árboles y arbustos en las provincias meridionales, llegando en ellas á la altura de 4.500' (Clem.) próximamente. (v. s.)

*Andalucía* (Clem., Duf.): Algaida de Sanlúcar de Barrameda, Coto de Oñana, Sierra de Baza (Clem.), cercanías de Cádiz, Cabo de Gata (Clem., Boiss.)

*Ph. chrysophthalma* DC. Schær. *Lichen chrysophtalmus* L. Dill. *Musc.*, t. 13, f. 17. *Engl. bot.* t. 1088. *Parmelia seu Borrera chrysophtalma* Ach. *Platism denudatum et armatum* Hoffm. *Lichen armatus* Brot.

Hab. España (Clem.) y Portugal (Brot.) sobre los árboles y arbustos en algunas provincias, y principalmente en las meridionales, llegando en ellas á altura de 2.100' (Clem.) poco más ó menos. (v. s.)

*Andalucía* (Clem.): Algaida de Sanlúcar de Barrameda, Alcalá de los Gazules, Ubrique, Sierra del Valle hacia Gerez de la Frontera (Clem.)

*Portugal* (Brot.): Extremadura portuguesa, Beira, cercanías de Coimbra (Brot.)

*Var. aurea* Colm. *Parmelia capensis* Clem. *Lichen et Flor. bæt. ined. non Ach.* Thallus filiformis ad divisuras præcipue subcompressus, lœvis, aureus, rigidiusculus, intus spongiosus, albus; ramis divaricatis, attenuatis, subflexuosis, ramulosis, diffusis; scutellis saturate aureis, integerrimis. Clem., loc. cit. Andalucía en la Sierra del Algibe, Alcalá de los Gazules, Ubrique á la altura de 2.400-3.000' (Clem.), sobre los árboles y piedras.

*Ph. parietina* Nyl. *Lichen VIII et IX Quer.* *Lichen parietinus* L. Dill. *Musc.*, t. 24, f. 76. *Parmelia seu Borrera parietina* Ach. *Imbricaria parietina* DC.

*Hab.* España (Quer, Cav.) y Portugal (Vand., Brot.) sobre las paredes, piedras, tejas y cortezas de los árboles en todas las provincias, llegando á la altura de 10.500' (Clem.) en varias localidades. (v. v.)

*Cataluña* (E. Bout., Colm.): Monserrat (E. Bout.), Mataró (Salvañá), Gerona (Texid.).

*Aragon* (H. Ruiz, Jubera): Panticosa (H. Ruiz), Tarazona (Jubera), Peñarroya (Pardo, Loscos).

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Pastor).

*Galicia* (Colm., R. Bust.)

*Castilla la Nueva* (P. de Escob.): Madrid (P. de Escob., Lag., Colm.)

*Valencia* (Clem.): Titáguas (Clem.)

*Andalucía* (Clem., Hæns.): Carratraca (Clem., Hæns.), Conil, Alcalá de los Gazules (Clem.), Málaga (Prol.), Sierra de la Niebla (Boiss.), Granada (Wk.), Sierra-Nevada (L. Seoane).

*Portugal* (Vand., Brot.)

*Baleares*: Menorca (Hern., Camb., Oleo).

*Var.  $\beta$  chlorina Dub. Lichen X Quer. Imbricaria chlorina Chev.* España (Quer) en Cataluña (Texid.)

*Nombr. vulg. Cast.* Empeine (Nebr.), Sarna de los árboles (F. Nav.), Líquen de las tapias (G. Ort.), Líquen de paredes (Bassag.)

**Ph. candelaria** Nyl. *Lichen candelarius* Auct. plur. non *L. Engl. bot.*, t. 1794. *Parmelia seu Lecanora candelaria*  $\alpha$  Ach. *Parmelia parietina* var. *Fr.* Schær. — Parece ser forma suya la *Lepraria brotryoides* Engl. bot., t. 2148, non DC.

*Hab.* España (Asso, P. de Escob.) y Portugal [(Brot.?) sobre los troncos de los árboles, piedras, tejas y muros en varias provincias, llegando en las meridionales á la altura de 12.762' (Clem.) próximamente. (v. v.)

*Cataluña* (E. Bout.): Monserrat (E. Bout.)

*Aragon* (Asso, Lag.): Villarluengo (Xarne).

*Galicia* (L. Seoane): Padron, Caldas de Reyes (L. Seoane).

*Castilla la Nueva* (P. de Escob.): Madrid (P. de Escob.)

*Valencia* (Clem.): Titáguas (Clem.)

*Andalucía* (Clem.): Sierra-Nevada en el Mulahacen, Portugos, Sierra de Baza, inmediaciones de Barbate, Serranía de Ronda, Sierra de Tolox, Benaojan, Ronda, Alcalá de los Gazules, Cabo de Gata (Clem.)

*Portugal* (Brot.?)

*Var.* ó *lychnaea* Ach. *Borreria lychnea* Delise. Sierra-Nevada en el Mulahacen, cercanías de la laguna de Vacares, Trevélez, Benalmedina, Caniles, Sierra de Lujar (Clem.)

*Ph. ciliaris* DC. Schær., t. 2, f. 1. *Lichen XXII*  
*Quer.* *Lichen ciliaris* L. Tourn. *Inst.*, t. 325, f. C. D. Engl. bot., t. 1352. *Parmelia seu Borrera ciliaris* Ach.

*Hab.* España (Quer, Asso) y Portugal (Brot.) sobre los troncos de los árboles en diversas provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 3.000-6.000' (Clem., Boiss.) por lo comun. (v. v.)

*Cataluña* (Texid.): comarca de Olot (Texid.)

*Aragon* (Asso, Xarne, Lag.): cercanías de Tronchon (Asso), Villarluengo (Xarne), Peñarroya (Loscos), Fiscal (Nuet.)

*Navarra* (Lag.)

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.): Arvas (Lag.)

*Castilla la Vieja* (Graells, Colm.): San Ildefonso (Graells, Colm.)

*Castilla la Nueva* (Lag.): Escorial (Novoa), El Paular (Wk.)

*Valencia* (Cav., Lag.): Carrascal de Alcoy (Cav., Lag.), Titáguas (Clem.)

*Andalucía* (Clem.): Carratraca (Clem., Hæns.), cercanías de Capileira, Trevélez, Portugos, monte Nimar, quebrada de Javalcol, Sierra de María, Castril, Sierra de Tolox, Sierra del Algibe, Júscar, Ronda, Convento de las Nieves (Clem.), Alcalá de los Gazules (Cabr.), Sierra de la Nieve (Boiss.), Sierra-Nevada (L. Seoane).

*Portugal* (Brot.): Beira boreal (Brot.)

*Var. γ solenaria Schær.* *Physcia solenaria Dub.* Galicia cerca de Cuntis (L. Seoane).

**Ph. leucomela Mich.** *Dub. Muscus in Ilice Clus. Hisp. Lichen leucomelas L. Dill. Musc., t. 21, f. 50. Engl. bot., t. 2548. Parmelia seu Borrera leucomelas Ach. Parmelia speciosa β Mong. et Nestl.—Lichen atro-setiger Brot. ex Schær.*

*Hab.* España en Andalucía (Clus., Clem., Lag., Beut.) sobre los árboles y rocas en el Picacho de Alcalá de los Gázaules, Sierra del Algibe, La Sauceda, Ubrique, á la altura de 2.100-3.000' (Clem.); en Galicia cerca de los Puentes de García Rodríguez (L. Seoane); y Portugal en las cercanías de Coimbra, entre la Quinta das Mayas y San Anton dos Olivaes (Brot.) sobre los árboles musgosos. (n. v.)

**Ph. speciosa Fr.** *Parmelia speciosa Ach. Lichen speciosus Wulf. Jacq. in Coll. III, t. 7.*

*Hab.* España en Andalucía cerca de Chiclana y Gerez de la Frontera (L. Seoane), sobre los troncos de los árboles. (n. v.)

**Ph. stellaris Nyl.** *Lichen XXI Quer. Lichen stellaris L. Mich., t. 43, f. 2. Dill. Musc., t. 24, f. 70. Parmelia stellaris Ach. Imbricaria stellaris Ach.*

*Hab.* España (Quer, Lag., Salcedo) y Portugal (Brot.) sobre las cortezas de los árboles en varias provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 9.000' (Clem.) y más abajo. (v. v.)

*Aragon* (Pardo, Loscos).

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Pastor).

*Castilla la Nueva* (Lag.): Escorial, Ribas, San Fernando (Lag.), cercanías de Madrid (Colm.)

*Valencia* (Clem.): Titáguas (Clem.)

*Andalucía* (Clem., Hæns.): Carratraca (Clem., Hæns.), La Sagra, montes de Baza, Sierra-Nevada, inmediaciones de la laguna de Vacares, Trevélez, Sierra-Bermeja, Sierra del Piñar, Júscar, Portugos, Talla de Pitres, Grazalema, cerro de San Cristóbal (Clem.)

*Portugal* (Brot.)

*Var. β hispida* Fr. Schær. *Lichen hispidus* Auct. Engl. bot., t. 1351. *Physcia leptalea* DC. España en Andalucía sobre los árboles y arbustos en Chiclana, Medina-Sidonia, Talla de Pitres, Sierra-Nevada, Cabo de Gata (Clem.), Sanlúcar de Barrameda (Lag.), llegando á la altura de 7.800' (Clem.); y Portugal en las cercanías de Coimbra y otras partes en Beira (Brot.)

*Var. γ tenella* Schær. *Lichen tenellus* Scop. Engl. bot., t. 1351. *Parmelia seu Borrera tenella* α Ach. *Physcia tenella* DC. España sobre los árboles y arbustos en Aragón (Pardo, Loscos), Castilla la Nueva cerca de Ribas, San Fernando y Madrid dentro del Jardín botánico (Lag.), y en Andalucía en la Sierra-Nevada, Sierra del Pinar, Alcalá de los Gazules, Grazalema, Cabo de Gata (Clem.) y Puerto de Santa María (Lge.), llegando á la altura de 7.200' (Clem.)

*Ph. astroidea* Nyl. *Parmelia astroidea* Clem. Ens. P. Clementi Turn. P. Clementiana Ach. Trans. Linn. IX, t. 13, f. 1. Engl. bot., t. 1779.

Hab. España (Lag., Clem., Duf.) sobre las cortezas lisas de los árboles, llegando en las provincias meridionales á la altura de 3.000' (Clem.) y más arriba. (n. v.)

*Var. α sideralis* Schær. *Parmelia sideralis* Ach. Andalucía en las cercanías de Cazalla (Clem.)

*Var. β Caricæ* Schær. *Parmelia Caricæ* Clem. Ens. Lecanora Caricæ Ach. Andalucía en las inmediaciones de Chiclana y Medina-Sidonia (Clem.)

*Ph. cæsia* Nyl. *Lichen cæsius* Hoffm., t. 12, f. 1. Dill. Musc., t. 24, f. 70. Engl. bot., t. 1052. *Parmelia cæsia* Ach. *Imbricularia cæsia* DC.

Hab. España en Andalucía (Clem.) sobre las rocas en la Sierra-Nevada, barranco de Trevélez, falda de la Sierra-Pelada cerca de Coin y otras partes á la altura de 7.200-12.762' (Clem.), en Galicia (L. Seoane), y Portugal en Beira y Entre-Duero y Miño (Brot.)

*Ph. muscigena* Nyl. *Lichen muscigenus* Wahlenb. *Parmelia muscigena* Ach.

Hab. Pirineos (Nyl.), Galicia en las cercanías del Ferrol y Puentedeume (L. Seoane) entre los musgos. (n. v.)

**Ph. pulverulenta Nyl.** *Lichen pulverulentus Schreb.*  
*Dill. Musc., t. 24, f. 71.* *Parmelia pulverulenta Ach.* *Imbricaria pulverulenta DC.*

*Hab.* España (Lge., Salcedo, Clem.) y Portugal (?) sobre las cortezas de los árboles en muchas provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 5.100-9.000' (Clem.) próximamente. (v. s.)

*Aragon* (Pardo, Loscos): Castelserás (Pardo, Loscos).

*Santander* (Salcedo): Liébana (Salcedo).

*Prov. Vascongadas* (Lag.): Irun (Lag.).

*Galicia* (L. Seoane): Neda, cercanías del Ferrol (L. Seoane).

*Castilla la Nueva* (Lag.): Madrid en el Retiro y la Casa de Campo (Lag.).

*Valencia* (Lag.): Alcoy (Lag.).

*Andalucía* (Clem.): Picacho de Alcalá de los Gazules, Sierra-Bermeja, barranco de Trevélez y otras partes en la Sierra-Nevada (Clem.), Sierra de la Nieve (Boiss.), cercanías de Granada (Wk.).

*Vár. β pytirea Nyl.* *Lichen seu Parmelia pytirea Ach.*  
*Engl. bot., t. 2064.* *P. pulverulenta γ grisea Schær.* Cercanías de Madrid en el Retiro y la Casa de Campo (Lag.).

*Var. ε venusta Schær.* *Parmelia venusta Ach.* *Meth., t. 8,*  
*f. 5.* *Imbricaria venusta DC.* Valencia (Lag.), Andalucía en el Picacho de Alcalá de los Gazules, Talla de Pitres, Sierra de Tolox, barranco de Trevélez, Sierra de Baza (Clem.) y otras partes (Lag.), Galicia cerca de Pontevedra (L. Seoane), y Portugal (Schousb.).

**Ph. obscura Nyl.** *Lichen seu Parmelia cycloselis Ach.*  
*Engl. bot., t. 1492.* *Imbricaria cycloselis DC.*

*Hab.* España (Lag.) y Portugal (?) sobre las cortezas de los árboles y las rocas en diversas provincias. (v. v.)

*Aragon* (Pardo, Loscos): Torrecilla, Castelserás (Pardo, Loscos).

*Galicia* (Colm.): Rubianes (Colm.), Padron (L. Seoane).

*Castilla la Nueva* (Lag.): cercanías de Madrid en el Retiro, Ribas y San Fernando (Lag.).

*Valencia* (Clem.): Titáguas (Clem.).

*Andalucia* (Clem.): Grazalema (Clem.)

*Var. β ulothrix Fr.* *Parmelia ulothrix Ach. Dill. Musc., t. 24, f. 72.* *Imbricaria ulothrix DC.* Cercanías de Madrid en la Casa de Campo (Lag.)

**Ph. aquila Nyl.** *Lichen seu Parmelia aquila Ach. Dill. Musc., t. 24, f. 69.* *Engl. bot., t. 982.* *Imbricaria aquila DC.*

*Hab.* España (Clem., Fée) sobre las rocas marítimas principalmente, ó en las próximas al mar en varias provincias, elevándose en las meridionales á la altura de 6.000' (Clem.) todo lo más. (n. v.)

*Prov. Vascongadas* (Fée): San Sebastian (Fée).

*Santander* (Salcedo).

*Galicia* (L. Seoane): cercanías de Vivero, rocas marítimas de Vigo (L. Seoane).

*Andalucia* (Clem.): Picacho de Alcalá de los Gazules, Sierra del Algibe, Medina-Sidonia (Clem.)

*Var. β platyphylla Lge.* Galicia cerca de Lugo (Lge.)

#### GIROFOREAS.

---

#### Umbilicaria.

**U. pustulata Hoffm.** *Lichen VI Quer.* *Lichen pustulatus L. Dill. Musc., t. 30, f. 131.* *Engl. bot., t. 1283.* *Gyrophora pustulata Ach.*

*Hab.* España (Quer, Clem., Salcedo) y Portugal (Vand., Brot.) sobre las rocas en varias provincias, hallándose en las centrales y meridionales á la altura de 5.000-6.000' (Wk.), y llegando en las meridionales á la de 7.500' (Clem.) en algunas localidades. (v. v.)

*Aragon* (Pardo, Loscos): Pirineos cerca de Panticosa (Wk.)

*Santander* (Salcedo): Cabuérniga (Salcedo).

*Asturias* (Lag., Dur.): Arvas (Lag.), monte situado al oriente del Naviego (Dur.)

*Galicia* (Herb. Madr., Lge.): cercanías de Cuntis y Caldas de Reyes (L. Seoane).

*Castilla la Vieja* (Wk.): Sierra de Guadarrama cerca de la laguna de Peñalara (Wk.)

*Castilla la Nueva* (Quer): Escorial (Quer, Colm.), Alcarria, Serranía de Cuenca (Quer).

*Andalucía* (Clem.): Córdoba, Picacho de Alcalá de los Gazules y toda la Sierra, Júscar, Cortes (Clem.), Granada (L. Seoane).

*Portugal* (Vand., Brot.)

**U. atro-pruinosa** Schær. Ser. *U. anthracina* Schær.

*Lichen anthracinus* Wulf. Jacq. Misc. II, t. 3, f. 4.

Hab. España en Andalucía en el Picacho de Alcalá de los Gazules á la altura de 1.800-3.300' (Clem.), sobre las rocas. (n. v.)

Var.  $\beta$  *tesselata* Schær. *Umbilicaria tessellata* Dub. *Gyrophora tessellata* Ach. Cercanías de Madrid en la Casa de Campo (Lag.)

**U. polyphylla** Hoffm. *Lichen polyphyllus* L. Dill. Musc., t. 30, f. 129. Engl. bot., t. 1282. *Gyrophora glabra* Ach. *Umbilicaria glabra* DC.—*Lecidea Turneri* Clem. Ens.? ex Spr.—*Lichen hydromelas* Brot.?

Hab. España (Clem., Lge.) en la Sierra de Guadarrama sobre las rocas del cerro de las Aguilas (Lge.), sobre los árboles del Picacho de Alcalá de los Gazules en Andalucía (Clem.), y Portugal cerca de Coimbra en el Convento de las Teresas y en otras partes de Beira, sobre las rocas y piedras (Brot.), si la planta portuguesa es una forma de la especie. (n. v.)

**U. erosa** Hoffm. *Lichen erosus* Web. Dill. Musc., t. 30, f. 118. *Gyrophora erosa* Ach. Engl. bot., t. 2066.

Hab. España en Asturias en el monte situado al oriente del Naviego (Dur.) sobre las rocas. (n. v.)

**U. proboscidea** DC. *Lichen proboscideus* L. Flor. dan., t. 471, f. 3. *Gyrophora proboscidea* Ach. Engl. bot., t. 2484. *Umbilicaria polymorpha*  $\beta$  *deusta* Schær. *Lichen deustus* Quibisd. non *L. L. umbilicatus* Salcedo?

Hab. España (Salcedo, Bory, Clem.) en los Pirineos, las

montañas de Santander (Salcedo) y los Borreguiles de la Sierra-Nevada (Bory, Clem.) sobre las rocas. (n. v.)

*Var. γ arctica Fr. Dill. Musc., t. 30, f. 119. Gyrophora arctica Ach.* Sierra-Nevada á la altura de 7.000-10.000' (Boiss.)

**U. cylindrica Delise Dub.** *Lichen cylindricus L.* *Dill. Musc., t. 29, f. 116. Gyrophora cylindrica Ach. Engl. bot., t. 522 ex corrig. in indice. Umbilicaria polymorpha a cylindrica Schær., t. 2, f. 6.*

*Hab.* España (Lag., Dur.) en los Pirineos y otros montes sobre las rocas. (v. s.)

*Aragon* (Lag.)

*Asturias* (Lag., Dur.): Arvas (Lag.), Puerto de Leitariegos y monte situado al oriente del Naviego (Dur.)

*Castilla la Nueva* (Lag.): Sierra de Guadarrama en el Cerro de las Aguilas (Lge.)

**U. vellea Fr. excl. var. *hirsuta*. *Lichen velleus L.* *Dill. Musc., t. 82, f. 5. Gyrophora spadochroa et G. crustulosa Ach. Umbilicaria spadochroa et U. cirrhosa Hoffm. U. sacata DC.***

*Hab.* España (Salcedo, Lag.) sobre las rocas en los montes de varias provincias, elevándose en los de las meridionales á la altura de 10.500' (Clem.) en algunas localidades. (v. s.)

*Santander* (Salcedo, Poir.)

*Asturias* (Lag., Dur.): monte situado al oriente del Naviego (Dur.)

*Andalucía* (Clem.): Picacho de Alcalá de los Gazules, Sierra-Nevada en el barranco de Trevélez, Sierra de Baza (Clem.)

*Var. β lœta Clem. Lich. et Flor. bat. ined. Thallo subtus auroræ colore, versus marginem plerumque fusco-atro et saepe glabro, fibrillis concoloribus. Clem. loc. cit. Barranco de Trevélez (Clem.)*

**U. hirsuta DC.** *U. vellea γ hirsuta Fr. seu α hirsuta Schær. Lichen hirsutus Sw. Act. Stockh. 1794, t. 3, f. 1. Gyrophora hirsuta Ach.—Lichen subpeltatus Brot.?*

*Hab.* España en las montañas de Santander (Salcedo),

los Pirineos (Philippe) y la Sierra-Nevada en el Mulahacen (L. Seoane) sobre las rocas, y Portugal cerca de Coimbra (Brot.), si la planta portuguesa es una forma de la especie. (n. v.)

**U. murina DC.** *Gyrophora murina* Ach. *Engl. bot.*, t. 2486. *Lichen griseus* Sw. *Act. Stockh.* 1794, t. 2, f. 3. *Umbilicaria vellea a grisea* Schär.

*Hab.* España (Clem., Boiss.) sobre las rocas en los montes de varias provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 7.000-10.000' (Boiss.), y más arriba (Clem.) en diferentes localidades. (v. s.)

*Leon* (Lge.): Villafranca del Vierzo (Lge.)

*Castilla la Nueva* (Graells): Escorial en los prados de Cubillos, Guadarrama y otras partes (Graells).

*Andalucia* (Clem., Boiss.): Sierra de Baza (Clem.), Sierra-Nevada (Clem., Boiss.), barranco de Trevélez (Clem.)

**U. polyrhiza Stenh.** *Lichen polyrhizus* L. *Dill. Musc.*, t. 30, f. 130. *Lichen pellitus* Ach. *Engl. bot.*, t. 931. *Gyrophora pellita* Ach. *Umbilicaria pellita* DC.

*Hab.* España (Lag., Lge.) sobre las rocas en los montes de algunas provincias, y principalmente en los de las septentrionales. (v. s.)

*Leon* (Lag.): Busdongo (Lag.)

*Galicia* (Lge.): Lugo (Lge.)

**U. atro-papillulata.** *Gyrophora papillosa* Clem. *Lichen. et Flor. bæt. ined. sed non U. papillosa* DC. Thallo membranaceo, tenui, peltato? profunde partito, lævi, plano, supra atro-papillulato, fusco-fumoso; subtus fusco-cinereo, hirsuto; laciniis oblongis, obtusis, subintegerrimis et erosocrenatis, fibrillis brevibus; crenis minutissime subcrenulatis, margine sæpe papillulatis. Clem. loc. cit.

*Hab.* España en el Picacho de Alcalá de los Gazules á la altura de 1.800-3.000' (Clem.) sobre los musgos. (n. v.)

**U. crassa.** *Gyrophora crassa* Clem. *Lich. et Flor. bæt. ined.* Thallo coriaceo, peltato, inæqualiter lobato, cinereo; supra subrugoso, elevato, nigro-punctato; subtus fusco-atro aut fumoso, glebulis flosculo-pulverulentis, concoloribus, scabro. Clem. loc. cit.

*Hab.* España en el barranco de Trevélez á la altura de 9.600' (Clem.) sobre el granito. (n. v.)

#### LECANOREAS.

---

#### Psoroma.

**P. hypnorum** Nyl. *Lichen hypnorum* Vahl. *Engl. bot.*, t. 740. *Lecanora hypnorum* Ach. *Psora hypnorum* Hoffm. t. 63, f. 4-7. *Parmelia lepidora* Ach. *Parmelia hypnorum* Fr. Schär.

*Hab.* España (Salcedo, Boiss.) sobre la tierra y los musgos en algunas provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 9.000' (Boiss.), é inferiormente en las demás. (v. s.)

*Santander* (Salcedo).

*Andalucía* (Boiss.): Sierra-Nevada en la vertiente occidental del Corral de Veleta (Boiss.)

#### Pannaria.

**P. rubiginosa** Delise. *Lichen rubiginosus* Thunb. *L. affinis* Dicks. *Engl. bot.*, t. 983. *Parmelia rubiginosa* Ach. *Imbricaria cærulescens* DC.

*Hab.* España en las montañas de Santander (Salcedo, Lag.) y en Galicia cerca del Ferrol y Vigo (L. Seoane), sobre los troncos de los árboles y las rocas. (v. s.)

*Var. β conoplea* Nyl. *Parmelia conoplea* Ach. España (Lag.)

**P. plumbea** Delise. *Lichen plumbeus* Lightf. *Scot.* t. 26. *Dill. Musc.*, t. 24, f. 73. *Parmelia plumbea* Ach. *Imbricaria plumbea* DC.

*Hab.* España (Clem., Duf.) sobre las rocas y los troncos de los árboles en algunas provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 1.800-3.000' (Clem.) próximamente. (n. v.)

*Santander* (Salcedo).

*Galicia* (L. Seoane): inmediaciones de Pontevedra (L. Seoane).

*Castilla la Vieja* (Salcedo): valle de Mena (Salcedo).

*Andalucía* (Clem.): cercanías del Pícalo de Alcalá de los Gazules, Júscar, Sierra-Nevada en el Mulahacen (Clem.)

**P. triptophylla** Nyl. *Lecidea triptophylla*  $\alpha$  Ach. et *L. microphylla*  $\beta$  Ach. Dub. *Parmelia triptophylla* Fr.

Hab. España en Santander y en Andalucía cerca de Carratraca (Hæns., Boiss.) sobre los troncos de los árboles. (n. v.)

Var.  $\beta$  *nigra* Nyl. *Lichen niger* Sm. Engl. bot., t. 1161. *Lecidea nigra* Ach. *Collema nigrum* DC. *Lecidea triptophylla*  $\epsilon$  *corallinoides* Schær. Santander y Castilla la Vieja en el valle de Mena (Salcedo), cercanías de Madrid (L. Seoane), Andalucía en las inmediaciones de Cádiz y en las de Málaga (Clem.), sobre las rocas calizas.

**P. microphylla** Mass. *Lecidea microphylla* Ach. *Parmelia microphylla* Fr.

Hab. España sobre las rocas en Santander (Salcedo), en Galicia cerca de Vigo (L. Seoane), y en la Sierra-Nevada de Andalucía á la altura de 6.900' (Clem.) próximamente. (n. v.)

**P. ekistophylla.** *Lecidea ekistophylla* Clem. *Lich.* et *Fl. bæt. ined.* Crusta effusa et dispersa, imbricata, piceo-cinerea, glabriuscula, lobis minutissimis, subintegerrimis, subconvexis; patellulis atris, planis, subnitidis. Clem. loc. cit.—Es parecida á la *Pannaria microphylla* Mass.

Hab. España sobre el granito en la Sierra-Nevada de Andalucía á la altura de 6.900' (Clem.) próximamente. (n. v.)

**P. parmelioides.** *Lecidea parmelioides* Clem. *Lich.* et *Fl. bæt. ined.* Crusta tartarea, subeffigurata, squamoso-imbri-cata, cinerea, lœvi, valde diffracta; squamis seu fragmentis confertis, subincisis, tumidis, verrucæformibus, et adscendentibus, sinuoso-flexuosis, plerumque angustis, disformibus; patellulis nigris et nigro-plumbeis, planiusculis, cæsio-pru-nosis, lœvibus, margine ad lentem demum subcrenulata, inflexa. Clem. loc. cit.

*Hab.* España sobre el granito ó sus grietas con hierro especular en la Sierra-Nevada de Andalucía á la altura de 8.550-10.500' (Clem.) poco más ó menos. (n. v.)

**P. muscorum Delise.** *Lichen muscorum Osbek. Lecanora muscorum Ach. Lecidea muscorum Clem. Patellaria muscorum Spr. Parmelia muscorum Fr. Lichen carnosus Dick.*, t. 6, f. 7. *Engl. bot.*, t. 1684. *Parmelia carnosa Schær.*

*Hab.* España (Lag., Clem.) y Portugal (Brot.) sobre la tierra y las rocas encima de los musgos, y entre éllas en los sitios montuosos más ó menos elevados de diversas provincias. (v. s.)

*Asturias* (Lag.): Peñafurada (Lag.)

*Valencia* (Clem.): Titáguas (Clem.)

*Andalucía* (Clem.): Sierra-Nevada, Medina-Sidonia y otras partes (Clem.)

*Portugal* (Brot.): cercanías de Lisboa y otras partes en Extremadura y Beira (Brot.)

### Squamaria.

**S. crassa DC.** *Lichen crassus Huds. Dill. Musc.*, t. 24, f. 74. *Engl. bot.*, t. 1893. *Lecanora crassa Ach. Lichen laqueatus Wulf.*

*Hab.* España (Lag., Clem.) sobre la tierra y las rocas calizas en muchas provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 5.000-7.000' (Boiss.), y más arriba (Clem.) en varias localidades. (v. s.)

*Cataluña* (Lag.): Monserrat (Lag.)

*Aragón* (Pardo, Loscos).

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.): Puerto de Pajares (Lag.)

*Castilla la Vieja* (Lag.): Rioja (Lag.), Burgos, Sierra de Guadarrama (Duf.)

*Castilla la Nueva* (Lge.): Aranjuez (Lge.)

*Valencia* (Clem., Lag.): Titáguas (Clem.)

*Murcia* (Lag.)

*Andalucía* (Clem.): Chiclana, Alcalá de los Gazules, Ubrique, Cumbre del Pinar, Grazalema, cerro de San Cristobal,

Carratraca (Clem.), cercanías de Cádiz (Duf.), Sierra de la Nieve, Sierra-Nevada en el Pendon de Dilar (Boiss.) y cercanías de Granada (Lge.), Sierra-Nevada en el Picacho de Veleta y otras partes (L. Seoane).

*Var.  $\beta$  cæspitosa Rabenh.* Aragon cerca de Castelserás, en Peñarroya (Pardo, Loscos).

*Var.  $\gamma$  albescens Wk.* Cercanías de Granada sobre las rocas en las inmediaciones del acueducto de la Alhambra (Wk.).

*Var.  $\delta$  nivea Nyl. Lge.* Chiclana (Lge.)

**S. lentigera DC.** *Lichen lentigerus* Web. Engl. bot., t. 871. *Parmelia seu Lecanora lentigera* Ach. *Psora lentigera* Hoffm. *Lecanora crassa  $\alpha$  lentigera* Schær.

*Hab.* España (Lag., Clem.) y Portugal (Brot.) sobre la tierra, las piedras y musgos en los montes de muchas provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 150-6.000' (Clem.) próximamente. (v. v.)

Aragon (Pardo, Loscos).

Prov. Vascongadas (Fée): Vitoria (Fée).

Castilla la Nueva (Lag.): Aranjuez (Lag., Colm., Wk.), Madrid, Ribas y San Fernando (Lag.)

Valencia (Lag., Clem.): Titáguas (Clem.)

Andalucía (Lag., Clem.): Jaen (Lag.), Carratraca (Clem., Hæns.), Málaga (Clem., Hæns., Boiss.), Sierra de Gador, Castril, Portugos, Granada, Córdoba (Clem.), Chiclana, Sanlúcar de Barrameda (Lag.), cercanías de Cádiz (Duf.)

Portugal (Brot.): Coimbra (Brot.)

**S. viridi-fusca.** *Parmelia viridi-fusca* Clem. Lich. et Flor. bæt. ined. Crusta imbricata, viridi, viridi-fuscave, lobis seu squamis minutis, convexis, subinciso-lobatis, lævigatis; scutellis confertis, planis, demum convexis, rufo-luteis, parvis, margine tenui, integerrima, crista concolori. Clem. loc. cit.

*Hab.* España en Andalucía sobre la tierra y los musgos en Chiclana (Clem.) é inmediaciones. (n. v.)

**S. heleooides.** *Lichen heleooides* Brot.

*Hab.* Portugal sobre los olivos en las cercanías de Coimbra (Brot.) y en otras partes. (n. v.)

**S. gypsacea** Nyl. *Lichen gypsaceus* Sm. *Trans. Linn.* I, t. 4, f. 2. *Parmelia gypsacea* Fr. *Lecidea seu Lecanora Smithii* Ach. *Parmelia Smithii* Clem. *Lich. bæt. Squamaria Smithii* DC.

*Hab.* España (Lag., Clem., Hæns.) sobre la tierra y las rocas calizas en varias provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 3.000-7.500' (Clem.) poco más ó menos. (n. v.)

*Castilla la Nueva* (Lge.): Aranjuez (Lge.)

*Valencia* (Clem.): Titaguas (Clem.)

*Andalucia* (Clem., Hæns.): Carratraca (Clem., Hæns., Boiss.), Benaozaz, dehesa del Boyar, Sierra del Pinar, Grazalema, cerro de San Cristóbal, Torcal de Antequera, Júscar, Cortes (Clem.), cercanías de Cádiz (Duf.)

**S. Lagascæ** Nyl. *Lecanora Lagascæ* Ach. *Parmelia Lagascæ* Fr. *Urceolaria Lamarekii* DC. *Lecanora Lamarckii* Schær., t. 4, f. 1.

*Hab.* España (Lag., E. Bout.) en los Pirineos (Poir., Duf.) en el Monserrat de Cataluña (E. Bout.), y en Galicia (L. Seoane) sobre las rocas calizas. (n. v.)

**S. chrysoleuca** Nyl. *Lichen chrysoleucus* Sm. *Trans. Linn.* I, t. 4, f. 6. *Parmelia seu Lecanora chrysoleuca* Ach. *Squamaria rubina* Hoffm. *Parmelia rubina a chrysoleuca* Schær., t. 3, f. 4.

*Hab.* España (Schousb.) sobre las rocas en los Pirineos (Poir., Lag., Duf.) en el monte Cebrero de Galicia (L. Seoane) y en la Sierra-Nevada (Clem., Boiss., Wk.), principalmente en el barranco de Trevélez (Clem.), y tambien en el Cabo de Gata (Lag.), hallándose á la altura de 7.500-9.000' (Boiss.) y más arriba (Clem.) en algunas localidades. (v. s.)

*Var.  $\beta$  peltata* Nyl. *Squamaria peltata* DC. Pirineos (Poir.)

*Var.  $\gamma$  opaca* Ach. Nyl. *Squamaria melanopthalma* DC. *Lecanora liparia* Schleich. Pirineos (Ramond), Andalucia en Castril (Clem., Lag.), Jaen, Granada, Sierra-Nevada (L. Seoane).—La *Parmelia liparia v. olivacea* Clem. Ens., indicada por el mismo en Alcalá de los Gazules, parece ser una mera forma de la variedad.

*Var. δ melaloma Nyl.* *Parmelia crassa β melaloma Ach.*  
*P. plumbaginea Clem.?* *Lich. et Flor. bæt. ined.* Thallo cartilagineo, umbilicato, adpresso, profunde lobato, imbricato, luteo-virenti, lobis subrotundis, sublobato-crispis, subtus versicoloribus, reticulato-venosis; scutellis plumbeo-atris, concavis, margine ad lentem crenulato-inflexa. Clem. loc. cit. Sierra-Nevada sobre las rocas á la altura de 8.400-12.900' (Clem.)

**S. cartilaginea DC.** *Lichen cartilagineus Westr. Borr.*  
*Engl. bot. Suppl., t. 2802.* *Lecanora cartilaginea Ach.* *Lichen crassus Brot. non Huds.*

*Hab.* España en los Pirineos (Duf.) sobre las rocas y en la Sierra-Nevada á la altura de 7.500 (Boiss.) y Portugal en Extremadura y Beira no lejos de Lisboa y en los muros de la Quinta das Sette-Fontes, cerca de Coimbra (Brot.) especialmente. (n. v.)

*Var. β australis Hmpe.* Sierra-Nevada en lo alto (Wk.)

**S. saxicola Nyl.** *Lichen saxicola Pollich.* *Engl. bot., t. 1995.* *Parmelia seu Lecanora saxicola Ach.* *Lichen muralis Brot.* *Psora muralis Hoffm.* *Lecanora muralis Schær., t. 4, f. 2.* *Placodium ochroleucum DC.*

*Hab.* España (Lag., Clem.) y Portugal (Brot.) sobre las piedras, tejas y muros en varias provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 7.000-9.000' (Boiss.), y más arriba (Clem.) en diferentes localidades. (v. v.)

*Cataluña* (Villers): valle de Aran (Villers).

*Santander* (Salcedo.)

*Galicia* (L. Seoane).

*Castilla la Nueva* (Lag.): Madrid dentro del Jardin Botánico, Casa de Campo. Escorial (Lag.)

*Andalucía* (Lag., Clem., Boiss.): Jaen (Lag.), Chiclana, Grazalema, cerro de San Cristóbal, Sierra del Pinar, Júscar, Carratraca, monte Javalcol, Portugos, Sierra-Nevada en el Mulahacen, Sierra de Baza (Clem.). Sierra-Nevada (Boiss.)

*Portugal* (Brot.): Extremadura y Beira (Brot.)

*Var. β versicolor Hmpe.* Sierra-Nevada en el Dornajo á la altura de 4.000-5.000' (Wk.)

*Var. γ pruinosa Nyl.* *Squamaria pruinosa Dub.* *Lecanora*

*pruinosa* Chauv. *L. muralis* ð *albescens* Schær. *Psora albescens* Hoffm. Sanlúcar de Barrameda (Clem., Lag.), Sierra-Nevada (Schimp.)

**S. coccinea.** *Parmelia coccinea* Clem. Lich. et Flor. bæt. ined. Crusta subimbricata, orbiculari, flavo-virenti, lobis incumbentibus, inciso-lobatis, crenatis, implicato-flexuosis; scutellis planiusculis, coccineis, margine crustæ concolori, integerrima. Clem. loc. cit.

*Hab.* España en Asturias cerca de Arvas y Valgrande (Lag.), y Andalucía en el Cabo de Gata, principalmente en el Mochuelo (Clem.) sobre las rocas. (n. v.)

**S. Sirgi.** *Parmelia Sirgi* Clem. Lich. et Flor. bæt. ined. Crusta squamoso-imbricata, glabra, luteo-fulva, squamis parvis, convexiusculis, flexuosis et irregulariter lobatis, sub-tus concoloribus; scutellis consertis, planiusculis, demum convexis et difformibus, atris, margine integerrima tandem fere nulla. Clem. loc. cit.

*Hab.* España en Andalucía sobre el granito en la cima del Mulahacen de la Sierra-Nevada, á la altura de 9.000-12.762' (Clem.) próximamente. (n. v.)

**S. gelida** Nyl. *Lichen gelidus* L. Engl. bot., t. 699. *Lecanora gelida* Ach.

*Hab.* España en la Peñasurada de Asturias (Lag.) sobre las rocas. (n. v.)

**S. aleurites** Nyl. *Lichen seu Parmelia aleurites* Ach. Engl. bot., t. 858. *Lichen diffusus* Dicks. *Placodium diffusum* Hoffm.

*Hab.* España en Tiláguas, pueblo de Valencia (Clem.) sobre las cortezas y leños de los pinos y otros árboles con mayor frecuencia que sobre las piedras. (n. v.)

### Placodium.

**P. circinnatum** Nyl. *Lichen circinnatus* Pers. Engl. bot., t. 1941. *Parmelia seu Lecanora circinnata et myrrhina* Ach. *Lichen radiosus* Hoffm. *Placodium radiosum* DC.

*Hab.* España (Lag., Clem.) sobre los muros y piedras

calizas en varias provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 3.000-6.000' (Boiss.) próximamente. (v. s.)

*Castilla la Nueva* (Lag.): cercanías de Madrid (Lag.)

*Valencia* (Lag., Clem.): Titáguas (Clem.)

*Andalucía* (Lag., Boiss., Wk.): Sierra-Nevada (Lag., Wk.), Sierra de la Nieve (Boiss.)

*Var.  $\beta$  variabilis* Fr. *Lichen variabilis* Pers. *Parmelia seu Lecanora variabilis* Ach. Sierra-Nevada en el Dornajo á la altura de 4.000-6.000' (Wk.)

**P. alphoplacum** Nyl. *Lichen alphoplacus* Wahl. *Lecanora alphoplaca* Ach. *Parmelia melanaspis* Wahl. a Fr.

Hab. España en la Sierra-Nevada á la altura de 8.000-9.000' (Boiss.) sobre las rocas. (n. v.)

**P. murorum** DC. *Lichen murorum* Hoffm. Engl. bot., t. 2157. *Psora saxicola* Hoffm. *Lichen saxicola* Brot. *Parmelia seu Lecanora murorum* Ach.

Hab. España (Lag., Clem.) y Portugal (Brot.) sobre las rocas, piedras, tejas y muros en varias provincias, llegando en las meridionales á la altura de 7.000' (Boiss.), y más arriba (Clem.) en algunas localidades. (v. v.)

*Aragon* (Pardo, Loscos): Castelserás (Pardo, Loscos).

*Castilla la Nueva* (Lag.): Madrid dentro del Jardín Botánico (Lag.)

*Valencia* (Clem.): Titáguas (Clem.)

*Andalucía* (Lag., Clem.): Jaen, Cádiz (Lag.), Conil, el Bermeo, cumbre del Pinar, Júscar, Grazalema, cerro de San Cristóbal, Carratraca, Cabo de Gata, Sierra-Nevada, Sierra de Lújar, Castril (Clem.), Sierra-Nevada en las rocas de Vacares (Boiss.)

*Portugal* (Brot.)

*Var.  $\beta$  miniatum* Dub. *Parmelia seu Lecanora miniata* a Ach. Medina-Sidonia, Alcalá de los Gazules, Benalmadena, Cabo de Gata, Sierra-Nevada en el Mulahacen (Clem.)

*Var.  $\gamma$  obliteratum* Dub. *Parmelia seu Lecanora miniata*  $\beta$  *oblitterata* Ach. Valencia en Titáguas (Clem.)

*Var.  $\delta$  citrinum* Nyl. *Parmelia seu Lecanora citrina* Ach. *Lichen citrinus* Brot. *Patellaria candelaris* DC. pr. p.—Aqui parece corresponder la *Parmelia lutea* Ach. Clem.

*Cataluña* (Villers): Valle de Aran (Villers).

*Aragon* (Pardo, Loscos): Peñarroya (Pardo, Loscos).

*Galicia* (L. Seoane): cercanías de Redondela (L. Seoane).

*Castilla la Nueva* (Lag.): cercanías de Madrid (Lag.)

*Valencia* (Lag., Clem.): Titáguas (Clem.)

*Andalucía* (Clem., Hæns.): Carratraca (Clem., Hæns.), Córdoba, Sierra de Baza, Alpandeire, Sierra de Tolox, cercanías de Cádiz (Clem.), Sierra-Nevada (Clem., Boiss.)

*Portugal* (Brot.): Extremadura, Beira, cercanías de Lisboa (Brot.)

**P. elegans DC.** *Lichen elegans L. Parmelia seu Lecanora elegans Ach.*

Hab. España (Lag., Clem.) sobre las rocas en varias provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 7.000-10.000' (Boiss.), 6.000-11.000' (Wk.), 0-12.762' (Clem.), ó sea desde lo más bajo hasta lo más alto. (v. s.)

*Aragon* (Pardo, Loscos): Castelserás (Pardo, Loscos).

*Galicia* (L. Seoane).

*Castilla la Nueva* (Lag.): cercanías de Madrid en San Fernando y Ribas (Lag.)

*Andalucía* (Lag., Clem.): Jaen (Lag.), Sierra-Nevada (Clem., Boiss., Wk.), Mularacén, inmediaciones del Cortijo de Lastón y otras partes en el barranco de Trevélez, Sierra de Baza, Sierra de Líjar, Cabo de Gata, principalmente en el Mochuelo, el Berrueco (Clem.), Sierra-Nevada en el Dornajo, Cerro Tesoro, Trevenque, Cerro Calal, Picacho de Veleta, Mularacén, Alcazaba (Wk.)

Var.  $\alpha$  *orbicularis* Schær. *Lichen elegans Sm. Engl. bot.*, t. 2181, fig. duæ, ad sinistram.

**P. fulgens DC.** *Lichen fulgens Sw. L. citrinus Ehrh.*

*L. friabilis* Vill. *Delph.*, t. 55. *Parmelia seu Lecanora fulgens* Ach. *Psora citrina Hoffm. Lecanora friabilis* Schær.

Hab. España (Lag., Clem.) sobre la tierra y los musgos en muchas provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 1.800-7.200' (Clem.) próximamente. (v. v.)

*Aragon* (Pardo, Loscos): Peñarroya (Pardo, Loscos).

*Castilla la Nueva* (Lag.): Madrid dentro del Jardín Botánico (Lag.)

*Andalucia* (Clem., Boiss.): Córdoba, Júscar, cerro de San Cristóbal, Sierra-Nevada, Sierra de Gador, Castril, cercanías del río Barbate (Clem.), Sierra de Tolox (Boiss.), Sierra-Nevada cerca de Guéjar (Wk.), Chiclana (Lge.)

**P. variegatum.** *Parmelia variegata* Clem. Lich. et Flor. bæt. ined. Thallo crustaceo, plano, depresso, orbiculari, rimoso-cinereo, subtus concolori et fusco, crassiusculo, sub-pulverulento, lobato-corrugato, ambitu lobato, stellato-radiato, subimbricato, lobis adpressis, convexis, linearibus, subincisis aut apice dilatatis et lobatis, flexuosis; scutellis planis, demum subconvexis, fuscis, rarius atris, confertis, margine crassiuscula, integerrima, inflexa, crusta concolori. Clem. loc. cit.

**Hab.** España en la Sierra-Nevada principalmente cerca de la laguna de Vacares y en Trevélez á la altura de 7.800' (Clem.), sobre el granito y los musgos en las orillas de los arroyos. (n. v.)

**P. microcarpum.** *Parmelia microcarpa* Clem. Lich. et Flor. bæt. ined. Thallo crustaceo, plano, depresso, suborbiculari, ambitu lobato, cinereo-viridi et pallide flavo, valde rimoso, laeviusculo, lobis discretis, inciso-lobatis, adpressis, lobis sublinearibus, subflexuosis; scutellis parvis, concaviusculis, atris aut fusco-atris, adpressis, margine inflexa, integerrima, crusta concolori, crassiuscula. Clem. loc. cit.

**Hab.** España en Cobdar, Bodurria, Caniles, Sierra-Nevada, á la altura de 3.900-8.550' (Clem.) sobre las rocas. (n. v.)

### Lecanora.

**L. cerina** Ach. *Lichen cerinus* Hedw. Engl. bot., t. 627. *Patellaria seu Verrucaria cerina* Hoffm. *Parmelia cerina* Ach. Fr. *Lecidea cerina* Schær.

**Hab.** España (Clem., Duf.) sobre las cortezas de los árboles, musgos y piedras en varias provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 3.000-7.800' (Clem.) próximamente. (v. s.)

*Cataluña* (Villers): valle de Arán (Villers).

*Castilla la Vieja* (Dur.): Burgos, Sierra de Guadarrama (Dur.)

*Valencia* (Clem.); Titáguas (Clem.)

*Andalucia* (Clem., Boiss.): Desierto de las Nieves, Sierra-Bermeja, Sierra-Nevada, monte Jalvalcol, Sierra de Baza (Clem.), Carratraca (Boiss.)

*Var.  $\beta$  stericidiorum* Nyl. *Parmelia cerina*  $\beta$  stericidiorum Fr. Sierra-Nevada en el Corral de Veleta á la altura de 7.500' (Boiss.)

*Var.  $\gamma$  pyracea* Ach. *Lecidea luteo-alba*  $\alpha$ ,  $\gamma$  Ach. *Patellaria ulmicola* DC. Aragon (Pardo, Loscos).

*Var.  $\delta$  pallida* Clem. Lich. et Flor. bæt. ined. Crusta effusa, tenui, inæquabili, alba; scutellis planis, demum convexiusculis, luteis, minutis, consertis, margine tenui, subinflexa, subcrenulata, demum subevanida, crustæ concolori. Clem. loc. cit. Cercanías de Sanlúcar de Barrameda sobre algunos cistos (Clem.)

*L. aurantiaca* Nyl. *Lichen aurantiacus* Lightf. *Lecidea aurantiaca* Ach. *Parmelia aurantiaca* Fr. *Lichen salicinus* Schrad. Engl. bot., t. 1305. *Patellaria salicina* Hoffm. *Parmelia seu Lecanora salicina* Ach.

*Hab.* España (Clem., Hæns.) sobre los árboles y rocas en los montes de algunas provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 6.000' (Clem.), y más abajo en otras. (n. v.)

*Andalucia* (Clem., Hæns.): Sierra de Baza, Sierra-Nevada (Clem.), Carratraca, cerro de San Cristóbal (Hæns., Boiss.)

*Var.  $\beta$  erythrella* Nyl. *Parmelia seu Lecanora erythrella* Ach. *Patellaria seu Verrucaria flavo-virescens* Hoffm. *Lecidea aurantiaca*  $\gamma$  *flavo-virescens* Schær. Cataluña en el valle de Aran (Villers), Andalucía cerca de Jaen (Lag.)

*L. ferruginea* Nyl. *Lichen ferrugineus* Huds. Engl. bot., t. 1650. *Patellaria seu Verrucaria ferruginea* Hoffm. *Lecidea ferruginea* Smrf. *Parmelia ferruginea* Fr. *Lecidea cinereo-fusca* et *L. cæsio-rufa* Ach.

*Hab.* España sobre los árboles y rocas en Andalucía cerca de Cádiz y Sanlúcar de Barrameda, Medina-Sidonia, Alcalá

de los Gazules, Sierra de Tolox, Sierra de la Nieve, Sierra-Bermeja, Portugos, Sierra de Baza, Cabo de Gata (Clem.), Sierra-Nevada en Vacares, llegando á la altura de 6.000' (Clem.) próximamente, y en Galicia cerca del Ferrol (L. Seoane).

**L. Lallavei Nyl.** *Lecidea Lallave Clem. Ens. Parmelia erythrocarpia* β *Lallavei Fr. Lecidea erythrocarpia* β *Lallave Schær.*

*Hab.* España (Clem., Lag., Duf.) sobre las rocas calizas en algunas provincias, y principalmente en las orientales y meridionales, llegando en ellas á la altura de 1.800' (Clem.), y bastante más arriba. (v. s.)

*Castilla la Vieja* (Lallave): Pancorvo (Lallave).

*Valencia* (Clem.): Titáguas (Clem.)

*Murcia* (Lag.)

*Andalucía* (Clem.): inmediaciones de Cádiz, cercanías de Chiclana en el Berrueco, Medina-Sidonia, Alcalá de los Gazules, Benaozaz, Sierra del Pinar, San Cristóbal, Las Nieves, Júscar, Carratraca, Alcaudete, Alcalá la Real (Clem.)

**L. vitellina Ach.** *Lichen vitellinus Ehrh. Engl. bot., t. 1792. Lichen flavus Brot. Patellaria seu Verrucaria vitellina Hoffm. Parmelia vitellina Ach. Fr.—Lichen candelarius et Byssus candelaris L. Asso non alior.*

*Hab.* España (Asso, Lag.) y Portugal (Vand., Brot.) sobre las piedras, leños y cortezas de los árboles. (n. v.)

*Cataluña* (E. Bout.): Monsegrat (E. Bout.)

*Castilla la Nueva* (Lag.): Madrid dentro del Jardin Botánico (Lag., Colm.)

*Andalucía* (Gutierrez): Puerto de Santa María en el Coto (Gutierrez).

*Portugal* (Vand., Brot.)

**L. endocarpæa Nyl.** *Parmelia endocarpæa Fr. Endocarpon Dufourii Dur.*

*Hab.* España en Andalucía sobre la tierra (Duf.) en varias partes. (n. v.)

**L. cervina Ach.** *Lichen cervinus Pers. Parmelia cervina Fr. Squamaria cervina Dub.*

*Var.* β *squamulosa Fr. Lichen squamulosus Schrad. Engl.*

*bot.*, t. 2011. *Parmelia squamulosa* Ach. Pirineos (Ramond) y Galicia cerca de Tuy (L. Seoane) sobre las rocas.—Es forma suya la var. *irrorata* Clem. *Lich. et Flor. bæt. ined.* Thallo cartilagineo, effigurato, toto squamoso, sub-imbri-cato, fusco-castaneo, subtus pallido, pulvere albo tecto, tandem glabriusculo, adpresso, parvo, tumidulo, squamis sub-orbiculatis, apice saltem rotundato-sublobatis; scutellis immersis, demum elevatis, planiusculis, atro-fuscis et atris, margine alba, tenui, tandem evanida, subpulverulenta, sub-crenulata. Clem. loc. cit. Andalucia (Clem.)

**L. mosaica.** *Urceolaria mosaica* Clem. *Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta tartarea, areolata, castanea, areolis marginatis, patellulis atris, albo-subpruinosis, immersis, tandem marginatis, margine tenui, libera, plerumque elevata, accessoria nulla. Clem. loc. cit. Andalucia en Alcalá de los Gazules á la altura de 1.800' (Clem.) sobre las rocas areniscas. (n. v.)

**L. chlorophana** Ach. *Lichen chlorophanus* Wahl. *Flor. lapp. t. 28, f. 2.* *Lichen electrinus* Ramond. *Squamaria electrina* DC. *Urceolaria citrina* Clem. *Flor. bæt. ined.* *Lecanora flava* Schær.

*Hab.* España (Clem., Boiss., Colm.) y Portugal (Brot.) sobre las rocas en los Pirineos y otros montes de varias provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 8.000-10.000' (Clem., Boiss.), tambien á la de 7.000-8.000' (Wk.) y más abajo (Clem.) en algunas localidades. (n. v.)

*Galicia* (L. Seoane): crestas cuarzosas del Caurel (L. Seoane).

*Castilla la Nueva* (Colm.): Escorial, Sierra de Guadarrama (Colm.)

*Andalucia* (Clem., Boiss., Wk.): Sierra-Nevada (Clem., Boiss., Wk.), inmediaciones de Capileira, Mecina de Bonvallon, Benalmadena, Cabo de Gata (Clem.)

**L. atro-punctata.** *Urceolaria atropunctata* Clem. *Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta tenui, rimosissimo-areolata, citrina, ambitu fimbriato, fimbriis linearibus, subincisis, planiusculis; apotheciis punctiformibus, atris, omnino immersis, minulis. Clem. loc. cit.

*Hab.* España en Andalucía sobre las rocas en Cobdar á la altura de 2.100-2.400' (Clem.) próximamente. (n. v.)

**L. charidema.** *Urceolaria charidema Clem. Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta lævigata, effusa, tartarea, rimoso-areolata, contigua aut dispersa, citrina, apotheciis immersis, concavis, citrino-viridibus, margine accessoria concolori, tenui, sublibera occlusis, 1-5 in singula areola diformibus. Clem. loc. cit.

*Hab.* España en Andalucía sobre las rocas en el Cabo de Gata, principalmente en el Mochuelo, llegando á la altura de 150' (Clem.) tan solo. (n. v.)

**L. Schleicheri Nyl.** *Urceolaria Schleicheri Ach. Parmelia Schleicheri Fr.*

*Hab.* España en Andalucía cerca de Córdoba y Málaga (Lge.), y en la Sierra-Nevada (L. Seoane), sobre la tierra y los musgos. (n. v.)

*Var.  $\beta$  saxicola Lge.* Almeria sobre las rocas calizas (Lge.)

**L. cinerea Nyl.** *Lichen cinereus L. Engl. bot., t. 1751. Urceolaria cinerea Ach. Verrucaria ocellata Hoffm. Urceolaria tessulata DC. Parmelia cinerea Fr. Parmelia seu Lecanora multipuncta Ach.*

*Hab.* España (Clem., Lag.) y Portugal (Grisl.) sobre las rocas en algunas provincias, llegando en las meridionales á la altura de 3.300' (Clem.) y más arriba. (v. s.)

*Cataluña* (E. Bout.): Monserrat (E. Bout.)

*Galicia* (L. Seoane): cercanías del Ferrol (L. Seoane).

*Andalucía* (Clem., Prol.): Chiclana en el Berueco (Clem.), Sanlúcar de Barrameda (Lag.), Málaga (Prol.)

*Portugal* (Grisl.)

*Var.  $\beta$  tigrina Ach.* *Urceolaria cinerea  $\beta$  tigrina Ach.* Sierra de Lújar, llegando á la altura de 6.700' y algo más (Clem.)

*Var.  $\gamma$  polygonia Ach.* *Urceolaria cinerea  $\gamma$  polygonia Ach.* Sierra de Lújar, llegando á la altura de 6.000' (Clem.)

*Var.  $\delta$  tessulata Ach.* *Urceolaria cinerea  $\delta$  tessulata Ach. composita ex Clem.* Cercanías de Cádiz en Chiclana sobre las rocas calizas. (Clem.)

**L. calcarea Nyl.** *Lichen calcareus L. Mich., t. 54, f. 7. Urceolaria calcarea Ach. Parmelia calcarea Fr.* — Es forma de la especie segun Fries el *Isidium stalacticum Clem. Ens. et Ach.* indicado en Alcalá de los Gazules, sobre las rocas areniscas, por Clemente.

*Hab.* España (Asso, Clem.) y Portugal (Vand.) sobre las rocas calizas en diversas provincias, llegando en las meridionales á la altura de 7.500' (Clem.) y más arriba. (v. s.)

*Aragon* (Asso): Peñarroya (Pardo, Loscos).

*Castilla la Vieja* (L. Seoane): inmediaciones de Valladolid (L. Seoane).

*Andalucía* (Clem., Hæns.): Conil, cercanías de Cádiz, el Berrueco, Medina-Sidonia, Alcalá de los Gazules, Sierra de Lújar, Cabo de Gata (Clem.), Carratraca (Clem., Hæns.), Málaga (Prol.), Sierra de la Nieve (Boiss.)

*Portugal* (Vand.): Coimbra (D. Bapt.)

*Var.  $\beta$  contorta Ach. Urceolaria contorta Flork. U. Hoffmanni  $\beta$  contorta Ach. Lich. U. calcarea  $\beta$  Hoffmanni Ach. Syn. U. calcarea  $\beta$  contorta Schær.*

*Castilla la Vieja* (Duf.): Burgos, Sierra de Guadarrama (Duf.)

*Castilla la Nueva* (Novoa, Lag.): Escorial (Novoa).

*València* (Clem.): Titaguas (Clem.).

*Andalucía* (Clem., Hæns.): Carratraca (Clem., Hæns.), Conil, cercanías de Cádiz, Alcalá de los Gazules, Sierra-Nevada, Beas, Sierra de Baza, Sierra-Morena (Clem.)

**L. nodulosa.** *Parmelia nodulosa. Fr. Urceolaria Lagascæ Duf. U. nodulosa Schær.*

*Hab.* España sobre la tierra cascajosa (Lag., Duf.) en varios puntos. (n. v.)

**L. mutabilis Nyl.** *Urceolaria mutabilis Ach. Parmelia verrucosa Fr.*

*Hab.* España en Andalucía cerca de Alcalá de los Gazules, (Clem., Lag.) sobre la corteza de los árboles. (n. v.)

**L. Parella Ach.** *Lichen Parellus L. Dill. Musc., t. 18, f. 10. Engl. bot., t. 727. Patellaria Parella Hoffm. Parmelia pallescens  $\beta$  parella Fr. Lecanora pallescens Schær.*

*Hab.* España (Lag., Clem.) y Portugal (Vand., Brot.) so-

bre las rocas y los troncos de los árboles en muchas provincias, llegando en las meridionales á la altura de 7.200' (Clem.) próximamente. (v. s.)

*Cataluña* (Salvañá, Bassag.): Mataró (Salvañá), Pirineos (Bassag.)

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.)

*Leon* (Lag.)

*Andalucia* (Clem., Hæns.): Carratraca (Clem., Hæns., Boiss.), Algeciras, Conil, Medina-Sidonia, Picacho de Alcalá de los Gazules, Sierra del Algibe, Benaonaz, Grazalema, Sierra del Pinar, Sierra de Tolox, Júscar, Lubrin, Portugos (Clem.), cercanías de Granada (Wk.)

*Portugal* (Vand., Brot.)

*Baleares* (Weyler): Menorca (Ramis, Hern., Oleo).

*Var.  $\beta$  upsaliensis* Ach. Schær. *Lichen upsaliensis* L. *Patellaria upsaliensis* Hoffm. Santander (Salcedo).

*Nombr. vulg. Cast.* Orchilla de tierra ú Orquilla de tierra (Lag.) *Port.* Orzelha ou Orcella da terra ou dos montes (Brot.)

*Balear.* Herba de roca (Ramis.)

**L. tartarea** Ach. *Lichen tartareus* L. Dill. Musc., t. 18, f. 13. Engl. bot., t. 156. *Patellaria tartarea* DC. *Parmelia tartarea* Ach. Fr.

*Hab.* España (Lag., Clem.) y Portugal (Brot.) sobre las rocas y musgos en los montes de varias provincias, hallándose en los de las meridionales á la altura de 2.700-7.200' (Clem.) lo más. (v. s.)

*Prov. Vascongadas* (Wk.): cercanías de Sopuerta (Wk.)

*Santander* (Salcedo).

*Valencia* (Lag.): Alberique (Lag.)

*Andalucia* (Clem.): Picacho de Alcalá de los Gazules, y toda la Sierra, Benaonaz (Clem.)

*Portugal* (Brot.): Serra de Gerez, Serra de Estrella (Brot.)

*Var.  $\beta$  frigida* Ach. Dub. *Lichen frigidus* L. Sw. Engl. bot., t. 1879. Picacho de Alcalá de los Gazules (Clem.)

**L. subfuscata** Ach. Schær., t. 4, f. 3. *Lichen XX*

*Quer.* *Lichen subfuscus* L. Dill. Musc., t. 18, f. 16. *Patellaria populicola* DC. *Parmelia subfuscata* Ach. Fr.

*Hab.* España (Quer, Asso, Lag.) y Portugal (Brot.) sobre las cortezas de los árboles, los leños y rocas en muchas provincias, llegando en las meridionales á la altura de 7.500' (Clem.) próximamente. (v. s.)

*Cataluña* (Villers): valle de Arán (Villers).

*Aragon* (Asso): Castelserás (Pardo, Loscos).

*Prov. Vascongadas* (Lag., Wk.): cercanías de Irún (Wk.)

*Asturias* (Lag.): Arvas (Lag.)

*Castilla la Nueva* (Lag.): Madrid en la Casa de Campo, San Fernando, Ribas (Lag.)

*Valencia* (Clem.): Titaguas (Clem.), castillo de Chiva (Wk.)

*Andalucia* (Clem.): Chiclana, Medina-Sidonia, Alcalá de los Gazules, Grazalema, Granada, Portugos, Cabo de Gata (Clem.), Sanlúcar de Barrameda (Lag.), Carratraca (Hæns.), Sierra de la Nieve (Boiss.), Jerez de la Frontera (Wk.)

*Portugal* (Brot.)

*Var.  $\beta$  fusca Hoffm.* Valencia en el castillo de Chiva, Andalucía en Jerez de la Frontera (Wk.)

*Var.  $\gamma$  pallida Clem. Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta granulata; scutellarum margine alba, minute granulata, unde quasi crenulata, crustæ concolori; scutellarum disco plano, tandem subconvexo. Clem. loc. cit. Inmediaciones de Portugos á la altura de 2.700' (Clem.)

*Var.  $\delta$  hemispherica Clem. Lich. et Flor. bæt. ined* Crusta granulosa, cinereo-sublutescenti, effusa et sparsa; scutellis minutis, sessilibus, disco convexiusculo, tandem hemisphærico, saturate rufescenti-fusco, nitido, margine integerrima, tumidula, crustæ concolori. Clem. loc. cit. Alcalá de los Gazules sobre las rocas calizas á la altura de 1.800' (Clem.)

*Var.  $\epsilon$  virescens Clem. Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta tenui, pallide viridi, granulosa; scutellis sessilibus subsparsis, minutis, disco planiusculo, luteo-viridi, margine integerrima, tenui, crustæ concolori vix elevata. Clem. loc. cit. Cercanías de Chiclana (Clem.)

*Var.  $\zeta$  charidema Clem. Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta cinerea, granulosa, inæquabili effusa; scutellis sessilibus, subelevatis confertis, demum mutua plerumque pressione

fere semper irregularibus; disco plano, luteo-subfuscus et fuscus, demum fusco-nigro, glabro, margine tumida, inflexa, subcrenulata, demum flexuosa, glabra, crustae concolori. Clem. loc. cit. Cabo de Gata en el cerro del Fraile (Clem.)

*Var.  $\alpha$  melioica Ach.* Clem. Medina-Sidonia, Picacho de Alcalá de los Gazules, á la altura de 1.200-3.000' (Clem.)

*Var.  $\mu$  crenulata Schær.* *Lichen crenulatus Dicks.* *L. dispersus Pers.* *Parmelia dispersa Ach.* Clem. Cercanías de Cádiz, Medina-Sidonia, Sierra de Lújar, monte Javalcol, Sierra de Baza, Castril, Sierra-Nevada sobre las rocas á la altura de 11.100' (Clem.)

**L. angulosa Ach.** *Patellaria angulosa DC.* *Parmelia angulosa Ach.* Clem.

*Hab.* España (Lag., Clem.) sobre los troncos de los árboles en varias provincias, llegando en las meridionales á la altura de 7.200' (Clem.)—Es rigurosamente una variedad de la *L. subfusca Ach.*

*Castilla la Nueva* (Lag.): Madrid dentro del Jardín Botánico, Casa de Campo (Lag.)

*Valencia* (Lag.): Canals (Lag.)

*Andalucía* (Clem.): Sanlúcar de Barrameda (Clem.)

*Var.  $\beta$  dealbata Clem.* *Lich. et Flor. bat. ined.* Crusta plerumque nigro limitata, grisea, tenuiter rimosissima; scutellis demum convexiusculis, subcongestis, albis et griseocæsiis, subinde nigris. Clem. loc. cit. Cabo de Gata en el Mochuelo (Clem.)

**L. glaucoma Ach.** *Lichen glaucoma Brot.* *L. sordidus Pers.* *Patellaria seu Verrucaria glaucoma Hoffm.*, t. 52, 53. *Parmelia glaucoma Ach.* *Parmelia sordida Fr.* *Lecanora rimosa Schær.* *Lecanora Swartzii Ach.*—Es forma de la especie, segun Fries, el *Isidium corallinum Ach. Engl. bot.*, t. 1541, ó sea el *Lichen corallinus L.*, indicado por Lagasca en Asturias. Forma suya es igualmente la *Variolaria dealbata DC.* señalada en los Pirineos por Bassagaña con el nombre vulgar de *Líquen blanco*. Mera forma de aquella es tambien la *Variolaria lactea Pers.* ó sea el *Lichen lacteus L.*, comun en la Península y Baleares, donde se llama *Herba de roca* (Ramus), como otros líquenes.

*Hab.* España (Clem., Boiss.) y Portugal (Brot.) sobre las rocas en varias provincias, llegando en las meridionales á la altura de 7.000-8.000' (Wk.), 7.500-9.000' (Boiss.) ó hasta la de 10.500' (Clem.) en algunas localidades. (v. s.)

*Cataluña* (E. Bout.): Pirineos, Monserrat (E. Bout.)

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.): inmediaciones de Arvas (Lag.)

*Galicia* (L. Seoane): cercanías de Cabeiro (L. Seoane).

*Castilla la Nueva* (Lag.): Madrid en la Casa de Campo (Lag.)

*Andalucía* (Clem., Boiss.): montes de Caniles, laguna de Vacares, Trevélez, Mulahacen y otras partes en la Sierra-Nevada, Cabo de Gata, principalmente en Calasiguera, cercanías de Cádiz (Clem.), Sierra-Nevada (Boiss., Wk.)

*Portugal* (Brot.): montes de Marão y otras partes en Tras-os-Montes y Entre Duero y Miño (Brot.)

*Baleares* (Weyler): Menorca (Ramis).

*Var.  $\beta$  sulphurea Clem. Ens. Fr. Lichen sulphureus Hoffm., t. 4, f. 1. Engl. bot., t. 1186. Parmelia, Lecanora seu Lecidea sulphurea Ach.* Cercanías de Alcalá de los Gazules y Cabo de Gata en el Mochuelo, llegando á la altura de 1.800' (Clem.).

**L. nitida.** *Parmelia nitida Clem. Lich. et Flor. bat. ined.* Crusta tartarea, rimosa, æquabili, cinereo-lutescenti, viridi-plumbeo limitata; scutellis hemisphæricis, subcongestis, aterrimis, nitidis, minutis, margine integerrima, grisea. Clem. loc. cit. Crusta subpulverulenta, semilineam usque crassa.—Difiere de la *Lecanora glaucoma* Ach. en algunos caractéres.

*Hab.* España en Andalucía sobre las rocas calizas en Alcalá de los Gazules á la altura de 1.800' (Clem.) próximamente. (n. v.)

**L. varia Ach.** *Lichen varius Ehrh. Engl. bot., t. 1666. Patellaria seu Verrucaria varia Hoffm. Parmelia varia Ach. Fr.*

*Hab.* España sobre las cortezas de los árboles, piedras y leños en Andalucía cerca de Alcalá de los Gazules (Clem., Lag.) y en otras partes. (n. v.)

*Var. γ lutescens Nyl.* *Patellaria lutescens DC.* *Lepraria lutescens Clem. Ens.* Santander (Salcedo), Valencia en Titaguas (Clem.), Andalucía cerca de Chiclana, Sanlúcar de Barrameda, Picacho de Alcalá de los Gazules, llegando á la altura de 3.900' (Clem.)

*Var. ε polytropa Nyl.* *Lichen polytropus Ehrh.* *Lecidea polytropa Ach.* Cercantas de Chiclana en el Berrueco y otras partes, llegando á la altura de 3.300' (Clem.)

**L. Coryli.** *Parmelia Coryli Clem. Flor. bæt. ined.* Crusta granulosa, obscure grisea, subvirenti, lævi; scutellis minutis, planiusculis, vitellinis, margine integerrima, viridi, atra. Clem. loc. cit.

*Hab.* España en Andalucía en el Desierto de las Nieves (Clem.) sobre los avellanos. (n. v.)

**L. pulchella.** *Parmelia pulchella Clem. Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta tenui, pulveracea, saturate flava, uniformi; scutellis atris., depressis, demum convexiusculis, minutis, margine crustæ conformi, tenuiscula, crenulata. Clem. Flor. bæt. ined.

*Hab.* España en Andalucía en el Cabo de Gata, y principalmente en el Mochuelo (Clem.) sobre las rocas. (n. v.)

**L. minuta.** *Parmelia minuta Clem. Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta granulosa, imbricata, cinereo-virenti, effusa, tartarea, tenui; scutellis planis, tandem convexiusculis, sanguineis, margine tumidula, subintegerrima, crustæ concolori. Clem. loc. cit.

*Hab.* España en la Sierra-Nevada, principalmente cerca de la mina del pozo de Capileira, á la altura de 5.100' (Clem.) sobre las rocas. (n. v.)

**L. atra Ach.** *Lichen ater Huds. Dill. Musc., t. 18, f. 15. Engl. bot., t. 949.* *L. tephromelas Ehrh.* *Parmelia atra Ach.* *Fr. Verrucaria atra Hoffm.* *Patellaria tephromelas DC.*

*Hab.* España (Clem., Boiss.) y Portugal (Brot.) sobre las cortezas de los árboles y las rocas en varias provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 7.000-9.000' (Boiss.), y más abajo (Clem.) en algunas localidades. (v. s.)

*Andalucia* (Clem., Boiss.): Chiclana, el Berrueco, Medina-

Sidonia, Benaoaz, Ronda, Torviscon, Carratraca, Cabo de Gata, Caniles (Clem.), Sierra-Nevada (Clem., Boiss.)

*Portugal* (Brot.)

*Var. β virescens* Clem. *Lich. et Flor. bat. ined.* Crusta rugoso-granulata, inaequabile, cinereo-viridi; scutellis demum convexiusculis, atris, margine virenti, tenui. Clem. loc. cit. Alcalá de los Gazules á la altura de 1.800' (Clem.)

*Var. γ geographica* Clem. *Lich. et Flor. bat. ined.* *Lecanora cyclomela* Lallave. Crusta rugoso-granulata, inaequabili, cinereo-albida aut cinerea, nigro limitata; scutellis minutissimis, demum subconvexis, atris et atro-fuscis, margine alba, tandem subflexuosa, subcrenulataque. Clem. loc. cit. Cabo de Gata, Medina-Sidonia, Alcalá de los Gazules á la altura de 1.800' (Clem.), Sierra-Nevada (Lallave).

**L. badia** Ach. *Lichen badius* Ehrh. *Patellaria seu Verrucaria badia* Hoffm., t. 51, f. 2. *Lichen fuscatus* Schrad. *Parmelia fuscata* Ach. *Patellaria nitens* Pers..

Hab. España (Lag., Clem.) sobre las rocas en algunas provincias. (v. s.)

*Castilla la Nueva* (Novoa, Lag.): Escorial (Novoa).

*Andalucía* (Clem.): Cabo de Gata (Clem.).

**L. rubra** Ach. *Lichen Ulmi* Sw. *Engl. bot.*, t. 2218.

*Lichen pallidus* Brot. *Patellaria seu Verrucaria rubra* Hoffm.

*Parmelia rubra* Ach. Fr.

Hab. España (Lag., Clem.) y Portugal (Brot.) sobre los troncos de los árboles. (v. s.)

*Santander* (Lag.)

*Andalucía* (Clem., Lag.): Málaga (Clem., Lag.)

*Portugal* (Brot.)

**L. oreina** Ach. *Placodium oreinum* Dub. *Parmelia oreina* Fr.

Hab. España en los Pirineos y en la Sierra-Nevada á la altura de 7.000-10.000' (Boiss.) sobre las rocas. (n. v.)

**L. exigua** Ach. *L. periclymenum exigua* Ach. *Patellaria exigua* DC. *Parmelia exigua* Ach. Clem.

Hab. España (Clem., Wk.) en el Cabo de Trafalgar (Wk.) y en otros parajes de Andalucía, é igualmente en Galicia (L. Seoane), sobre las cortezas de los árboles. (n. v.)

*Var. β pinicola Clem. Lich. et Flor. bæt. ined.* Sierra y Hoya del Pinar y otras partes en la Serranía de Ronda á la altura de 4.500' (Clem.)

**L. ventosa Ach.** *Lichen ventosus L. Dill. Musc., t. 18, f. 14.* *Verrucaria ventosa Hoffm.* *Patellaria ventosa DC.* *Parmelia ventosa Ach. Fr.*

*Hab.* España (Villers, Novoa) en los Pirineos y otros montes elevados, sobre las rocas. (v. s.)

*Cataluña* (Villers): Valle de Aran (Villers).

*Galicia* (L. Seoane): monte de Cebreros (L. Seoane).

*Castilla la Nueva* (Novoa, Lag.): Escorial (Novoa).

**L. hæmatomma Ach.** *Lichen hæmatomma Ach. Ehrh. Engl. bot., t. 486.* *Patellaria seu Verrucaria hæmatomma Hoffm.* *Lecidea hæmatomma Ach.* *Lichen coccineus Dicks.* *Pers.* *Lichen Turneri Sm.* *Lecanora Turneri, Flor. dan., t. 1718, f. 1.* —Son estados de esterilidad de la especie la *Lepraria chlorina Ach.* y su var. *aurea Ach.*, indicadas por Clemente en las costas de Andalucía; y tambien es forma de la misma la *Lepraria leiphemia Ach.*, cuya var. *virescens Clem. Lich.* se halla en sitios elevados de Andalucía (Clem.)

*Hab.* España (Lag., Dur.) sobre las rocas sombrías principalmente, y sobre las cortezas de los árboles en las provincias septentrionales, y tambien en algunos montes de las meridionales. (n. v.)

*Asturias* (Lag., Dur.): Arvas, Valgrande (Lag.), monte situado al oriente del Naviego (Dur.)

*Andalucia* (Clem.); Picacho de Alcalá de los Gazules? (Clem.)

*Var. β carnea Clem. Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta tartarea, areolata, subpulverulenta, subcarnea; patellulis subpressis, demum convexis, sanguineo-atris, margine sub nulla. Clem. loc. cit. Alcalá de los Gazules á la altura de 1.800' (Clem.)

*Var. γ lævigata Clem. Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta tartarea, areolato-diffracta, lævigata, subsulfurea, aut subsanguinea, areolis vix convexis; patellulis elevatis, mediocribus, irregularibus, subglobosis, confluentibus, saturate sanguineis,

margine accessoria sub nulla. Clem. loc. cit. Sierra-Nevada á la altura de 6.000' (Clem.)

*Var. δ virens* Clem. Lich. et Flor. bæt. ined. Crusta tartarea, areolato-diffracta, crassiuscula, subpulverulenta, viridi, sublutea et viridi-fusca; patellulis immersis, deinde depressis, demum subconvexis, ruberrimis, margine propria tenuissima, accessoria nulla. Clem. loc. cit. Cercanías de Castril á la altura de 3.900' (Clem.)

*Var. ε fallax* Clem. Lich. et Flor. bæt. ined. Crusta tartarea, areolata; patellulis sessilibus, junioribus, planiusculis, postea subglobosis, luteo-fuscis, in sicco atris. Clem. loc. cit. Sierra de Lújar á la altura de 6.600-6.750' (Clem.)

*Var. ζ prothæa* Clem. Lich. et Flor. bæt. ined. Crusta tartarea, rímosa, subpulverulenta, subflavo-virenti; patellulis subconvexis, sanguineo-fuscis, margine nulla. Clem. loc. cit. Orillas del Barbate, no lejos de Zújar, en el sitio llamado Montalbo, Carril de la Cuesta de Manzanos, Alcalá de los Gazules, á la altura de 1.800-3.600' (Clem.)

### Urceolaria.

**U. ocellata DC.** *Lichen ocellatus* Vill. Delph., t. 55. *Lecanora Villarsii* Ach. *Parmelia ocellata* Fr. *Placodium ocellatum* Dub.

*Hab.* España (Clem., Duf., Pav., Hæns.) y Portugal (Brot.) sobre la tierra y rocas en diversas provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 2.000-5.000' (Wk.), ó más bien á la de 300-8.400' (Clem.) en varias localidades. (n. v.)

*Santander* (Salcedo).

*Castilla la Vieja* (Duf.): Burgos, Sierra de Guadarrama (Duf.)

*Andalucia* (Clem., Hæns.): Málaga (Clem., Hæns., Boiss., Lge.), Alcalá de los Gazules, Benalmadena, Zújar, laguna de Vacares, Trevélez, Carril de la Cuesta de Manzanos cerca del río Barbate, Sierra de Baza (Clem.), cercanías de Cádiz (Duf.), Sierra-Nevada en las Alpujarras, cercanías de Lanjaron, inmediaciones de Granada (Wk.).

*Portugal* (Brot.): montes de Gerez, Serra de Estrella (Brot.)

**U. scruposa Ach.** *Schær.*, t. 4, f. 4. *Lichen scruposus L.* *Dill. Musc.*, t. 18, f. 15. *L. pertusus Wulf.* *Patellaria seu Verrucaria scruposa Hoffm.* *Parmelia scruposa Fr.*

Hab. España (Lag., Clem.) y Portugal (Brot.) sobre la tierra y las rocas, los árboles y musgos en diferentes provincias, llegando en las meridionales á la altura de 7.950' (Clem.) próximamente. (v. s.)

*Santander* (Salcedo): peñas de Sejos en Liébana (Salcedo).

*Galicia* (L. Seoane): cercanías de Tuy (L. Seoane).

*Castilla la Nueva* (Lag.): San Fernando y Ribas cerca de Madrid (Lag.), Toledo en el puente de San Martín (Fee).

*Valencia* (Clem.): Titaguas (Clem.)

*Andalucía* (Lag., Clem.): Jaen (Lag.), Alcaudete, Alcalá la Real, Granada, Sierra-Nevada, Sierra de Elvira, orillas del Barbate en el Carril de la Cuesta de Manzanos, cerro de las minas de Turon, Cabo de Gata, fuente de la Manía en Málaga, Conil, Picacho de Alcalá de los Gazules, Ubrique, Benaoceaz, Sierra del Pinar, Júscar, Grazalema, cerro de San Cristóbal (Clem.).

*Portugal* (Brot.): Alentejo (Brot.)

Var.  $\beta$  *bryophila* Ach. *Lichen bryophilus Ehrh.* *L. scruposus Engl. bot.*, t. 266. *Urceolaria seu Gyalecta bryophila Ach.* *Patellaria muscorum Hoffm.* Castilla la Vieja en Burgos y la Sierra de Guadarrama (Duf.)—Es forma suya la var. *albissima* Clem., indicada por el mismo en Jaen, Sierra-Nevada, Picacho de Alcalá de los Gazules, Grazalema á la altura de 4.800' (Clem.).

Var.  $\gamma$  *cretacea* Schær. *Gyalecta cretacea Ach.* Aranjuez (Wk.)

Var.  $\delta$  *diacapsis* Schær. *Lichen diacapsis Schær.* *Engl. bot.*, t. 1954. *Urceolaria gypsacea Ach.* Aranjuez (Lag., Lge.)

Var.  $\epsilon$  *virella* Clem. *Ens.* Cazalla, cercanías de Zújar, Caniles, Macael, Castril, Carril de la Cuesta de Manzanos, orillas del Barbate, Torcal de Antequera, Málaga, Grazalema, llegando á la altura de 4.500' (Clem.).

\*Var.  $\zeta$  *suberis* Clem. *Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta effu-

sa, tartarea, rugoso-granulosa, cinerea, crassiuscula; apothecis subimmersis, urceolatis, nigris, cinereo-pruinosis, tandem planis, margine accessoria vix'ulla, propria tandem omnino libera, disco concolori, integerrima. Clem. loc. cit. *Picacho de Alcalá de los Gazules* á la altura de 3.000' (Clem.)

*Nomb. vulg. Cast.* Concha de piedra (Lag.). Espejuelo, Barba de peña (Clem.)

### Dirina.

**D. repanda** Nyl. *D. Ceratoniæ Fr.* Schær., t. 4, f. 5. *Lecanora Ceratoniæ Ach.* *Ureeolaria repanda* Schær. *Parmelia repanda* Fr. *Chiodecton africanum* Fée.

*Hab.* España (Lag.) sobre las rocas calizas y las cortezas de los algarrobos y de los enebros seníceos. (n. v.)

### Pertusaria.

**P. communis** DC. Schær., t. 9, f. 1. *Lichen pertusus* L. Dill. *Musc.*, t. 18, f. 9. *Engl. bot.*, t. 677. Schær., t. 9, f. 1. *Porina pertusa* Ach. *Thelotrema pertusum* Ach. Clem. *Lichen carpineus* L. Lag., etc.

*Hab.* España (Clem., Salcedo) y Portugal (Brot.) sobre las cortezas de los árboles en diferentes provincias, llegando en las meridionales á la altura de 6.000' (Clem.) y más arriba. (v. s.)

*Aragon* (Pardo, Loscos): Castelserás, Peñarroya (Pardo, Loscos).

*Santander* (Salcedo.)

*Galicia* (L. Seoane).

*Leon* (L. Seoane): Puerto del Manzanal (L. Seoane).

*Valencia* (Lag., Clem.): Canals (Lag.), Titáguas (Clem.)

*Andalucía* (Clem., Häns.): Carratraca (Clem., Häns.), Sanlúcar de Barrameda (Clem., Lag.), Chiclana, Medina-Sidonia, Alcalá de los Gazules, Sierra del Algibe, Grázailema, San Cristóbal, Desierto de las Nieves, Talla de Pitres, Granada, Sierra de Baza, Caniles de Baza, Cabo de Gata (Clem.), Sierra de la Nieve (Boiss.), Sierra-Nevada (L. Seoane).

*Portugal* (Brot.)

*Var. β plumbea* Le Prev. *Dub. Lichen plumbeus* Salcedo?  
Santander en los montes de Reinosa y Pas (Salcedo).

*Var. γ areolata* Dub. *Thelotrema pertusum* var. *areolatum* Clem. *Ens.* Andalucía en Medina-Sidonia, Alcalá de los Gazules, cerro de San Cristóbal, cumbre del Pinar, Pitres, Cabo de Gata (Clem.).

*Var. δ polycarpa* Clem. *Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta submembranacea, lævigata, inæquabili, cinereo-sublutea, verrucis hæmisphærico-subglobosis; ostiolis 2-8 atris. Clem. loc. cit. Sierra de Baza (Clem.)

*Var. ε gaditana* Colm. *Variolaria gaditana* Clem. *Ens.* Sanlúcar de Barrameda, cercanías de Cádiz (Clem.) sobre las piedras.

*Var. ζ variolosa plana* Schær. *Lichen fagineus* L. Engl. bot., t. 1713. *Variolaria faginea* Pers. Aragón en Castelserás y Peñarroya (Pardo, Loscos), cercanías de Madrid (Lag.), Valencia en Titáguas (Clem.), Andalucía en Grazalema, Alcalá de los Gazules, Granada, Cabo de Gata, Sierra de Baza, llegando á la altura de 7.200' (Clem.), Portugal (Brot.)—La *Polystroma Fernandez* Clem. *Ens.* es la misma *V. faginea* Pers. var. *Fernandez sorediis proliferis* Clem. *Lich. et Flor. bæt. ined.*, indicada por Clemente en el Picacho de Alcalá de los Gazules sobre los alcornoques.

*Var. η variolosa scutellaris* Schær. *Variolaria discoidea* Pers. Engl. bot., t. 1714. *V. amara* Ach. Cercanías de Madrid, Titáguas en Valencia (Clem.)

*P. pustulata* Dub. Nyl. *Porina pustulata* Ach.

*Hab.* España sobre las cortezas de los árboles en el Picacho de Alcalá de los Gazules (Clem.) y en otras partes de Andalucía. (n. v.)

*P. glomerata* Schær.

*Hab.* España en Leon cerca de Villafranca del Vierzo y en Galicia cerca de Lugo (L. Seoane) sobre la tierra. (n. v.)

*P. Wulfenii* DC. *Lichen pertusus* Wulf. non L. *Lichen hymenius* Ach. Engl. bot., t. 1731. *Porina fallax* Ach. *Pertusaria communis* var. *fallax* Schær.

*Hab.* España sobre las cortezas de los árboles en Anda-

lucía cerca de Chiclana y Medina-Sidonia (Clem.) y en las cercanías de Córdoba y Granada (L. Seoane), llegando á la altura de 1.800' (Clem.) próximamente. (v. s.)

*Var. β variolosa Fr.* Lomas del Alcornoque cerca de Medina-Sidonia (Wk.)

### Phlyctis.

**P. agelaea** Wallr. *Urceolaria agelaea* Ach. *Thelotrema variolarioides* Ach.

*Hab.* España (?) y Portugal cerca de Cascaes (L. Seoane) sobre los troncos de los árboles. (n. v.)

### Thelotrema.

**T. pruinosum** Clem. *Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta tartarea, rimosa, lèvigata, inæquabili, cinerea, verrucis hæmisphærico-subglobosis; ostiolis 1-7 nigris, albopruinosis, demum concaviusculis, majusculis. Clem. loc. cit.

*Hab.* España sobre los árboles y rocas en Andalucía en el Cabo de Gata, Medina-Sidonia, Alcalá de los Gazules y el Picacho, llegando á la altura de 3.900' (Clem.) poco más ó ménos. (n. v.)

### LECIDINEAS.

---

### Lecidea.

**L. exanthematica** Nyl. *Lichen exanthematicus Sm.* Engl. bot., t. 1184. *Volvaria exanthematica* DC. *Thelotrema exanthematicum* Ach. *Th. clausum* Schær.

*Hab.* Pirineos sobre las rocas (Poir.)

**L. Prevostia** Schær.

*Hab.* España en Castilla la Vieja cerca de Valladolid (L. Seoane) sobre las rocas. (n. v.)

**L. lutea Schær.** *Lichen luteus Dicks. Engl. bot., t. 1263.*

*Hab.* España (?) sobre las cortezas de los árboles. (n. v.)

**L. pineti Ach.** *L. globosa Clem. Ens. Patellaria pineti Spr. Biatora vernalis δ pineti Fr.*

*Hab.* España en Andalucía cerca de Chiclana (Clem.) sobre las cortezas de los pinos. (n. v.)

**L. lurida Ach.** *Lichen luridus Sw. Engl. bot., t. 1329.*

*Biatora lurida Stenh. Psora lurida DC.*

*Hab.* España (Lag., Clem., Hæns.) sobre las rocas calizas en varias provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 600-6.900' (Clem.) ó algo más. (v. s.)

*Asturias* (Lag.): Arvas (Lag.)

*Leon* (Lag.): Vegalamosa (Lag.)

*Valencia* (Clem.): Titaguas (Clem.)

*Andalucía* (Lag., Clem., Hæns.): Jaen (Lag., Clem.), Carratraca (Clem., Hæns., Boiss.). Alcalá de los Gazules, Sierra del Pinar, Sierra de Tolox, monte Javalcol, Sierra-Nevada, Castril (Clem.), Málaga en el cerro Coronado (Clem., Lge.)

**L. testacea Ach.** *Mich., t. 51, f. 2. Lecanora testacea Ach. Biatora testacea Fr.*

*Hab.* España en los Pirineos (Duf.) sobre las rocas calizas, y en Andalucía en la Sierra de la Nieve á la altura de 6.000' (Boiss.), en la Sierra-Nevada en el Dornajo y cerca de Granada (Wk.) en sitios semejantes. (n. v.)

**L. deformis Clem.** *Lich. et Flor. bæt. ined. Thallo crustaceo, effigurato, effuso, imbricato, cinereo, lævi; lobis confertis, minutis, subincisis, apice dilatato-suborbicularis; patellulis atris, marginalibus, planis, adpressis, demum convexis, confluentibus, deformibus, margine integerima. Clem. loc. cit.*

*Hab.* España en la Sierra-Nevada de Andalucía sobre el granito en la cima de Mulahacen, Puerto del Rejon, Vacares, Trevélez, Sierra de Baza, á la altura de 6.600-12.762' (Clem.), ó sea hasta lo más elevado. (n. v.)

**L. ehrhartiana Ach.** *Lichen ehrhartianus Ach. Engl. bot., t. 1136. Parmelia varia ζ parasitica Fr. Lecanora varia γ ehrhartiana Schær.*

*Hab.* España en Andalucía (Clem.) sobre las cortezas de las encinas. (n. v.)

**L. vernalis Ach.** *Lichen vernalis L. Dill. Musc.*, t. 18, f. 4. *Biatora vernalis Fr. Lichen sphæroides Dicks.* t. 2, f. 2. *Lecidea sphæroides Schær.*

*Hab.* España sobre la tierra en Andalucía cerca de Sanlúcar de Barrameda, llegando á la altura de 3.300' (Clem.) próximamente. (n. v.)

**L. viridescens Ach.**

*Hab.* España en Galicia cerca de Lugo (L. Seoane) sobre los troncos podridos. (n. v.)

**L. decolorans Flk. Ach.** *Biatora decolorans Fr. Lecidea granulosa Ach. Patellaria granulosa DC. Patellaria granulosa et decolorans Hoffm.*, t. 30, f. 3, et t. 39 f. 2.

*Hab.* España (Clem., Dur.) sobre la tierra, los musgos destruidos, las cortezas de los árboles y los leños podridos en algunas provincias, llegando en las meridionales á la altura de 1.800'. (Clem.) ó algo más. (n. v.)

Asturias (Dur.): Pico de Arvas (Dur.)

Andalucía (Clem.): Sanlúcar de Barrameda, la Marismilla, Chiclana, Medina-Sidonia, Alcalá de los Gazules, Sierra de Tolox, Las Nieves, Cabo de Gata (Clem.), Sierra-Nevada (L. Seoane).

Var.  $\beta$  *porriginosa Clem. Ens.* Chiclana, Medina-Sidonia, Alcalá de los Gazules, Ubrique, Sierra de Baza (Clem.), Carratraca (Clem., Hæns.)

**L. plicata Clem. Ens. Ach.** *Biatora plicata Fr.*

*Hab.* España en Andalucía cerca de Medina-Sidonia á la altura de 1.200' (Clem.) sobre la tierra. (n. v.) Acaso sea la *Lecanora endocarpæa Nyl.* en estado de vejez, al parecer de Fries.

**L. glebulosa Clem. Lich. et Flor. bæt. ined.** Crusta tartarea, glebuloso-rimosa, crassissima, subimbricata, gyroso-rugosissima, cinerea; patellulis globoso-diformibus, inmarginatis, fusco-atris. Clem. loc. cit.

*Hab.* España en la Sierra-Nevada á la altura de 6.000' (Clem.) sobre el granito. (n. v.)

**L. uliginosa Ach.** *Biatora uliginosa Fr.*

*Hab.* España cerca de Leon (L. Seoane) sobre la tierra.  
(n. v.)

**L. coarctata Nyl.** *Parmelia seu Lecanora coarctata*  
*Ach. Lichen glebulosus Sm. Engl. bot., t. 1955.*

*Hab.* España (Lag.) sobre varias rocas. (n. v.)

**L. carneola Ach.** *Biatora carneola Fr. Lichen corneus Sm. Engl. bot., t. 965. Lecidea cornea Ach. Schær.*

*Hab.* España en Andalucía en la Sierra de Palma (Wk.) sobre las cortezas de los árboles. (n. v.)

**L. pachycarpa Duf.** *Biatora pachycarpa Fr. Lichen incanus Sm. Engl. bot., t. 1683. Lecidea incana Turn. et Borr. Byssus incana L. Lepraria incana Ach. Clem.*

*Hab.* España (Lag., Clem., Duf.) y Portugal (Vand.) sobre la tierra, los musgos y árboles en diferentes provincias, llegando en las meridionales á la altura de 7.800' (Clem.) y más arriba. (v. s.)

*Cataluña* (E. Bout.): Monserrat (E. Bout.)

*Santander* (Salcedo).

*Castilla la Nueva* (Lag.): Madrid en el Retiro y Jardin Botánico (Lag.)

*Andalucia* (Clem.): Sierra-Nevada en el barranco de Trevélez (Clem.)

*Portugal* (Vand.)

*Var.  $\beta$  latebrarum Dub.* *Lepraria latebrarum Ach.* Madrid en el Jardin Botánico (Lag.)

**L. canescens Ach.** *Lichen canescens Dicks. Dill.*  
*Musc., t. 18, f. 17. A. Engl. bot., t. 582. Placodium canescens DC.*

*Hab.* España sobre las cortezas de los árboles en Andalucía cerca de Medina-Sidonia, los Puertos, Sanlúcar de Barrameda (Clem.), Chiclana, el Berrueco (Lag.) llegando á la altura de 300' (Clem.) próximamente. (v. s.)

**L. cana Clem.** *Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta rimoso-granulosa, alba, suborbiculata, tartarea, contigua, tenuis, glabriuscula, incana, ambitu lineam fere lato, tenui et palpabili, lobis extimis linearibus, angustissimis, subconvexis, apice subdilatatis et subbisidis. Clem. loc. cit.

*Hab.* España en la Sierra-Nevada á la altura de 7.200' (Clem.) sobre el granito. (n. v.)

**L. decipiens Ach.** *Schær.*, t. 5, f. 2. *Lichen decipiens Ehrh.* *Engl. bot.*, t. 870. *Psora decipiens Hoffm.* *Biatora decipiens Fr.*

*Hab.* España (Clem., Hæns., Lag., Lge.) sobre la tierra en los montes de algunas provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 2.700-7.500' (Clem.), y más abajo en otras. (v. v.)

*Aragon* (Pardo, Loscos).

*Castilla la Nueva* (Lag., Wk.): Madrid dentro del Jardin Botánico (Lag.), Ribas (Colm.), Aranjuez (Colm., Wk.)

*Valencia* (Clem.): Titáguas (Clem.)

*Andalucía* (Clem., Hæns.): cercanías de Carratraca (Clem., Hæns., Boiss.), Sierra-Nevada (Clem., Wk.), Sierra de Lújar, Cantoria (Clem.), Granada (Lag.), Sierra de la Nieve (Boiss.)

*Var. fucescens Hampe.* Cercanías de Granada (Wk.)

**L. mammillaris Duf.** *Lichen mammillaris Gouan.*

*L. tumidulus Sm.* *Trans. Linn. I.*, t. 4, f. 3.

*Hab.* España en Valencia cerca de Murviedro (Duf.) y en Aragon cerca de Alcañiz y Castelserás (Pardo, Loscos), sobre las rocas calizas y los troncos de algunos árboles. (n. v.)

**L. candida Ach.** *Lichen candidus Weber.* *Engl. bot.* t. 1138. *Psora seu Patellaria candida Hoffm.*, t. 33, f. 2.

*Hab.* España (Lag., Clem.) y Portugal (Vand.) sobre la tierra, los árboles, musgos y rocas en varias provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 6.000' (Boiss.), algo más arriba y más abajo (Clem.) en diversas localidades. (v. s.)

*Cataluña* (E. Bout.): Monserrat (E. Bout.)

*Aragon* (Asso).

*Asturias* (Lag., Dur.): Arvas (Lag., Dur.)

*Leon* (Lag.): Vegalamosa (Lag.)

*Castilla la Nueva* (Lag.): cercanías de Madrid (Lag.)

*Valencia* (Clem.): Titáguas (Clem.)

*Murcia* (Lag.)

*Andalucía* (Lag., Clem.): Jaen (Lag., Clem.), Benaocaz,

dehesa del Boyar, Torcal de Antequera, Córtes, Sierra de María (Clem.), Sierra de la Nieve (Boiss.)

*Portugal* (Vand.)

**L. bifrons Clem.** *Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta areolata, tartarea, intus alba, areolis viridi-cæsiis et viridi-luteis, albo-marginalis, minutis, inæqualibus, varie angulosis; patellulis minutis, pellucidis, dilute flavo-fuscis, subglobosis, basi immersis, immarginatis, consertis. Clem. loc. cit.

*Hab.* España en Andalucía sobre las rocas calizas, llegando á la altura de 6.300' (Clem.) próximamente. (n. v.)

**L. vesicularis Ach.** *Lichen sedifolius Scop.* *Psora seu Patellaria vesicularis Hoffm.*, t. 32, f. 3. *Lichen cæruleo-nigricans Lightf. Engl. bot.*, t. 1139.

*Hab.* España (Lag., Clem.) y Portugal (Brot.) sobre la tierra y las rocas en los Pirineos (Poir., Duf.) y en otros montes, hallándose en los de las provincias meridionales á la altura de 2.100-6.000' (Clem.) ó poco más. (v. s.)

*Castilla la Nueva* (Lag.): Madrid dentro del Jardín Botánico (Lag.)

*Valencia* (Clem.): Titáguas (Clem.)

*Andalucía* (Clem., Hæns.): Carratraca (Clem., Hæns., Boiss.), Estepa, Antequera, Sierra-Nevada (Clem.), Granada hacia el Convento de Jesus del Valle (Wk.)

*Portugal* (Brot.)

*Var.  $\alpha$  opuntioides Fr.* *Lichen opuntioides Villars.* Granada (Wk.)

**L. albilibra Duf.** *Biatora albilibra Fr.* *Lecidea paradoxæ Schær.*

*Hab.* España en Valencia (Duf.) y en la Sierra-Nevada de Andalucía á la altura de 6.000' (J. W. Schimper) sobre la tierra y en las hendiduras de las rocas. (n. v.)

**L. tabacina Schær.** *Lichen tabacinus Poir.* *Psora tabacina DC.* *Biatora tabacina Fr.*

*Hab.* Pirineos (Ramond).

**L. cinereo-virens Schær.**

*Hab.* España en Valencia (Duf.) sobre la tierra y las rocas. (n. v.)

**L. conglomerata Ach.** *Schær. Lichen aromaticus Sm. Engl. bot., t. 1772.*

*Hab.* España en la Sierra-Nevada de Andalucía (Boiss.) sobre las rocas. (n. v.)

**L. parasema Ach.** *Lichen sanguinarius Auct. vet. Dill. Musc., t. 18, f. 3. Patellaria parasema DC.*—La *Lecidea seu Lepraria alba Ach.*, indicada por Lagasca y Clemente, puede referirse á un estado de la especie expresada.

*Hab.* España (Lag., Clem.) y Portugal (?) sobre las cortezas de los árboles y algunas veces sobre la tierra en diversas provincias, llegando en las meridionales á la altura de 12.762' (Clem.) próximamente. (v. v.)

*Prov.* Vascongadas (Lag., Fée): Vitoria (Fée).

*Galicia* (L. Seoanè): cercanías de Lugo (L. Seoane).

*Castilla la Nueva* (Lag.): Madrid dentro del Jardín botánico, Casa de Campo, Ribas, San Fernando, Alcalá de Henares (Lag.)

*Valencia* (Clem.): Titáguas (Clem.)

*Andalucía* (Clem., Hæns.): Carratraca (Clem., Hæns., Boiss.), Chiclana, Grazalema, Sierra-Nevada en el Mulahacen, Cabo de Gata (Clem.), Sierra de la Nieve (Boiss.)

*Var.*  $\beta$  *elæochroma Ach.* *Lecidea elæochroma Ach.* Algaida de Sanlúcar de Barrameda y otras partes, llegando á la altura de 6.000' (Clem.)

*Var.*  $\gamma$  *punctata Ach.* *Lichen punctatus Scop.* Alcalá de los Gazules á la altura de 1.200' (Clem.)

**L. enteroleuca Ach.**—Es rigorosamente mera variedad de la *Lecidea parasema Ach.*

*Hab.* España (Lag.) sobre los castaños. (n. v.)

**L. petræa Flot.** *L. atro-alba Ach.* *L. confervoides Schær. Rhizocarpon confervoides DC.*—La *Lecidea Oederi Ach.* *Lichen Oederi Sw.* es forma de la misma especie.

*Hab.* España en el valle de Aran (Villers) y cerca de Madrid en el Retiro y Casa de Campo (Clem.) sobre las piedras. (n. v.)

*Var.*  $\beta$  *concentrica Nyl.* *Lichen concentricus Dav. Sm. Engl. bot., t. 246. Lecidea atroalba e subconcentrica Fr.* Ver-

*rucaria petræa* Hoffm. *Lichen petræus* Brot. Portugal cerca de Elvas en el Alentejo (Brot.)

**L. atro-alba** Flot. *Lichen atro-albus* L. Engl. bot., t. 2336. *Leccidea atro-alba* Ach.

*Hab.* España en Andalucía sobre las rocas calizas del Berrueco (Clem.), y Sierra-Nevada, en la bajada del collado de Vacares (Boiss.)

**L. contigua** Fr. *Verrucaria contigua* Hoffm.? *Lichen contiguus* Sm. Clem. Ens.—El *Byssus saxatilis* L. es un estado de la especie, segun Fries.

*Hab.* España en el Monserrat de Cataluña (E. Bout.), Santander (Lge.) y en Andalucía cerca de Alcalá de los Gazules, á la altura de 1.800' (Clem.), sobre las rocas. (n. v.)

**L. confluens** Schær. *Lichen confluens* Web. Engl. bot., t. 1964. *Brot. Verrucaria confluens* Hoffm. *Patellaria confluens* Dub.

*Hab.* España (Villers, Clem.) y Portugal (Brot.) sobre las rocas en algunas provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 7.500-9.000' (Boiss.), y más abajo (Clem.) en diversas localidades. (n. v.).

*Cataluña* (Villers): valle de Arán (Villers).

*Andalucia* (Clem.): Sierra-Morena, Alcalá de los Gazules, Torcal de Antequera, Portugos, Sierra de Baza, Carril de la Cuesta del Manzano cerca de Barbate (Clem.), Sierra-Nevada (Clem., Boiss.)

*Portugal* (Brot.): Alentejo, Beira (Brot.)

*Var.  $\beta$  pilularis* Ach. *Lichen pilularis* Davies. Sierra-Nevada cerca de las Lagunillas, Cabo de Gata, llegando á la altura de 9.600' (Clem.)

*Var.  $\epsilon$  steriza* Ach. Sierra-Nevada (Clem., Boiss.), cercanías de las Lagunillas, inmediaciones de la Laguna de Vacares, Trevélez, á la altura de 9.300-9.750' (Clem.)

**L. albo-cærulescens** Ach. *Lichen albo-cærulescens* Wulf. in Jacq. Collect. II, t. 15, f. 1. *Patellaria albo-cærulescens* Hoffm.—La *L. privigna* Clem. Lich. bæt. diversa de la de Acharius, es forma<sup>2</sup> de la especie expresada.

*Hab.* España (Dur., Wk.) sobre las rocas en varias pro-

vincias, hallándose en las meridionales á la altura de 1.800' (Clem.) y más arriba. (n. v.)

*Asturias* (Dur.): monte situado al oriente del Naviego (Dur.)

*Andalucía* (Clem., Wk.): Sierra-Nevada en el Dornajo (Wk.)

*Var.  $\beta$  speirea Flk.* *Lecidea calcarea  $\beta$  speirea Schær.*  
*Spic.* *Urceolaria pellobotrya Zwackh.* herb. et forsor Clem.  
*Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta tartarea, subspongiosa, cinea-  
 rea, intus alba, verrucoso-areolata, crassiuscula, glabra; ver-  
 rucis tumidulis, valde inæqualibus, difformibus, sublobatis,  
 plerisque oblongis versus ambitum subradiatim dispositis;  
 apotheciis immersis, planiusculis, nigris, difformibus, mar-  
 gine accessoria, spuria, integerrima, inflexa, crassiuscula.  
 Clem. loc. cit. Sierra-Nevada sobre el granito á la altura de  
 10.200-12.762' (Clem.), Corral de Veleta y Mulahacen (L.  
 Seoane).

**L. calcarea Fr.** *Lichen calcareus* Weis. non *L. Patellaria seu Verrucaria calcarea* Hoffm., t. 56, f. 2.

Hab. España (?) sobre las rocas calizas. (n. v.)

**L. lamicida Ach.** *Fr.* *L. cinereo-atra* Ach. *Patellaria lamicida* DC. Engl. bot., t. 821.

Hab. España sobre las rocas duras en Andalucía cerca de Medina-Sidonia, el Berrueco, Alcalá de los Gazules, Caniles, Sierra de Baza en el cortijo del Tocon, á la altura de 1.224-3.700' (Clem.) poco más ó menos. (n. v.)

*Var.  $\beta$  silacea Fr.* *Nyl.* *Lecidea silacea* Ach. Andalucía sobre las rocas areniscas cerca de Alcalá de los Gazules á la altura de 1.800-3.300' (Clem.)

**L. ambigua Ach.** *L. variegata* Fr.

Hab. España en la Sierra-Nevada (L. Seoane) sobre las rocas. (n. v.)

**L. fusco-atra Ach.** *Lichen fusco-ater* L. *Lecidea fu-*  
*mosa* Ach. *Patellaria fumosa* DC. Hoffm., t. 49, f. 2.

Hab. España (Asso, Villers) sobre las rocas areniscas y otras en varias provincias, llegando en las meridionales á la altura de 1.800' (Clem.) próximamente. (n. v.)

*Cataluña* (Villers): valle de Aran (Villers).

*Aragon* (Asso): monte de Herrera (Asso).

*Castilla la Nueva* (Lag.): Escorial (Lag.)

*Andalucía* (Clem.): murallas de Cádiz, Alcalá de los Gazules (Clem.), cercanías de Granada (L. Seoane).

**L. atro-brunnea Schær.** *Lichen atro-brunneus Ram.*

*Rhizocarpon atro-brunneum DC.* *Patellaria atro-brunnea Dub.*

*Hab.* España en los Pirineos (Ram.) y la Sierra-Nevada de Andalucía á la altura de 9.000-10.000' (Boiss., Wk.) sobre las rocas graníticas y pizarrosas. (n. v.)

**L. armeniaca Schær.** *Lichen armeniacus Poir.* *Rhizocarpon armeniacum DC.* *Patellaria armeniaca Dub.* *Lecidea viridi-atra Ach.* *Patellaria viridi-atra Dub.*

*Hab.* España (Villers, Clem.) sobre las rocas graníticas y pizarrosas en los Pirineos, valle de Aran (Villers) y en los montes de Andalucía (Clem.) á grande altura. (n. v.)

**L. ænea Duf.** *Parmelia ænea Fr.* *Lecanora badia* <sup>β</sup> *ænea Schær.*

*Hab.* España en los Pirineos (Duf.), en la Sierra de Tejeda en Andalucía (Cabr., Boiss.) y en la dehesa de Alfacar (L. Seoane) sobre las rocas graníticas y pizarrosas. (n. v.)

**L. morio Schær.** *Lichen morio Poir.* *Rhizocarpon morio DC.* *Patellaria morio Dub.*

*Hab.* España en los Pirineos (Ram.) y la Sierra-Nevada de Andalucía á la altura de 9.000-10.000' (Boiss.), sobre las rocas graníticas y pizarrosas. (n. v.)

**L. calcivora Nyl.** *Lichen calcivorus Ehrh.* *Lichen immersus Brot.* *et alior.* *Lecidea immersa a calcivora Schær.*

*Hab.* España (Clem., Lag.) y Portugal (Brot.) sobre las rocas calizas en diferentes provincias, llegando en las septentrionales á la altura de 4.500' (Wk.) y en las meridionales á la de 7.950' (Clem.), ó solamente á la de 5.000-6.000' (Boiss.) en diversas localidades. (v. s.)

*Valencia* (Clem.): Titágua (Clem.)

*Andalucía* (Clem., Boiss.): cercanías de Cádiz, Chiclana, Medina-Sidonia, Alcalá de los Gazules, Ubrique, Grazalema, cerro de San Cristóbal, Torcal de Antequera, monte Javalcol, Sierra de Lújar, Carratraca, Córtes, Sierra de María, Castril

(Clem.) Sierra-Nevada, Sierra de Tejeda (Boiss.), inmediaciones de Málaga (Lge.).

*Portugal* (Brot.): Paço d'Arcos, Mafra, Arrabida y otras partes en la Extremadura portuguesa (Brot.).

*Var. β Wulfenii Clem. Ens. Lecidea seu Urceolaria Wulfenii Ach. Verrucaria purpurascens Hoffm. V. versicolor Clem. Lich. et Flor. bæt. ined.* Cataluña en el valle de Aran (Villers), Prov. Vascongadas en la Peña Gorveya (Wk.), Valencia en Titáguas, Andalucía en las inmediaciones de Cádiz y Chiclana en el Berrueco, Medina-Sidonia, Alcalá de los Gazules, llegando á la altura de 3.600' (Clem.), Portugal en Paço d'Arcos, Mafra, Arrabida y otras partes en la Extremadura portuguesa (Brot.).

**L. rivulosa Ach. Biatora rivulosa Fr.**

*Hab.* España en Galicia (L. Seoane) y otras provincias (Fr.) sobre las rocas graníticas y las cortezas de varios árboles. (n. v.)

*Var. β Kochiana Schær. Lecidea Kochiana Hopp.* Sierra-Nevada en el Picacho de Veleta (W. P. Schimper).

**L. leucocephala Schær. Verrucaria leucocephala Ach. Borr. Engl. bot. Suppl., 2642, f. 2.**

*Hab.* España en la Sierra-Nevada de Andalucía y en Galicia (L. Seoane) sobre los troncos de los árboles. (n. v.)

**L. cerebrina Schær. Opegrapha cerebrina Ram. DC.**

*Hab.* Pirineos (Ram.) sobre las rocas calizas. (n. v.)

**L. albo-atra Schær. Lichen albo-ater Hoffm. Lichen corticola Ach. Engl. bot., t. 1892.**

*Hab.* España (Pardo, Loscos) sobre las rocas calizas y las cortezas de los árboles. (n. v.)

*Var. β margaritacea Rabenh.* Aragón cerca de Castelserás (Pardo, Loscos).

**L. geographica Schær., t. 5, f. 3. Lichen geographicus L. Lecidea atro-virens β geographica Ach. Rhizocarpon geographicum DC. Patellaria geographica Dub.**

*Hab.* España (Asso, Lag.) y Portugal (Brot.) sobre las rocas en los montes de varias provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 7.000-8.000' (Boiss., Wk.), y de 1.800-11.100' (Clem.) en diversas localidades. (v. v.)

*Cataluña* (Villers, E. Bout.): valle de Aran (Villers), Montserrat (E. Bout.)

*Aragon* (Asso): monte de Herrera, Moneayo (Asso).

*Santander* (Salcedo).

*Galicia* (Lge.)

*Castilla la Vieja* (Duf.): Burgos, Sierra de Guadarrama (Duf.), Guadarrama (Colm.)

*Andalucia* (Clem.): Sierra-Morena, Alcalá de los Gazules, Sierra del Algibe, Sierra del Pinar, Benaozaz, Ubrique, Grazalema, cerro de San Cristóbal, Sierra de Tolox, Cortés, Júscar, Lubrin, Tahal, Tabernes, Portugos, Granada, Sierra-Nevada, cima de Nimar, monte Jabalcol, Huércal, Caniles, Sierra de Baza (Clem.), Picacho de Veleta (Bory), Carratraca (Clem., Hæns.), Sierra-Nevada (Boiss., Wk.)

- *Extremadura* (Villaescusa): Alange (Villaescusa.)

*Portugal* (Brot.)

*Var. α decipiens* Clem. Lich. et Flor. bæt. ined. Crusta effusa, tenuissima, atra, verrucis planis et subconvexis, minutissimis, confertis, subpulverulentis, versicoloribus; patellulis planis, immixtis, atris, subconfluentibus, tandem convexo-subglobosis, minutis emarginatis. Clem. loc. cit. El Berrueco, Alcalá de los Gazules, Sierra-Nevada á la altura de 1.800-9.000' (Clem.)

*Var. β vitellina* Clem. Lich. et Flor. bæt. ined. Crusta effusa, atra, tenuissime rimosa, verrucis confertis, sparsisque, minutissimis, et lineam fere tandem latis, planiusculis, tandemque valde convexis et fere globosis, plus minus plurimque rugosis, disformibus, subpulverulentis, vitellinis; patellulis planiusculis, immixtis, atris. Clem. loc. cit. Sierra-Nevada principalmente en el Mulahacen, cercanías de la laguna de Vacares, Trevélez, Huércal, Carratraca, llegando á la altura de 9.750' (Clem.)

*L. mutabilis* Clem. Lich. et Flor. bæt. ined. Crusta effusa, tenuissima, tenuissime rimosa, atra, verrucis subconvexis, minutissimis, confertis, cinereis, albis et viridibus, subpulverulentis; patellulis in sicco planiusculis, humectatis, convexo-subglobosis, immixtis in sicco atris, humectatis fuscais et lateis, subconfluentibus, minutis, marginatis; disco in

siccо subpulverulento. Clem. loc. cit.—Apenas difiere de la *L. atrovirens* Ach.

*Hab.* España sobre las rocas en el Mochuelo del Cabo de Gata y en las inmediaciones de Cádiz, Chiclana y Alcalá de los Gazules, llegando á la altura de 1.800' (Clem.) próximamente. (n. v.)

*L. granatensis* Clem. *Lich. et Flor. bæt. ined.* Thallo crustaceo, effigurato, effuso, fusco et flavicantli, rugoso-verrucoso, verrucis disformibus, plus minus convexis, rarius planiusculis, interdum ad lentem angulosis, nitidiusculis, discretis, saepe sparsis, raro imbricatis, margine dum conspiciua, griseis; patellulis marginatis, atris, planis, demum convexiusculis, verrucis interjacentibus, demum subconfluentibus, subdisformibus. Clem. loc. cit.—Acaso sea mera variedad de la *L. atro-virens* Ach.

*Hab.* España sobre el granito en la Sierra-Nevada de Andalucía y en el mismo Mulahacen á la altura de 10.350-12.762' (Clem.), ó sea en lo más elevado. (n. v.)

*L. melambola* Ach. *L. altra* Clem. *Ens.*

*Hab.* España en Andalucía sobre las rocas areniscas cerca de Alcalá de los Gazules, en el Berrueco, monte Javalcol, Uijar y otras partes á la altura de 1.800-5.400' (Clem.) próximamente. (n. v.)

*L. pellucida* Clem. *Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta tartarea, tenui, subrimosa, cinerea, fusco-subpulverulenta; patellulis globosis, immarginatis, minutis, fusco-flaventibus, superficialibus, pellucidis, confertis. Clem. loc. cit.

*Hab.* España en Andalucía sobre las rocas cerca de Cádiz y en Alcalá de los Gazules, á la altura de 1.800' (Clem.) ó algo más. (n. v.)

*L. disseminata* Clem. *Flor. bæt. ined.* Crusta leprosa ad lentem minutissime è granillis composita, inaequilater et irregulariter sparsa, obscure viridi; patellulis minutis, convexis, dilute fusco-luteis, pellucidis, immarginatis, levibus, regularibus. Clem. loc. cit.

*Hab.* España en Andalucía sobre las rocas calizas en el Berrueco y otras partes, llegando á grande altura (Clem.) en las sierras. (n. v.)

**L. cisticola Clem.** *Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta subleprosa, subrimosa, albo-virenti et subflaventi; patellulis planis, submarginatis, demum convexis, conglomeratis, inæqualibus, minutissimis, luteo-subfuscis, albo-pruinosis, demum obscure fuscis et glaberrimis. Clem. loc. cit.

*Hab.* España en Andalucia sobre los cistos en Sanlúcar de Barrameda (Clem.) è inmediaciones. (n. v.)

**L. spongiosa Clem.** *Flor. bæt. ined.* Crusta cinerea, crassa, subtus valde spongiosa; patellulis fulvo-rubris convexis. Clem. loc. cit.

*Hab.* España sobre los olivos en el Desierto de las Nieves (Clem.) y en otras partes de Andalucia. (n. v.)

**L. sanguinaria Ach.** *Lichen sanguinarius L. Engl. bot., t. 155.* *Verrucaria sanguinaria Hoffm.* *Patellaria sanguinaria Dub.*

*Hab.* España (Asso, E. Bout., Lag.) sobre las cortezas de los árboles, los leños podridos, las piedras y tierra en diversas provincias. (v. s.)

*Cataluña* (E. Bout.): Monserrat (E. Bout.)

*Aragon* (Asso): monte de Herrera (Asso).

*Castilla la Nueva* (Lag.): Galapagar (Lag.)

### Gomphilus.

**G. calicioides Nyl.** *Bæomyces calicioides Delis.*

*Hab.* España en la Sierra-Nevada (L. Seoane) sobre los musgos. (n. v.)

### XILOGRAFIDEAS.

---

### Lithographa.

**L. tesserata Nyl.** *Opegrapha tesserata DC.*

*Hab.* España en Galicia cerca de Cuntis (L. Seoane) sobre las rocas. (n. v.:

## GRAFIDEAS.

## Graphis.

**G. scripta Ach.** *Lichen scriptus L. Dill. Musc.*, t. 18, f. 1. *Opegrapha scripta Ach. Schær.*, t. 5, f. 5.

Hab. España (Clem., E. Bout.) y Portugal (Brot.) sobre las cortezas lisas de los árboles y arbustos en muchas provincias, llegando en las meridionales á la altura de 7.500' (Clem.) próximamente. (n. s.)

Aragón (Lletget, Pardo, Loscos): Tiermas (Lletget).

Cataluña (E. Bout.): Monserrat (E. Bout.)

Andalucía (Clem.): Sierra-Nevada (L. Seoane).

Extremadura (Villaescusa): Alange (Villaescusa).

Portugal (Brot.)

Var.  $\beta$  *recta* Fr. Schær. *Opegrapha recta* Humb. *O. betuligna* Pers. *Graphis betuligna* Ach. Montañas de Santander (Salcedo).

Var.  $\gamma$  *pulverulenta* Schær. *Graphis pulverulenta* Ach. *Opegrapha pulverulenta* Pers. Medina-Sidonia, Alcalá de los Gazules á la altura de 1.500-3.300' (Clem.), Sierra-Nevada y cercanías de Granada (L. Seoane).—Es forma suya la *Graphis seu Opegrapha pulverulenta*  $\delta$  *microcarpa* Ach., y se halla en las mismas localidades (Clem.)

**G. dendritica Ach.** *Opegrapha dendritica* Ach. Sm. Engl. bot., t. 1756.

Hab. España sobre las cortezas de los árboles (Fr.) en varias partes. (n. v.)

**G. elegans Ach.** *Opegrapha elegans*. Sm. Engl. bot., t. 1812.

Hab. España sobre las cortezas de las hayas (Schousb.) en varios montes. (n. v.)

**Opegrapha.**

**O. lyncea Borr.** *Lichen lynceus* Sm. Engl. bot., t. 809.  
*Levidea lyncea* Ach. *Lecanactis lyncea* Eschw. Fr.

Hab. España sobre las cortezas de los árboles en Andalucía cerca de Chiclana (Clem.)—La var. *spilomatica* Fr. *Spiloma melaleucum* Ach. es originada por un honguillo llamado *Spilomium Graphideorum* Nyl., cuyas esporas negras sustituyen á los apotecios del liquen segun Nylander. (n. v.)

**O. varia Pers.** Fr. Nyl.

Hab. España (Clem.) sobre las cortezas de los árboles principalmente y con ménos frecuencia sobre los leños y piedras. (v. s.)

Var.  $\alpha$  *pulicaris* Fr. *Lichen pulicaris* Hoffm., t. 3, f. 2.  
*Opegrapha vulvella* Ach. Inmediaciones de Chiclana sobre los pinos (Clem.)—Hay una forma que es la *O. vulvella* var. *lutescens* Clem. Ens.

Var.  $\beta$  *notha* Fr. *Opegrapha notha* Ach. *O. lichenoides* Pers. Engl. bot., t. 1890. *O. verrucarioides* Ach. Cercanías de Chiclana en Andalucía sobre las higueras (Clem.) é inmediaciones de Neda, Tuy y Vigo en Galicia sobre los troncos secos (L. Seoane).

Var.  $\gamma$  *diaphora* Fr. *Opegrapha diaphora* Ach. Engl. bot., t. 2280. Sanlúcar de Barrameda sobre los naranjos (Clem.)

**O. saxatilis DC.** *O. saxicola* Ach. *O. calcarea* Ach.

Hab. España en Andalucía cerca de Medina-Sidonia y en Alcalá de los Gazules (Clem.) sobre las rocas. (n. v.)

**O. atra Pers.** Ust. Anal. VII, t. 1, f. 2. *O. denigrata* Ach. *O. atra*  $\alpha$  *denigrata* Schär.

Hab. España (Lag., Clem.) sobre las cortezas lisas de los árboles en varias provincias, llegando en las meridionales, á la altura de 8.100' (Clem.) próximamente. (v. s.)

Prov. Vascongadas (Lag.): Irun (Lag.)

Andalucía (Clem.): Algaida de Sanlúcar de Barrameda, Sierra de Baza (Clem.)

**O. vulgata Ach.** Engl. bot., t. 1811. *O. atra vulgata* Schär.

*Hab.* España (Lag., Clem.) sobre las cortezas de los árboles principalmente en diversas provincias, llegando en las meridionales á la altura de 7.500' (Clem.) ó más. (v. s.)

*Prov.* Vascongadas (Lag.): Irun (Lag.)

*Andalucía* (Clem.): Medina-Sidonia, Alcalá de los Gazules, Ujíjar, Cabo de Gata (Clem.), Sierra-Nevada (L. Seoane).

*Var.*  $\beta$  *hapalea* Ach. España sobre las cortezas de las encinas (Lag.)

*Var.*  $\gamma$  *geographica* Clem. Valencia en Titáguas, Andalucía en Granada y Cabo de Gata (Clem.)

### Stigmatidium.

**S. crassum** Dub. *Opegrapha crassa* DC. *Arthonia crassa* Duf. *Lichen obscurus* Sm. Engl. bot., t. 1752.

*Hab.* España (?) sobre los árboles. (n. v.)

### Arthonia.

**A. cinnabarina** Wallr. *Coniocarpon cinnabarinum* DC. Fr. *Spiloma tumidulum* Ach.

*Hab.* España (?) sobre las cortezas de varios árboles. (n. v.)—El *Spiloma leucostigma* Ach., indicado en Valencia cerca de Titáguas y en Andalucía cerca de Alcalá de los Gazules (Clem.), debe como otros su origen á diversos liquenes, segun Fries.

**A. astroidea** Ach. *Opegrapha astroidea* Ach. Clem. Engl. bot., t. 1847. *O. radiata* Pers.

*Hab.* España (Clem.) sobre las cortezas de los árboles en diferentes provincias, llegando en las meridionales á la altura de 6.000' (Clem.) en algunas localidades. (n. v.)

*Andalucía* (Clem.): Sanlúcar de Barrameda, Chiclana, Alcalá de los Gazules, Cabo de Gata (Clem.), Sierra-Nevada (L. Seoane).

*Var.*  $\beta$  *epipasta* Nyl. *Arthonia epipasta* Leight. *Opegrapha epipasta* Ach. Clem. Sanlúcar de Barrameda, cercanías de Cádiz (Clem.)

### Chiodecton.

**Ch. myrticola** Féé. *Ess.*, t. 18, f. 1. *Schær.*, t. 8, f. 6.

*Hab.* España en Galicia, territorios de la Ulla y Vigo (L. Seoane), sobre los troncos de los mirtos cultivados. (v. v.)

### ENDOCARPEAS.

---

#### Endocarpon.

**E. miniatum** Ach. *Schær.*, t. 9, f. 2. *Lichen miniatus* L. *Dill. Musc.*, t. 30, f. 127. *Engl. bot.*, t. 593.—El *Endocarpon cirsodes* Ach. *Lag.* difiere poco del tipo.

*Hab.* España (Lag., Clem.) sobre las rocas en diversas provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 3.300-7.200' (Clem.) próximamente. (v. s.)

Cataluña (Lag.): Monserrat (Lag.)

Aragón (Pardo, Loscos): Castelserás (Pardo, Loscos).

Asturias (Lag.): Arvas (Lag.)

Valencia (Clem.): Titáguas (Clem.)

Andalucía (Clem.): Granada, Sierra-Nevada en el barranco de Trevélez, Sierra del Pinar y otras de la Serranía de Ronda, Alcalá de los Gazules (Clem.), Sierra de Tolox (Clem., Boiss.)

Var.  $\beta$  *complicatum* Fr. *Schær.* *Endocarpon complicatum* Ach. *Lichen complicatus* Sw. *L. miniatus* Sm. *Engl. bot.*, t. 593, f. inf. Pirineos, debajo del Puerto de Benasque en Aragón (Lge.), Sierra-Nevada de Andalucía en lo alto (Boiss.)

**E. fluvatile** DC. *Lichen fluvialis* Web. *L. aquaticus* Weis. *Engl. bot.* t. 594. *Platisma aquaticum* Hoffm. *Endocarpon Weberi* Ach. *E. miniatum* y *aquaticum* Schær.

*Hab.* España (Lag., Clem.) sobre las rocas humedecidas en varias provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 3.000-6.300' (Clem.) poco más ó menos. (v. v.)

*Asturias* (Lag.): Arvas (Lag.)

*Galicia* (L. Seoane): inmediaciones de Cuntis (L. Seoane).

*Castilla la Nueva* (Colm.): Escorial (Colm.)

*Andalucia* (Clem., Hæns.): Sierra-Nevada en la dehesa del Boyar, Sierra del Pinar y otras en la Serranía de Ronda (Clem.), Sierra-Berdeja (Clem., Boiss., Hæns.)

**E. Guepini Mong. Schær.**

*Hab.* España en los Pirineos (Schær.) y cercanías de Málaga (Lge.) sobre las rocas calizas. (n. v.)

**E. rufescens Ach. E. pusillum  $\beta$  rufescens Fr. Schær.**

*Hab.* España cerca de Málaga en el cerro Coronado (Lag.), inmediaciones de Vigo, Coruña y Ferrol (L. Seoane), sobre las rocas. (n. v.)

**E. hepaticum Ach. E. pusillum Hedw. Fr. Schær.  $\alpha$**

**E. Hedwigii Ach.**

*Hab.* España sobre la tierra, las rocas calizas y areniscas en algunas provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 10.350-12.762' (Clem.), y mucho más abajo. (v. s.)

*Andalucia* (Clem.): Sierra-Nevada en el Mulahacen y cerca de las Lagunillas (Clem.)

*Var.  $\beta$  lachneum Ach. Dub. Endocarpon lachneum Ach.* Valencia en Titaguas (Clem.), Andalucía cerca de Medina-Sidonia, y Chiclana en el cerro de Santa Ana, llegando á la altura de 1.800' (Clem.)

**E. atro-virens Clem. Lich. et Flor. bæt. ined.** Thallo foliaceo, subcartilagineo, adpresso, subconvexo, crassiusculo, subelliptico, simplici, triusque lineas longo, lobato-sinuato, luteo-viridi, punctulis nigris insperso, subtus et margine atro-lævis. An Gyrophora? Clem. loc. cit.

*Hab.* España en la Sierra de Baza sobre las rocas graníticas á la altura de 6.300' (Clem.) próximamente. (n. v.)

### Coscinocladium.

**C. occidentale Kze.**

*Hab.* España sobre los muros y peñascos marítimos de Cádiz (Wk.) é inmediaciones. (n. v.)

### Pyrenothea.

#### **P. cellulosa Flotow.**

*Hab.* España en las inmediaciones de la Albufera de Valencia sobre el Solano sodomeo (Wk.), espontáneo en todo aquel litoral. (n. v.)

**P. stictica Fr.** *Lichen sticticus Ach. Verrucaria byssacea et stictica Ach.*

*Var. β minutissima Ach. Clem.* Andalucía sobre las cortezas de los pinos y lentiscos en las cercanías de Sanlúcar de Barrameda, Chiclana, Cabo de Gata (Clem.)

### Verrucaria.

**V. cinerea Schær.** *Endocarpon cinereum Pers. Sagedia cinerea Fr. Lichen tephroides Ach. Engl. bot., t. 2013. Endocarpon tephroides Ach.*

*Hab.* España sobre la tierra en la Sierra-Nevada (L. Seoane) y otros montes elevados. (n. v.)

**V. umbrina Wahlenb.** *V. umbrina Ach. excl. var. nigrescens.*

*Hab.* Pirineos (Nyl.) sobre las rocas graníticas. (n. v.)

*Var. β clopima Nyl.* *Verrucaria clopima Wahlenb. Ach.*

**V. variegata Clem.** *Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta tartarea, areolato-rimosa, cinerascenti, et fusco-castanea, effusa, æquabili, areolis depressis, lævibus; tuberculis 1-2 in singula areola, semi-immersis, umbilicatis, aterrimis, minutis, subglobosis, nitidis. Clem. loc. cit.

*Hab.* España en Andalucía sobre las rocas areniscas cerca de Alcalá de los Gazules á la altura de 1.800' (Clem.) poco más ó menos. (n. v.)

**V. isidiooides Clem.** *Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta effusa, uniformi, rimoso-verrucosa, fusco-cinerea et fusco-olivacea, verrucis lævigatis, tuberculiferis; tuberculis basi immersis, globosis, atro-subfuscis et fusco-atris, medio punctulo demum excavatis, nec papillatis, nitidulis. Clem. loc. cit.

*Hab.* España en Andalucía sobre el granito en la Sierra-Nevada cerca de la laguna de Vacares, y en Trevélez, á la altura de 7.500' (Clem.) próximamente. (n. v.)

**V. prominula Clem.** *Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta tartarea, rimoso-verrucosa, alba, subpulverulenta; tuberculis subhemisphærico-diformibus, semi-immersis, umbilicatis, fuscis. Clem. loc. cit.

*Hab.* España en Andalucía sobre el granito en la Sierra-Nevada á la altura de 10.200' (Clem.) y algo más arriba. (n. v.)

**V. nigrescens Pers.** *Lichen carbonarius Wulf. in Jacq. Coll. III, t. 6, f. 2, 6, b.* *Verrucaria antiquitatis Flork.* *V. umbrina β nigrescens Ach.*

*Hab.* España (Clem.) sobre las rocas calizas y los muros en diversas provincias, llegando en las meridionales á la altura de 6.000' (Clem.) próximamente. (v. s.)

*Andalucía* (Clem.): Sanlúcar de Barrameda, cercanías de Cádiz, Chiclana, Medina-Sidonia en el Berrueco, Picacho de Alcalá de los Gazules, Sierra de Baza (Clem.), Pinos de Genil (L. Seoane).

**V. incrustata Clem.** *Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta effusa, tenui, duplici, superficiali, diffracto-subgranulosa, sordide cinerea, interiori nigra, minutissime rugoso-granulosa, æquabili; tuberculis minutissimis, globosis, apice poro pertusis, vix subimmersis, atris. Clem. loc. cit.

*Hab.* España sobre el granito, los ladrillos y techos en las cercanías de Cádiz y en la Sierra-Nevada, llegando á la altura de 7.500' (Clem.) poco más ó menos. (n. v.)

**V. fuscella Ach.** *Lichen fuscellus Turn. Trans. Soc. Linn. VII, t. 8, f. 2.* *Sagedia fuscella Fr.*

*Hab.* España en Andalucía cerca de Carratraca (Hæns.) sobre las rocas. (n. v.)

*Var. β cervino-fusca Fr.* Inmediaciones de Málaga sobre las rocas próximas al litoral (Cabrera).

**V. rupestris Schrad.** *Lichen Schraderi Ach. Engl. bot., t. 1711, f. 2.* *Verrucaria Schraderi Ach.* *V. muralis Dur.* *Alger.*

*Hab.* España (Clem.) sobre las rocas calizas y areniscas

en diversas provincias, llegando en las meridionales á la altura de 5.400' Clem.) y más arriba. (v. s.)

*Andalucia* (Clem.): cercanías de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Alcalá de los Gazules, Sierra de Lújar (Clem.)

Var.  $\beta$  calciseda Schær. *Verrucaria calciseda* DC. Sierra de Tolox á la altura de 6.000' (Boiss.)

Var.  $\gamma$  foveolata Schær. *Verrucaria Schraderi*  $\beta$  foveolata Flk. Peña de Gorveya en las Prov. Vascongadas á la altura de 4.500' (Wk.)

Var.  $\delta$  purpurascens Schær. *Verrucaria purpurascens* Hoffm. Pirineos en el valle de Aran (Villers.)

**V. muralis Ach.** *V. muralis et lithina* Ach. *V. concentrica* DC.

Hab. España sobre las rocas calizas y los muros en varias provincias, y particularmente en Andalucía cerca de Medina-Sidonia, y en el Berrueco á la altura de 1.200-3.300' (Clem.) próximamente. (v. s.)

**V. exigua Clem.** *Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta tartarea, areolata, effusa, uniformi, contigua, cinerea, tenui; tuberculis minutissimis, semi-immersis, 1-3 in singula areola, supra crustam punctiformibus, nigris. Clem. loc. cit.

Hab. España en Andalucía sobre el hierro compacto en la Sierra de Baza contra Caniles á la altura de 6.300' (Clem.) próximamente. (n. v.)

**V. bætica Clem.** *Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta effusa, tartarea, areolata, tenui, pulverulenta, cinerea, æquabili, uniformi; tuberculis immersis, papillatis, demum umbilicatis, convexiusculis, nigris, cinereo-pruinosis. Clem. loc. cit.

Hab. España en Andalucía sobre las rocas ferruginosas, calizas y areniscas cerca de Alcalá de los Gazules, en el Berrueco, á la altura de 900-1.800' (Clem.) poco más ó menos. (n. v.)

Var.  $\beta$  viridi-fusca Clem. *Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta effusa, tartarea, rimosa, areolata, æquabili, uniformi, viridi-lutescenti, et subsulphurea, tandem fusco-subvirenti; apotheciis immersis, nigris, 2-6 in singula areola, albo-viridi-pruinosis, pruina tandem detersa, nigris. Clem. loc. cit. Al-

calá de los Gazules sobre las rocas areniscas á la altura de 1.800' (Clem.)

**V. laete-virens Clem.** *Lich. et Flor. bæt. ined.* Thallo tenuissimo, tartareo-membranaceo, viridi, areolato-rimoso, effuso, æquabili, lævi; tuberculis subglobosis, umbilicatis, subpapillatis, totis atris, prominentibus..... Clem. loc. cit.

*Hab.* España en Andalucía sobre las rocas calizas y areniscas en Sanlúcar de Barrameda, cercanías de Cádiz, Medina-Sidonia, Alcalá de los Gazules (Clem.) é inmediaciones. (n. v.)

**V. maura Wahlenb.** *Lichen maurus Engl. bot., t. 2456.* *Pyrenula maura Schær.*

*Hab.* España sobre las rocas marítimas en las costas de Andalucía (Cabrera) y en las demás del Mediterráneo. (v. v.)

*Var. β picea Colm.* *Verrucaria amphibia Clem. Ens.* Costas de Cádiz, sobre las brechas calizas sumergidas en el mar ó rociadas por las olas, y principalmente sobre los fragmentos de cuarzo (Clem.)

**V. macularis Schær.** *V. chlorotica Ach. Nyl.*

*Hab.* España (Clem.) sobre las rocas sombrías y las cortezas de algunos árboles en la Sierra-Nevada (L. Seoane) y otras partes, en varias provincias. (n. v.)

*Var. β striatula Schær.* *Verrucaria striatula Wahlenb.*

*Var. γ acrotella Schær.* *Verrucaria acrotella Ach. Lichen acrotellus Sm. Engl. bot., t. 1712.* Andalucía cerca de Alcalá de los Gazules y en el Berrueco, á la altura de 900-1,800' (Clem.), Galicia cerca del Ferrol (L. Seoane).

**V. gaditana Clem.** *Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta effusa, tenuissima, grisea; tuberculis minutis, inæqualibus, subglobosis, umbilicatis, nigris, superficialibus. Clem. loc. cit.

*Hab.* España sobre las piedras areniscas y otras en las cercanías de Cádiz (Clem.) y en diversas partes de Andalucía (n. v.)

**V. farrea Ach.**

*Hab.* España en Galicia cerca del Ferrol (L. Seoane) sobre los robles. (n. v.)

**V. gemmata Ach.** *V. alba Schrad.* *Schær., t. 8, f. 3.*

*Hab.* España en la Sierra-Nevada (L. Seoane) sobre las cortezas de los árboles. (n. v.)

**V. epidermidis Ach. Schær.**

*Hab.* España (Clem.) en las cortezas lisas de diferentes árboles y arbustos. (v. s.)

**V. punctiformis Pers. Schær. Lichen stigmatellus Ach. Sm. Engl. bot., t. 1891. Verrucaria stigmatella Ach.**

*Hab.* España sobre las cortezas lisas de los árboles y arbustos en Málaga y otras partes (Clem.), tanto en las provincias meridionales como en las demás. (v. s.)

*Var. β ptelaeodes Ach. Clem. Ens. Medina-Sidonia, Alcalá de los Gazules, llegando á la altura de 3.000' (Clem.)*

*Var. γ tremula Ach. Clem. Flor. bæt. ined. Sanlúcar de Barrameda, Chiclana (Clem.)*

*Var. δ sparsa Clem. Flor. bæt. ined. Crusta nulla, tuberculis minutissimis, hémisphæricis, umbilicatis, nigris, sparsis. Clem. loc. cit. Sanlúcar de Barrameda, cercanías de Cádiz (Clem.)*

**V. analepta Ach. Schær. Lichen analeptus Ach. Engl. bot., t. 1848.**

*Hab.* España (Clem.) sobre las cortezas lisas de diversos árboles y arbustos. (v. s.)

**V. suberis Clem. Lich. et Flor. bæt. ined. Thallo membranaceo-subcartilagineo, tenui, fusco-subpulverulento, diffracto, cinereo; tuberculis superficialibus, subglobosis, atris, subconfertis, subnitidis. Clem. loc. cit.**

*Hab.* España en Andalucía sobre las cortezas no lisas del alcornoque en el Picacho de Alcalá de los Gazules, á la altura de 1.800' (Clem.) próximamente. (n. v.)

### Limboria.

#### **L. sphinctrina Dub.**

*Hab.* España sobre las rocas calizas (Duf.) en varias partes. (n. v.)

**Lepraria.** No son líquenes algunas de las especies colocadas antes de ahora en este antiguo género, mientras que

otras se consideran actualmente como meros estados de diferentes líquenes, ó alteraciones de los mismos.

La *Lepraria antiquitatis* Ach. ó sea el *Byssus antiquitatis* L. Hoffm., En. lich., t. 3, f. 5, que se halla sobre las piedras, tanto en España (Clem.) como en Portugal (Vand., Brot.), no puede referirse á una sola y determinada especie; é igualmente es indeterminable el *Byssus lactea* L. Dill. Musc., t. 1, f. 2, indicado en Aragón (Asso) y otras partes de la Península sobre los muros, musgos y cortezas de los árboles.

## IX. COLLEMACEAS.

---

### COLLEMEAS.

---

#### *Collema.*

**C. furvum** Ach. *Lichen granulatus* L. f. Brot. Engl. bot., t. 1757.

Hab. España (Clem.) y Portugal (Brot.) sobre las rocas y los troncos de los árboles en varias provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 1.200-3.900' (Clem.) poco más ó menos. (n. v.)

Aragón? (Pardo, Loscos).

Andalucía (Clem.): cercanías de Medina-Sidonia, Alcalá de los Gazules (Clem.)

Portugal (Brot.): Extremadura portuguesa, Beira y otras partes (Brot.)

**C. melænum** Ach. *C. jacobeæfolium* DC. Flor. dan. t. 463, f. 1, 2.

*Hab.* España en las montañas de Leon (Lag.) y en la Sierra-Nevada en el Dornajo, á la altura de 4.000-7.000' (Wk.) sobre las rocas. (v. s.)

**C. intestiniforme Schær.**

*Hab.* España en la Sierra de Guadarrama cerca del Pau-lar (Wk.) sobre las muros y rocas. (n. v.)

**C. plicatile Ach.** *Engl. bot., t. 2348.*

*Hab.* España en Aragon cerca de Castelserás (Pardo, Loscos) sobre las piedras y muros húmedos. (n. v.)

**C. turgidum Ach.**

*Hab.* España en Cataluña hacia el acueducto de Tarragona (Fee).—No difiere apenas del *C. plicatile Ach.*

**C. pulposum Ach.** *Schær., t. 10, f. 5. Lichen pul-posus Bernh. Collema crispum Dur. Alger.*

*Hab.* España (Boiss., Wk.) sobre la tierra y las piedras calizas en algunas provincias. (n. v.)

*Valencia* (Wk.): Barranco de Tabernes (Wk.)

*Andalucía* (Boiss.): Sierra de la Nieve (Boiss.)

**C. tenax Ach.**

*Hab.* España en Asturias en el Pico de Arvas (Dur.) sobre la tierra. (n. v.)

**C. crispum Ach.** *Lichen crispus L. Parmelia crispa Ach. Engl. bot. Suppl. II, t. 2716, f. 1.*

*Hab.* España (Lag., Clem.) y Portugal (Brot.) sobre la tierra y en los muros de los campos en varias provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 1.200-3.900' (Clem.) próximamente. (v. s.)

*Aragon* (Pardo, Loscos).

*Santander* (Salcedo).

*Castilla la Nueva* (Lag.): cercanías de Madrid (Lag.)

*Valencia* (Lag., Clem.): Ontinient, Bocairent (Lag.), Titá-guas (Clem.)

*Andalucía* (Clem.): Castril, Alcalá de los Gazules, Medina-Sidonia (Clem.), Sierra-Nevada (L. Seoane).

*Portugal* (Brot.): Extremadura portuguesa y Beira (Brot.)

**C. cristatum Hoffm.** *Lichen cristatus L. Dill. Musc., t. 19, f. 26.*

*Hab.* España en las montañas de Santander, (Salcedo) y

Portugal en Alentejo, Extremadura y Beira (Brot.) sobre la tierra y las piedras calizas. (v. s.)

**C. cheileum Ach.** *Lichen marginatus Bernh.*

*Var. γ graniforme Ach.?* *Parmelia adnata β sparsa Clem.* *Lich. et Flor. bæt. ined.* Crusta tota supra muscos et lichenes sparsa, nihil aliud exhibens quam granula confertissima, vix oculo nudo discernenda, atra, et rarius in humectata planta fusco-sublutea, frequenter fusco-atra. Clem. loc. cit. Barranco de Trevélez en Andalucía sobre los liquenes á la altura de 9.600' (Clem.)

*Var. δ byssaceum Ach.?* *Parmelia adnata Clem. Lich. et Flor. bæt. ined.* Thallo subgelatinoso, confertim granuloso, effuso, toto adhærenti, atro; scutellis superficialibus, planis, tandem convexis, exiguis, margine integerrimo, inflexo. Clem. loc. cit. Castril en Andalucía sobre las rocas calizas á la altura de 3.400' (Clem.)

**C. fragrans Ach.** *Lichen odoratus Salcedo?*

*Hab.* España en las montañas de Santander (Salcedo) sobre los troncos de los árboles. (n. v.)

**C. nigrescens Ach.** *Lichen nigrescens L.* *Collema vespertilio Hoffm., t. 37, f. 2, 3.* *C. nigrescens α vespertilio Schær.*

*Hab.* España (Salcedo, Clem.) y Portugal (Brot.) sobre los troncos de los árboles en diversas provincias, hallándose en las meridionales á la altura de 1.500-3.600' (Clem.) próximamente. (v. s.)

Santander (Salcedo).

Galicia (L. Seoane): cercanías de Orense (L. Seoane).

Castilla la Vieja (Salcedo): valle de Mena (Salcedo).

Castilla la Nueva (Cut., Amo).

Valencia (Clem.): Titáguas (Clem.)

Andalucía (Clem., Boiss.): Medina-Sidonia, Picacho de Alcalá de los Gazules (Clem.), Sierra de Tolox, cercanías de Casares (Hæns., Boiss.)

Portugal (Brot.): Beira boreal (Brot.)

*Var. β fasciculare Schær.* *Lichen fascicularis L.*

*Var. γ conglomeratum.* *Collema conglomeratum Hoffm.*

Cercanías de Granada (Wk.)

*Var.* ♂ *cæsium Clem. Ens. et Flor. bæt. ined.* Scutellis minutis, sparsis, planis convexisque, cæsiis. Clem. loc. cit. Medina-Sidonia, Picacho de Alcalá de los Gazules (Clem.)

**C. gaditanum?** *Parmelia gaditana Clem. Lich. et Flor. bæt. ined.* Thallo membranaceo, pellucido, pulvinato, lobato, parvo, luteo-viridi, utrinque nudo, gelatinoso, suborbiculari; lobis centralibus adscendentibus, disformibus, granuliferis, crassis, rigidis; lobis periphæricis adpressis, liberis, latiusculis, inciso-crenatis, plicato-undulatis, subrotundatis, teneris, tenuibus; crenis minutissime suberispis; scutellis planis, confertis, rubrofuscis, sessilibus, majusculis, demum subconvexis, margine integerrima, crassa, inflexa, crustæ concolori, in scutellis subconvexis attenuata. Clem. loc. cit.

*Hab.* España en Cádiz cerca del castillo de San Sebastian, Málaga y otras partes (Clem.) sobre las rocas calizas. (n. v.)

### Leptogium.

**L. lacerum Fr.** *Collema lacerum Ach. C. atrocæruleum Schær. t. 10, f. 2.*

*Hab.* España en Madrid dentro del Jardin Botánico (Lag.), en Toledo sobre las piedras del Puente (Fée) y en otras partes al pie de los árboles. (v. s.)

**L. palmatum Mont.** *Collema palmatum Ach. C. corniculatum DC.*

*Hab.* España en la Sierra-Nevada (L. Seoane) sobre tierras húmedas. (n. v.)

**L. Hildenbrandii Nyl.** *Collema myochroum α saturinum Schær.*

*Hab.* España en Aragon cerca de Peñarroya (Pardo, Loscos) sobre los troncos de los árboles. (n. v.)

**L. saturninum Nyl.** *Collema saturninum Ach. Engl. bot., t. 1980.*

*Hab.* España en las montañas de Santander y en la Rioja (Salcedo, Lag.) sobre los troncos de los árboles y las piedras. (v. s.)

## LICHINEAS.

## Epheba.

**E. pubescens** Fr. *Lichen pubescens* L. Jacq. *Misc.*, t. 10, f. 5. *Cornicularia pubescens* Ach.

*Hab.* España sobre las rocas húmedas en los Pirineos y otros montes, cercanías de Chiclana y Cabo de Gata en Andalucía á la altura de 3.900' (Clem.) poco más ó menos. (n. v.)

## Lichina.

**L. pygmæa** Ag. *Chondrus pygmæus* Lamour. *Fucus pygmæus* Lightf., t. 32. *Turn.*, t. 204, f. a, b. *Engl. bot.*, t. 1332.

*Hab.* Costas de España (Lag., Clem.) sobre los peñascos marítimos. (n. v.)

Asturias (Lag., Dur.): Gijon, Candas (Lag.)

Galicia (Lge.): Pontevedra, Vigo (Lge.)

Andalucía (Clem.): Cádiz (Clem.), promontorio de San Sebastian cerca de Cádiz (Wk.)

Var.  $\beta$  *minor* Turn. *Lichina confinis* Ag. *Lichen confinis Flor. dan.*, t. 879, f. 2. *Engl. bot.*, t. 2575. Galicia en Vigo (Lge.)

## X. ALGAS.

## HETEROCARPEAS.



## PLOCAMIEAS.



## Plocamium.

**P. coccineum** Kg. *Phyc.*, t. 64. *Fucus XV* Quer.  
*Barr. ic.* 1289 (*mala*). *Fucus coccineus* Huds. *Turn.*, t. 59.  
*Engl. bot.*, t. 1242. *F. Plocamium* Gmel. *Fuc.*, t. 16, f. 1.  
*Plocamium vulgare* Lamour. *Delesseria Plocamium*. Ag.

*Hab.* Costas de España (Quer, Lag.). (v. v.)

Asturias (Lag.): Candas (Lag.)

Galicia (Quer, Lge.): Coruña (Lge.)

Andalucía (Clem., Cabr.): Cádiz (Clem., Cabr., Colm., Wk., Bourg., Lge.) Sanlúcar de Barrameda (Clem., Wk.), Rota, Puerto de Santa María, Conil, Tarifa, Algeciras, Málaga, Marbella (Clem.)

Baleares: Mallorca, Menorca (Texid.)

Var.  $\eta$  *uncinatum* Kg. *Plocamium uncinatum* Ag. Mediterráneo (Ag.)

Var.  $\iota$  *mediterraneum* Kg. *Plocamium mediterraneum* Menegh. Mediterráneo (Menegh.)

## DELESERIEAS.

## Delesseria.

**D. sanguinea** Lamour. *Ess.*, t. 2. *Fucus sanguineus* L. *Turn.*, t. 36. *Engl. bot.*, t. 1041.

- Hab.* Costas de España (Lag., Prol.). (v. s.)  
*Asturias* (Lag.): Candas (Lag.)  
*Galicia* (Lge., L. Seoane): Coruña (Lge.), Ferrol (L. Seoane).  
*Andalucia* (Prol.): Málaga (Prol.)

### Hypoglossum.

**H. Woodwardi** Kg. *Phyc.*, t. 65, f. 1. *Fucus Hypoglossum* Woodw. *Turn.*, t. 14. *Engl. bot.*, t. 1396. *Delesseria Hypoglossum* Ag.

*Hab.* Costas de España en Cádiz (Clem., Cabr., Lag.) y en Galicia cerca del Ferrol (L. Seoane). (v. s.)

**H. ruscifolium** Kg. *Delesseria ruscifolia* Ag. Harv. *Phyc. brit.*, 26. *Fucus ruscifolius* Turn., t. 15. *Engl. bot.*, t. 1395.

*Hab.* Costas de España en Vigo (Lge.). (v. s.)

?**H. lingulatum** Kg. *Delesseria lingulata* Duby.

*Hab.* Costas de España en Asturias cerca de Gijon (Lag.) y en Galicia cerca del Ferrol (L. Seoane). (n. v.)

**H. alatum** Kg. *Phyc.*, t. 66. *Fucus alatus* Huds. *Turn.*, t. 160. *Engl. bot.*, t. 1387. *Delesseria alata* Lamour.

*Hab.* Costas de España en el Ferrol (L. Seoane). (n. v.)

### Phycodrys.

**Ph. sinuosa** Kg. *Fucus sinuosus* Turn., t. 35. *Engl. bot.*, t. 822. *Delesseria sinuosa* Lamour. *Fucus rubens* L.

*Hab.* Costas de España en Galicia (L. Seoane). (n. v.)

### Stenogramma.

**S. interrupta** Mont. Harv. *Phyc. brit.*, t. 157. *S. europaea* Harv. *Delesseria interrupta* Ag. Mont. in Webb. *Otia* t. 8.

*Hab.* Costas de España en Cádiz (Cabr., Clem.) y Portugal en Lisboa (Welw.). (v. s.)

### Cryptopleura.

**C. lacerata** Kg. *Delesseria lacerata* Ag. *Nitophyllum laceratum* Grev. *Fucus laceratus* Gmel. *Fuc.*, t. 21, f. 4. *Turn.*, t. 68. *Engl. bot.*, t. 1067. *Chondrus laceratus* Lyngb. *Halymenia lacerata* Duby.

*Hab.* Costas de España (Lag., Lge.) y Portugal (Brot.).  
(v. s.)

*Prov.* Vascongadas (Lge.): San Sebastian (Lge.)

Asturias (Lag.): Candás (Lag.)

Galicia (Lge.): Coruña (Lge.), Vigo (L. Seoane).

Andalucia (Clem., Lge.): Cádiz (Clem.), Málaga (Lge.)

Portugal (Brot.): desembocaduras del Tajo y Duero  
(Brot.)

**C. uncinata.** *Nitophyllum uncinatum* J. Ag.

*Hab.* Costas septentrionales de España en San Sebastian y la Coruña (Lge.). (n. v.)

**C. heterocarpa** Kg. *Halymenia heterocarpa* Duby.

*Hab.* Costas de España en el Ferrol y Vigo? (L. Seoane).  
(n. v.)

### Aglaophyllum.

**A. ocellatum** Kg. *Delesseria ocellata* Lamour. *Fucus ocellatus* Lamour. *Diss.*, t. 32. *Halymenia ocellata* Duby. *Fucus punctatus* Engl. *bot.*, t. 1573.

*Hab.* Costas de España (Poir., Lge.)

Galicia (Lge.): Coruña (Lge.)

### CHAMPIEAS.

---

### Gastroclonium.

**G. Uvaria** Kg. *Chondria Uvaria* Ag. *Gigartina Uvaria* Lamour. *Fucus uvarius* Wulf. *F. botryoides* Wulf. in Jacq. *Coll. III*, t. 13, f. 1.

*Hab.* Costas de España en Galicia cerca del Ferrol (L. Seoane) y en Andalucía (Colm.). (v. v.)

**G. ovale** Kg. *Chondria ovalis* Ag. *Fucus ovalis* Huds. Engl. bot., t. 711. Turn., t. 81. *Gigartina vermicularis* Lamour.

*Hab.* Costas de España (Clem., Lag.). (v. s.)

*Galicia* (L. Seoane): Ferrol (L. Seoane).

*Andalucía* (Clem., Lag.): Cádiz (Clem., Cabr.), Castillo de San Pedro (Clem.), Algeciras (Lag.)

**G. reflexum** Kg. *Lomentaria reflexa* Chauv. *L. pygmæa* Duby. *Gigartina pygmæa* Lamour. Ess., t. 4, f. 12, 13.

*Hab.* Costas de España en Cádiz (Colm.). (v. v.)

### Lomentaria.

**L. kaliformis** Gaill. Kg. *Phyc.*, t. 55, f. 3. *Chondria kaliformis* Ag. *Fucus kaliformis* Turn., t. 29. *Gigartina kaliformis* Lamour.

*Hab.* Costas de España (Clem., Lge.). (v. s.)

*Galicia* (Lge.): Coruña (Lge.)

*Andalucía* (Clem.): Bonanza cerca de Sanlúcar de Barrameda (Clem.)

**L. mediterranea** Endl. Mont.

*Hab.* Costas de España en Barcelona é Islas Baleares en Mahon (Mont. herb.). (n. v.)

**L. phalligera** Kg. *Chylocladia phalligera* J. Ag.

*Hab.* Mediterráneo (J. Ag.). (n. v.)

**L. articulata** Lyngb. t. 30. *Chondria articulata* Ag. *Gigartina articulata* Lamour. *Fucus articulatus* Lightf. Turn., t. 106. Engl. bot., t. 1574. *Ulva articulata* Huds.

*Hab.* Costas de España (Lag., Clem.). (v. s.)

*Asturias* (Lag.): Candás (Lag.)

*Galicia* (Lge.): Coruña (Lge.), Ferrol (L. Seoane).

*Andalucía* (Clem.): Puerto de Santa María, Cádiz, Castillo de San Pedro. Algeciras (Clem.)

*Baleares*: Menorca (Texid.)

## CONDROSIFEAS.

## Chondrosiphon.

**Ch. mediterraneus Kg.** *Phyc.*, t. 53, f. 3. *Chondria fistulosa Kg.*

*Hab.* Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

## Chondrothamnion.

**Ch. clavelosum Kg.** *Chondria clavelosa Ag. Fucus clavelosus Turn.*, t. 30. *Gigartina clavelosa Lamour.*

*Hab.* Atlántico y Mediterráneo (Ag.), en las costas de las Baleares (Texid.). (n. v.)

*Var.*  $\beta$  *confertum De Notar.* Mediterráneo (De Notar.)

## CONDRIEAS.

## Laurencia.

**L. dasypylla Grev.** *Kg. Phyc.*, t. 55, f. 2. *Gigartina dasypylla Lamour. Fucus dasypylloides Turn.*, t. 22. *Engl. bot.*, t. 847.

*Hab.* Costas de España en la Coruña (Lge.). (n. v.)

**L. obtusa Lamour.** *Fucus obtusus Huds. Turn.*, t. 21.

*Engl. bot.*, t. 1201.

*Hab.* Costas de España (Clem., Cabr.)

*Andalucía* (Clem., Cabr.): Cádiz (Clem., Cabr.)

*Baleares*: Mallorca (Hern., Camb.), Menorca (Oleo).

**L. gelatinosa Lamour.** *Chondria obtusa gracilis Ag. Fucus gelatinosus Desf. F. tenerimus Clem. Ens.?* Fronde tereti, cartilaginea, tenerima, ramosissima, ramis subtetras-tichis, decompositis, apicibus obtusis. Clem. loc. cit.

*Hab.* Costas de España (Clem., Lag.). (v. s.)

*Galicia* (L. Seoane): Vigo (L. Seoane).

*Valencia* (Lag.): Alicante (Lag.)

*Andalucia* (Clem., Cabr.): Cádiz (Clem., Lag., Cabr.), Sanlúcar de Barrameda, Algeciras, Málaga (Clem.), Almería, Cabo de Gata (Clem., Lag.)

*Baleares*: Mallorca, Menorca (Texid.)

**L. paniculata Kg.**

*Hab.* Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

**L. hybrida Lenorm.** in *Dub. Bot. L. cæspitosa* Lamour. *Fucus hybridus DC.* *Chondria pinnatifida* γ Ag. *Turn.*, t. 20, fig. f.

*Hab.* Costas de España en Vigo y la Coruña (L. Seoane). (n. v.)

**L. pinnatifida Lamour.** *Harv. Phyc. brit.*, t. 55. *Grev. Alg. brit.*, t. 14. *Chondria pinnatifida Ag.* *Fucus pinnatifidus Huds.* *Turn.*, t. 20. *Engl. bot.*, t. 1202.

*Hab.* Costas de España (Lag., Clem.). (v. v.)

*Cataluña* (Cav.): Barcelona (Cav.)

*Galicia* (Lge.): Coruña (Lge.), Ferrol (L. Seoane).

*Valencia* (Lag.): Alicante (Lag.)

*Andalucia* (Clem.): Cádiz (Clem., Cabr., Colm.), Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María, Conil, Tarifa, Algeciras (Clem.), Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Castillo de Puntales (Wk.), Málaga, Almería (Lge.)

*Baleares*: Mallorca (Lag.)

*Var. β Osmunda Turn.* *Fucus Osmunda Gmel.* *Fuc.*, t. 16, f. 2. Alicante (Lag.), Galicia (Herb. Madr.)

*Var. γ pyramidata Clem.* *Fucus pinnatifidus ε pyramidatus Clem. Ens.* Fronde complanata, semilineam lata, fere sesqui-pollicari, alternatim ramosa, subpyramidata, ramis circa apicem crebrioribus, ramulis brevibus, simplicibus, bifidis trifidisque. Clem. loc. cit. Tarifa, Algeciras (Clem.)

### Carpocaulon.

**C. mediterraneum Kg.** *Phyc.*, t. 57, f. 2. *Chondria mediterranea Kg.* *Gigartina denudata Bory.* *Laurencia Borgi De Notar.*

*Hab.* Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

### Lophura.

**L. lycopodioides** Kg. *Fucus lycopodioides* L. Turn.,  
t. 12. Engl. bot., t. 1163. *Rhodomela lycopodioides* Ag.

*Hab.* Atlántico (Kg.). (n. v.)

### RITIFLEACEAS.

---

### Dictyomenia.

**D. volubilis** Grev. *Rhodomela volubilis* Ag. *Volubilaria mediterranea* Bory. *Fucus VIII* Quer. *Fucus volubilis* L. Turn., t. 2.

*Hab.* Costas de España (Quer, Clem.). (v. s.)

*Galicia* (Quer).

*Andalucía* (Clem., Cabr.): Cádiz (Clem., Cabr.), Santi Petri, Sanlúcar de Barrameda (Clem., Lag.)

### Rytiphlaea.

**R. complanata** Ag. Harv. *Phyc. brit.*, t. 170. *Fucus complanatus* Clem. *Ens.* *F. cristatus* Mert. *Plocamium cristatum* Lamour. *Ess.*, t. 5, f. 1-3. *Polysiphonia cristata* Harv.

*Hab.* Costas de España (Lag., Clem.). (v. s.)

*Prov.* Vascongadas (Lge.): Portugalete (Lge.)

*Asturias* (Lag.)

*Galicia* (Guio): Coruña (Guio), Ferrol (L. Seoane).

*Valencia* (Poir.)

*Andalucía* (Clem.): Tarifa (Clem.)

**R. semicristata** J. Ag.

*Hab.* Mediterráneo (J. Ag.). (n. v.)

**R. tinctoria** Ag. *Fucus tinctorius* Clem. *Ens.* *F. pureus* Turn., t. 224. *F. Phenax* Spr. Berl. Mag., t. 7, f. 15.

*Hab.* Costas de España (Lag., Clem.). (v. s.)

*Valencia* (Lag.): Alicante (Lag.)

*Andalucia* (Clem.): Cádiz (Clem., Hered., Cabr.), Rota, Puerto de Santa María, Algeciras (Clem.)

#### POLISIFONIEAS.

---

#### Alsidium.

**A. tenuissimum** Kg. *Phyc.*, t. 55, f. 1. *Chondria tenuissima* Ag. *Laurencia tenuissima* Grev. *Gigartina tenuissima* Lamour. *Fucus tenuissimus* Turn., t. 100. *Engl. bot.* 1882.

*Hab.* Costas de España en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz (Clem.). (v. s.)

**A. Helminthochorton** Kg. *Sphaerococcus Helminthochortos* Ag. *Helminthochorton officinale* Link. *Fucus Helminthochorton* Turn., t. 233. *Gigartina Helminthochortos* Lamour.—*Corallina hispanica capillaceo folio, obscurè virescens, caulinculo spongioso* Tournef. *Inst.* 571? *Corallina hispanica capillaceo folio fusco* Tournef. *Inst.* 571.

*Hab.* Costas de España (Salv., Talbot, Cav.). (v. s.)

*Cataluña* (Salv.)

*Galicia* (R. Bust.): inmediaciones de Tuy (R. Bust.)

*Valencia* (Cav.): cercanías de Calpe (Cav.)

*Andalucia* (Clem.): Sanlúcar de Barrameda (Clem.)

*Baleares*: Mallorca (Serra, Texid.), Menorca (Hern., Camb., Oleo, Texid.), Ibiza (Texid.)

*Nombr. vulg. Cast.* Musgo marino (A. Lus.). Yerba mallorquina, Yerba lombriguera (Palau), Coralina (Serra), Musgo de mar, Musgo de Córcega, Coralina de Córcega (M. Jimen.)

*Port.* Musgo marinho (Brot.) *Catal.* Herba cuquera (Palau).

*Val.* Herba cuquera (Palm., Cav.) *Balear.* Herba cuquera (Serra).

#### Bonnemaisionia.

**B. asparagoides** Ag. *Harv. Phyc. brit.*, t. 51. *Placodium asparagoides* Lamour. *Ceramium asparagooides* Roth. *Fucus asparagoides* Turn., t. 101. *Engl. bot.*, t. 571.

*Hab.* Atlántico y Mediterráneo (Ag.) en las costas de las Baleares (Texid.). (n. v.)

**B. pilularia** Ag. *Fucus pilularia* Gmel. *Fuc.*, t. 10, f. 2.

*Hab.* Costas de España en Gibraltar (Kg.) y Portugal hacia el Tajo y en los Algarbes (Brot.). (n. v.)

### Digenea.

**D. Wulfeni** Kg. *D. simplex* Ag. *Conferva simplex* Wulf. *Cladostephus Lycopodium* Ag. *Fucus Lycopodium* Turn. t. 199.

*Hab.* Mediterráneo (Ag.). (n. v.)

### Halopithys.

**H. pinastroides** Kg. *Rytiplaea pinastroides* J. Ag. Harv. *Phyc. brit.*, t. 85. *Rhodomela pinastroides* Ag. *Gigartina pinastroides* Lyngb. *Fucus pinastroides* Gmel. Turn. t. 11. Engl. bot., t. 1042.

*Hab.* Costas de España (Clem., Cabr.). (v. v.)

*Andalucía* (Clem., Cabr.): Cádiz (Clem., Cabr., Wk., Colm.), Sanlúcar de Barrameda (Clem., Wk., Colm.), Conil, Tarifa, Algeciras, Málaga, Cabo de Gata (Clem.)

### Bostrychia.

**B. scorpioides** Mont. Harv. *Phyc. brit.*, t. 48. *Helicothamnion scorpioides* Kg. *Alsidium scorpioides* J. Ag. *Rhodomela scorpioides* Ag. *Fucus scorpioides* Gmel. *F. amphibius* Turn. t. 109. Engl. bot., t. 1428. *Plocamium amphibium* Lamour.

*Hab.* Costas de España (Lag., Clem.). (v. s.)

*Asturias* (Lag.)

*Andalucía* (Clem., Cabr.): Cádiz (Clem., Cabr.), desembocaduras del río Santi-Petri, Puerto de Santa María (Clem.)

*Baleares*: Menorca (Texid.)

### Polysiphonia.

**P. pennata Ag.** *Ceramium pennatum* Roth.

*Var. β pumila Kg.* *Rytiphlaea pumila* Ag. Cádiz (Ag.)

**P. parasitica Grev.** Harv. *Phyc. brit.*, t. 147. *Hutchinsia parasitica* Ag. *H. Mæstingii* Lyngb. t. 36. *Conferva parasitica* Huds. Engl. bot., t. 1429.

*Hab.* Costas del Atlántico y Mediterráneo (Ag.). (n. v.)

**P. tenerima Kg.** *P. Nemalionis* Zanard. *P. floccosa* Zanard.

*Hab.* Mediterráneo sobre diversas algas (Kg.). (n. v.)

**P. secunda Mont.** *Hutchinsia secunda* Ag.

*Hab.* Mediterráneo (Ag.). (n. v.)

**P. tenella J. Ag.** *Hutchinsia tenella* Ag.

*Hab.* Mediterráneo (Ag.). (n. v.)

**P. hamulifera Kg.**

*Hab.* Costas meridionales de España sobre algas mayores (Kg.). (n. v.)

**P. obscura J. Ag.** Harv. *Phyc. brit.*, t. 102. A.

*Conferva intertexta* Roth. Cat. 1, t. 3, f. 3.

*Hab.* Costas del Atlántico y Mediterráneo (J. Ag.). (n. v.)

**P. fastigiata Grev.** Kg. *Phyc.*, t. 50, f. 3. *Fucus XI* Quer. *Conferva polymorpha* Flor. dan., t. 395. *G. Orton* non Linn. Engl. bot., t. 1764. *F. lanosus* L. *Ceramium polymorphum* DC.

*Hab.* Costas de España (Loesl., Quer). (v. s.)

*Galicia* (Quer, L. Alonso): Ferrol (L. Alonso), Doñinos (Lge.)

**P. opaca Ag.**

*Hab.* Mediterráneo (Ag.). (n. v.)

**P. Agardhiana Grev.** *P. atrorubescens* Harv. *Phyc. brit.*, t. 172.

*Hab.* Costas de España en el Ferrol (L. Seoane). (n. v.)

**P. nigrescens Grev.** Kg. *Phyc.*, t. 50, f. 4. *Lyngb.*, t. 33. *Conferva nigrescens*. Engl. bot., t. 1717. *Ceramium violaceum* Roth. *Polysiphonia fucoides* Grev. *Conferva atra* Clem. *Ens?* Fronde gracillima, ramoso-subdichotoma, vix gelati-

nosa, subfuscata, siccata altra, antenniforme, articulis cylindricis, non nisi lente conspicuis, apicibus subulatis. Clem. loc. cit.

*Hab.* Costas de España en Galicia (L. Seoane), y en Andalucía cerca de Cádiz y Algeciras? (Clem.). (n. v.)

**P. gaditana.** *Conferva gaditana* Clem. *Ens.* Fronde filiforme creberreme ac regularissime dichotoma, parum gelatinosa, pallide rubra, exsiccata fusco-nigricante ac rigidiuscula, articulis subcylindricis. Clem. loc. cit.

*Hab.* Costas de España en Cádiz y Málaga (Clem.). (n. v.)

**P. subcontinua Ag.**

*Hab.* Costas de España (Ag.). (n. v.)

**P. vinosa Kg.**

*Hab.* Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

**P. aurantiaca Kg.**

*Hab.* Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

**P. lusitanica Mont.**

*Hab.* Costas de Portugal en Ericeira (Webb.). (n. v.)

**P. variegata Ag.**

*Hab.* Atlántico y Mediterráneo (Ag.). (n. v.)

**P. lævigata Kg.**

*Hab.* Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

**P. nodulosa J. Ag.**

*Hab.* Mediterráneo (J. Ag.). (n. v.)

**P. subtilis De Notar.**

*Hab.* Mediterráneo (J. Ag.). (n. v.)

**P. Perreymondi J. Ag.**

*Hab.* Atlántico y Mediterráneo (J. Ag.). (n. v.)

**P. Montagnei De Notar.**

*Hab.* Mediterráneo (De Notar.). (n. v.)

**P. Brodiæi Ag.** *Conferva Brodiæi* Dillw., t. 107.

*Hab.* Costas de España en Cádiz (Kg.). (n. v.)

**P. multifida Duby.**

*Hab.* Mediterráneo (Duby) y costas de España en el Ferrol (L. Seoane). (n. v.)

**P. polyspora Ag.**

*Hab.* Costas de España en Cádiz (Kg.). (n. v.)

**P. elongata** Ag. *Kg. Phyc.*, t. 50, f. 5. *Conserva elongata* Huds. *Dillw.*, t. 33. *Ceramium elongatum* Roth.

*Hab.* Costas de España en Asturias (Lag.) y en Andalucía cerca de Cádiz (Clem.). (v. s.)

**P. Requierii** Mont.

*Hab.* Mediterráneo (Mont.). (n. v.)

**P. Solierii** J. Ag.

*Hab.* Mediterráneo (J. Ag.). (n. v.)

**P. Dervesii** Solier.

*Hab.* Mediterráneo (Mont.). (n. v.)

**P. vestita** J. Ag.

*Hab.* Mediterráneo (J. Ag.). (n. v.)

**P. foeniculacea** Ag.

*Hab.* Mediterráneo (Ag.). (n. v.)

**P. flocculosa** Ag.

*Hab.* Mediterráneo (Ag.). (n. v.)

**P. flexella** Ag. *Dasya Solierii* J. Ag.

*Hab.* Mediterráneo (J. Ag.) y costas de España en Cádiz (Bourg.). (n. v.)

**P. byssoides** Kg.

*Hab.* Costas de España en el Ferrol (L. Seoane). (n. v.)

**P. Wulfeni** Ag. *Fucus fruticulosus* Wulf. in Jacq.

*Coll.*, t. 16, f. 1. *Ceramium Wulfenii* Roth.

*Hab.* Costas de España en Cádiz, Tarifa, Algeciras (Clem.). (v. s.)

**P. Martensiana** Kg.

*Hab.* Golfo de Vizcaya (Endress). (n. v.)

**P. pycnophloea** Kg.

*Hab.* Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

**P. comatula** Kg.

*Hab.* Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

## DASIEAS.

## Eupogodon.

**E. planus Kg.** *Dasya plana Ag.* *D. ornithorhyncha Mont.* *Rytiphlaea pumila Zanard.* ex *J. Ag.* *Syn. Alg.*, t. 2, f. 4.

*Hab.* Mediterráneo (Ag.). (n. v.)

**E. cervicornis Kg.** *Dasya cervicornis J. Ag.*

*Hab.* Costas de España en el Atlántico (Kg.). (n. v.)

## Trichothamnion.

**T. coccineum Kg.** *Dasya coccinea Ag.* *Hutchinsia coccinea Ag.* *Ceramium coccineum DC.* *Fucus coccineus Poir.* *Conferva coccinea Huds.* *Dillw.*, t. 36. *Engl. bot.*, t. 1055.

*Hab.* Costas de España (Lge.). (v. s.)

*Prov.* Vascongadas (Lge.); Portugalete (Lge.)

*Galicia* (Lge.); Coruña (Lge.)

## Eupogonium.

**E. villosum Kg.**

*Hab.* Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

**E. Arbuscula Kg.** *Conferva Arbuscula Dillw.*, t. G. *Dasya Arbuscula Ag.* *D. Hutchinsia Harv.*

*Hab.* Costas del Atlántico y del Mediterráneo (Ag.). (n. v.)

**E.? corymbiferum Kg.** *Dasya corymbifera J. Ag.*

*Hab.* Costas de España en el Atlántico (J. Ag.). (n. v.)

## Dasya.

**D. ocellata Harv.** *Phyc. brit.*, t. 40. *D. simpliuscula Ag.* *Ceramium ocellatum Grat.* *Hutchinsia ocellata Ag.*

*Hab.* Costas de España en el Ferrol (L. Seoane). (n. v.)

## TILOCARPEAS.

**Acanthothylus.**

**A. Heredia Kg.** *Sphaerococcus Heredia Ag. Fucus Heredia Clem. Ens. F. laciniatus Balb. F. Cypellon Bert. Amaen., t. 5, f. 5. Halymenia spermophora Lamour. Delesseria spermophora Lamour. Fucus spermophorus L. Turn., t. 76. Phyllophora Heredia J. Ag.*

*Hab.* Costas de España (Clem., Cabr.). (v. s.)

*Prov.* Vascongadas (Wk.); Fuenterribia (Wk.)

*Andalucía* (Clem., Cabr.); Cádiz (Clem., Cabr.), Sanlúcar de Barrameda (Clem., Wk.), Puerto de Santa María (Wk.)

**Phyllophora.**

**Ph. rubens Grev.** *Alg. brit., t. 15. Sphaerococcus rubens Ag. Chondrus rubens Lyngb. Halymenia rubens Duby. Delesseria rubens Lamour. Fucus rubens L. Turn., t. 12. Engl. bot., t. 1053.*

*Hab.* Costas de España (Lag., Clem.) y Portugal (Vand.).  
(v. v.)

*Cataluña* (Colm.)

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.); Candás (Lag.)

*Galicia* (L. Seoane); Ares, Ferrol (L. Seoane).

*Valencia* (Cav.)

*Andalucía* (Clem., Cabr.); Cádiz (Clem., Cabr.), inmediaciones del Castillo de San Pedro, Sanlúcar de Barrameda, Marbella (Clem.)

*Portugal* (Vand., Brot.); desembocaduras del Tajo y Duero (Brot.)

**Ph. nervosa Grev.** *Sphaerococcus nervosus Ag. Halymenia nervosa Duby. Dawsonia nervosa Lamour. Delesseria nervosa Lamour. Fucus nervosus Turn., t. 43.*

*Hab.* Costas de España (?). (n. v.)

### Phyllotylus.

**P. membranifolius Kg.** *Phyc.*, t. 62, f. 2. *Chondrus membranifolius* Grev. *Sphaerococcus membranifolius* Ag. *Fucus membranifolius* Good. ex Woodw. *Turn.*, t. 74. *Engl. bot.*, t. 1965. *F. fimbriatus* Huds.

*Hab.* Costas de España (Lag., Clem.). (v. v.)

*Cataluña* (Colm.)

*Galicia* (L. Seoane): Coruña (L. Seoane).

*Andalucía* (Clem.): Sanlúcar de Barrameda, Cádiz (Clem., Cabr.)

### Pachycarpus.

#### P. dilatatus Kg.

*Hab.* Costas de España en el Mediterráneo (Wk.). (n. v.)

### Oncotylus.

**O. norvegicus Kg.** *Fucus norvegicus* Gunn. *Flor. norv.*, t. 3, f. 4. *Turn.*, t. 41. *Engl. bot.*, t. 1080. *Sphaerococcus norvegicus* Ag. *Chondrus norvegicus* Lyngb.

*Hab.* Costas de España (Clem., Lag.). (v. s.)

*Galicia* (Lge.): Coruña (Lge.)

*Andalucía* (Clem.): Algeciras (Clem.)

**O. crenulatus Kg.** *Sphaerococcus crenulatus* Ag. *Fucus crenulatus* Turn., t. 40.

*Hab.* Costas de Portugal no lejos del Duero (Poir., Spr.). (n. v.)

### Gymnogongrus.

**G. Griffithsiæ Mart.** *Chondrus Griffithsiæ* J. Ag. *Gigartina Griffithsiæ* Lamour. *Polyides Griffithsiæ* Gaill. *Sphaerococcus Griffithsiæ* Ag. *Fucus Griffithsiæ* Turn., t. 37. *Engl. bot.*, t. 1926.

*Hab.* Costas de España en Vigo (Lge.). (n. v.)

**G. plicatus Kg.** *Gigartina plicata* Lamour. *Sphaerococcus plicatus* Ag. *Ceramium plicatum* Roth. *Fucus plicatus* Turn., t. 180. Engl. bot., t. 1089.

*Hab.* Costas de España (Lag., Clem.). (v. s.)

*Cataluña* (Colm.)

*Prov.* Vascongadas (Lge.): San Sebastián (Lge.)

Asturias (Lag.): Concha de Artedo (Lag.)

*Andalucia* (Clem.): Sanlúcar de Barrameda, Cádiz (Clem., Colm.)

*Var.*  $\beta$  *coccineus* Clem. *Ens.* Fronde vix pollicari, tenuissima, pulchre coccinea. Clem. loc. cit. Cádiz (Clem.)

**G. Torreyi Ag.?**

*Hab.* Costas septentrionales de España en Santander y San Sebastian (Lge.). (n. v.)

#### ESFEROCOCCEAS.

---

#### Fauchea.

**F. repens Mont.** *Sphaerococcus repens* Ag. *Chondrus repens* Grev. *Gracilaria repens* J. Ag. *Plocaria repens* Endl.

*Hab.* Costas de España (Kg.) en la Coruña (Fauché) y en Cádiz (Bedeau). (n. v.)

#### Rhodophyllis.

**R. bifida Kg.** *Sphaerococcus bifidus* Ag. *Rhodomenia bifida* Grev. Harv. *Phyc. brit.*, t. 32. *Fucus bifidus*. Engl. bot., t. 773. Turn., t. 154. *Halymenia bifida* Duby.

*Hab.* Costas de España (Clem., Lag.). (v. s.)

*Galicia* (L. Seoane).

*Andalucia* (Clem., Lag.): Cádiz (Clem., Lag.), Tarifa, Málaga (Clem.), Almería (Lag.)

Sphærococcus.

**S. confervoides** Ag. *Phyc.*, t. 60, f. 3. *Fucus confervoides* L. *Turn.*, t. 84. *Engl. bot.*, t. 1688. *Gigartina confervoides* Lamour. *Plocaria confervoides* Mont. *Gracilaria confervoides* Grev.

*Hab.* Costas de España (Lag., Clem.) y Portugal (Brot.).  
(v. s.)

Asturias (Lag.): Gijon, Concha de Artedo (Lag.)

Galicia (Lge.): Coruña (Lge.)

Andalucía (Clem., Cabr.): Cádiz (Clem., Cabr.), Sanlúcar de Barrameda (Clem., Flores, Wk.), Rota, Chipiona (Clem., Lag., Wk.), Isla de Leon, Puerto de Santa María, Puerto Real, Tarifa, Málaga (Clem.)

Portugal (Brot.): Tajo en la desembocadura, costas de Setubal y Cecimbra (Brot.)

Var.  $\beta$  *procerrimus* Ag. *Fucus longissimus* Wulf. *F. procerrimus* Esper., t. 92. Cádiz (Clem.)

Var.  $\gamma$  *ramulosus* Ag. Costas de España (?).

Var.  $\delta$  *verrucosus* Ag. *Fucus verrucosus* Gmel. *Fuc.*, t. 14, f. 1. *F. albus* Wulf. *F. albidus* Huds. Algeciras (Clem.)

Var.  $\epsilon$  *gracilis* Ag. *Fucus gracilis* Stackh. Cádiz, Castillo de Puntales (Wk.)

Var.  $\zeta$  *macrocarpus* Clem. *Ens.* Fronde subcompressa, ramosa, rubenti, ramis ramulisque subimplicatis, raro basi attenuatis, ramulis subulatis, tuberculis magnis. Clem. loc. cit. Sanlúcar de Barrameda (Clem.)

Var.  $\eta$  *subsimplex* Clem. *Ens.* Præcedenti duplo triplove minor (vix pollicaris), subsimplex, rubella. Clem. loc. cit. Sanlúcar de Barrameda (Clem.)

Var.  $\vartheta$  *fastigiatus* Clem. *Ens.* Convenit cum antecedenti, præterquam quod inferne subsimplex, superne ramosissima, purpurea, nigricans, ramis confertis, fastigialis. Clem. loc. cit. Sanlúcar de Barrameda en las rocas del Castillo del Espíritu Santo (Clem.)

**S. Lagasca.** *Fucus Lagasca* Clem. *Ens.* Fronde compressa, dichotoma sensim sursum attenuata, margine ciliata,

ciliis sparsis, tuberculiferis, tuberculis sessilibus, ciliis brevissimis suffultis. Clem. loc. cit.

*Hab.* España en las costas de Cádiz (Clem.). (n. v.)

**S. divergens Ag.** *Plocaria divergens Mont.*

*Hab.* Costas meridionales de España (Spr.). (n. v.)

**S. vagus Kg.**

*Hab.* Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

**S. armatus Ag.** *Plocaria armata Mont.* *Gracilaria armata Grev.* *Hypnea armata J. Ag.* *Sphaerococcus durus Kg.* *Phyc.*, t. 61, f. 2.

*Hab.* Mediterráneo (Ag.). (n. v.)

**S. compressus Ag.** *Plocaria compressa Endl.* *Gracilaria compressa Grev.* *Sphaerococcus secundus Ag.* *Grev.* *Cr. Scot.* *Fl.*, t. 341. *Fucus Stackouse Clem.* *Ens.?* Fronde coriaceo-gelatinosa, solida, ramis primariis ac secundariis compressis, cæteris teretibus, extimis repente complanatis atque in membranas lineares abeuntibus. Clem. loc. cit.

*Hab.* Atlántico y Mediterráneo (Ag.) en las costas de Cádiz (Clem.). (v. s.)

**S. durus Ag.** *Gracilaria dura J. Ag.* *Gigartina dura Grev.* *Plocaria dura Endl.*

*Hab.* Mediterráneo (Ag.). (n. v.)

**S. multipartitus Ag.** *Fucus multipartitus Clem.* *Ens.* et *Vand.* *Fucus granateus Turn.*, t. 215. *Chondrus agathoicus Lamour.* *Ess.* t. 3, f. 3-5. *Ch. multipartitus Grev.* *Gracilaria multipartita Mont.* *Rhodymenia multipartita Mont.*

*Hab.* Costas de España (Clem., Cabr.) y Portugal (Vand.). (v. s.)

*Andalucia* (Clem., Cabr.): Cádiz (Clem., Cabr.), Sanlúcar de Barrameda (Clem., Wk.), Tarifa, Algeciras, Málaga (Clem.), Chipiona (Wk.)

*Portugal* (Vand.)

*Var.  $\alpha$  crispus Clem.* *Ens.* Apicibus subdentato-crispis, subrotundatis. Clem. loc. cit. Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María, Cádiz (Clem.)

*Var.  $\beta$  foliifer Ag.* *Fucus foliifer Forsk.* *F. æruginosus Turn.*, t. 147. Costas de Portugal (Kg.)—*F. multipartitus  $\beta$  elongatus Clem.* *Ens.?* Segmentis extremis valde elongatis,

subsimplicibus, constanter attenuatis. Clem. loc. cit. Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María, Tarifa (Clem.)

**S. palmatus** Kg. *F. palmatus* L. Turn., t. 113. Engl. bot., t. 1306. *F. ovinus* Gunn. *F. rubens* Esper. *Fuc.*, t. 75. *F. dulcis* Gmel. *Delesseria palmata* Lamour. *Halymenia palmata* Ag.

Hab. Costas de España (Lag., L. Alonso) y Portugal (Vand.). (v. s.)

Asturias (Lag.): Cudillero, Candás (Lag.)

Galicia (L. Alonso): Ferrol (L. Alonso.)

Portugal (Vand.)

**S. Palmetta** Ag. *Fucus Palmetta* Esper. *Fuc.*, t. 40. Turn., t. 73. Engl. bot., t. 1120. *Rhodomenia Palmetta* Grev.

Hab. Atlántico y Mediterráneo (Ag.)

Var.  $\zeta$  *palmatus* Ag. *Fucus pseudo-palmatus* Lamour. Costas de España en el Atlántico (Poir.)

#### GELIDIEAS.

---

#### Gelidium.

**G. cartilagineum** Gaill. *Fucus cartilagineus* L. Turn. t. 124. Engl. bot., t. 1477. *Sphaerococcus cartilagineus* Ag.

Hab. Costas de España (Salcedo) y Portugal (Vand., Link.). (n. v.)

Santander (Salcedo).

Portugal (Vand., Link.): Tajo en la desembocadura y entre Setubal y Cecimbra (Link., Brot.)

Baleares: Menorca (Alabau).

**G. corneum** Lamour. *Grev. Alg. brit.*, t. 15. *Mont. Expl. Alger.*, t. 16, f. 6. *Sphaerococcus corneus* Ag. *Fucus corneus* Huds. Turn., t. 257. Engl. bot., t. 1970. *F. bipinnatus* Desf.

Hab. Costas de España (Lag., Clem., Salcedo). (v. v.)

Cataluña (Colm.)

Prov. Vascongadas (Eguia, Lge.)

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.): Candás (Lag.)

*Galicia* (Lge.): Coruña (Lge.)

*Valencia* (Lag.): Alicante (Lag.)

*Andalucia* (Clem.): Cádiz (Clem., Cabr., Colm.), Rota, Isla de Leon, Tarifa, Marbella, Cabo de Gata (Clem.), Málaga (Clem., Lge.), Almería (Lge.)

*Var. β sesquipedale Kg.* *Fucus corneus sesquipedalis Clem.*  
*Ens. Turn.*, t. 257, fig. f. *Gelidium maximum Bory.* Cádiz (Clem., Cabr.), Algeciras (Clem.)

*Var. γ nitidum Ag.* *Gelidium rigidum Bory ex Mont.* *Fucus spinosus Gmel.* *Fuc.*, t. 18, f. 3. *F. hypnoides Bertol.* Asturias (Lag.), Isla de Leon, Cádiz, Rota (Clem.)

*Var. δ sericeum Ag.* *Fucus sericeus Gmel.* *Fuc.*, t. 13, f. 3. *F. corneus elegans et F. corneus planus Clem.* *Ens.?* Cádiz (Clem., Cabr., Wk., Bourg.), Coruña (Guio), costa cantábrica (Lge.), Sanlúcar de Barrameda, Rota, Puerto de Santa María, Tarifa, Algeciras, Marbella, Málaga, Almería, Cabo de Gata (Clem.), Isla de Leon (Wk.)—*Forma minor.* Sanlúcar de Barrameda, Algeciras (Clem.)

*Var. ε pinnatum Huds.* *Turn.*, t. 257, fig. d. *F. hypnoides Desf.* Mediterráneo (Desf.)

*Var. ζ laciniatum Ag.* Cádiz, Málaga (Kg.)

*Var. η capillaceum Mont.* *Fucus capillaceus Gmel.* *Fuc.*, t. 15, f. 1. Santander (Salcedo), Galicia (Herb. Madr.), Sanlúcar de Barrameda (Clem., Wk.), Puerto de Santa María, Tarifa, Algeciras, Marbella, Málaga (Clem.), Chipiona (Wk.)

*Var. ς setaceum Mont.* Mediterráneo (Mont.)

*Var. ν spinulosum Mont.* *Fucus corneus attenuatus Clem.* *ex Kg.* Costas meridionales de España (Clem. ex Kg.)

*Var. ο hypnosum Mont.* *Gelidium hypnosum Bory.* Mediterráneo (Mont.)

*Var. π heterophyllum Kg.* *Fucus heterophyllus Clem.* *Ens.* Rota, Cádiz (Clem.)

**G. pectinatum Mont.** *Expl. Alger.*, t. 10, f. 1. *Sphaerococcus corneus ε pristoides Ag.* *Fucus Serra Gmel.*

*Hab.* Costas de España en Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Cádiz (Wk.). (n. v.)

**G. miniatum Kg.** *Fucus miniatus Drap.* *Gigartina miniata Lamour.*

*Hab.* Mediterráneo (Lamour.). (n. v.)

**G. microdon Kg.**

*Hab.* Costas de España en Cádiz (Wk.). (n. v.)

### **Acrocarpus.**

**A. crinalis Kg.** *Fucus crinalis Turn.*, t. 198. *Sphaerococcus corneus* ♂ *crinalis Ag.* *Gelidium crinale Lamour.*

*Hab.* Costas de España en el Ferrol (L. Seoane). (n. v.)

**A. pulvinatus Kg.** *Sphaerococcus corneus* o *pulvinatus Ag.*

*Hab.* España en el promontorio de San Sebastian cerca de Cádiz y en la desembocadura del Guadalquivir (Wk.). (n. v.)

**A. pusillus Kg.** *Fucus pusillus Turn.*, t. 108. *F. cespitosus Stackh.* *F. clavatus Lamour.* *Diss.*, t. 22, f. 1, 2. *Gelidium clavatum et intricatum Lamour.*

*Hab.* Atlántico y Mediterráneo (Kg.). (v. v.)

### CISTOCLONIEAS.

---

#### **Hypnæa.**

**H. mûsciformis Lamour.** *H. spinulosa Duby.* *Sphaerococcus musciformis Ag.* *Fucus musciformis Wulf.* *Turn.*, t. 127.

*Hab.* Costas de España (Lag., Clem., Cabr.) y Portugal (Brot.). (v. s.)

*Asturias* (Lag.)

*Galicia* (Lge.): *Pontevedra* (Lge.)

*Andalucia* (Clem., Cabr.): *Algeciras*, *Sanlúcar de Barrameda* (Clem.), *Cádiz* (Cabr., Clem.), *La Cortadura* cerca de Cádiz (Wk.)

*Portugal* (Brot.): *Tajo* en la desembocadura (Brot.)

*Baleares*: *Mallorca* (Lag.), *Menorca* (Texid.)

*Nombr. vulg. Cast.* Yerba lombrigüera (*Herbol.*) *Val.* Herba cuquera (*Herbol.*) *Balear.* Herba cuquera (*Herbol.*)—Suele usarse en lugar del *Alsidium Helminthocorton Kg.*, y corre mezclada con otras algas.

**H. Rissoana J. Ag.** *Sphaerococcus divaricatus Ag.*

*Hab.* Mediterráneo (*Ag.*). (n. v.)

**H. Valentiae Mont.** *Sphaerococcus musciformis* ♂ *Valentiae Ag.* *Fucus Valentiae Turn.*, t. 78. *F. hamulosus Turn.*, t. 79. *Hypnea hamulosa Lamour.*

*Hab.* Atlántico (*Mont.*) (n. v.)

### Cystoclonium.

**C. purpurascens Kg.** *Phyc.*, t. 58. *Fucus purpurascens Huds.* *Engl. bot.*, t. 1243. *Turn.*, t. 9. *Sphaerococcus purpurascens Ag.* *Gigartina purpurascens Lamour.*

*Hab.* Costas de España en Cádiz (*Clem.*, *Cabr.*, *Colm.*), Rota (*Clem.*) é Islas Baleares (*Texid.*). (v. v.)

### RINCOCOCEAS.

---

### Calliblepharis.

**C. ciliata Kg.** *Phyc.*, t. 62, f. 3. *Rhodymenia ciliata Grev.* *Halymenia ciliata Gaill.* *Sphaerococcus ciliatus Ag.* *Fucus ciliatus L.* *Turn.*, t. 70. *Engl. bot.*, t. 1069.

*Hab.* Costas de España (*Lag.*, *Flores*, *Clem.*). (v. v.)

*Prov.* *Vascongadas* (*Eguía*, *Lge.*): *Bilbao* (*Eguía*), *Portugalete*, *San Sebastian* (*Lge.*)

*Asturias* (*Lag.*): *Candás*, *Cudillero*, *Gijon* (*Lag.*)

*Galicia* (*Guio*): *Coruña* (*Guio*).

*Andalucia* (*Flores*, *Clem.*): *Cádiz* (*Clem.*, *Cabr.*, *Wk.*, *Colm.*), *Sanlúcar de Barrameda* (*Clem.*, *Wk.*, *Colm.*), *Tarifa*, *Algeciras* (*Clem.*)

*Var. β media.* *Fucus ciliatus var. media Clem.* *Sanlúcar de Barrameda* (*Clem.*)

**C. jubata Kg.** *Rhodymenia jubata* Grev. *Harv. Phyc. brit.*, t. 175. *Sphaerococcus jubatus* Grev. *Fucus jubatus* Good and Hoodw. *Sphaerococcus ciliatus* γ *jubatus* Ag. *Fucus ciliatus* var. *jubatus*, *lanceolatus*, *angustus* et *spinosus* Turn., t. 70, fig. f. h.

*Hab.* Costas de España (Lag., Clem.). (v. s.)

Asturias (Lag.): Candás (Lag.)

Andalucía (Clem.): Sanlúcar de Barrameda, Cádiz (Clem.)

### Rhynchococcus.

**R. coronopifolius Kg.** *Phyc.*, t. 61, f. 1. *Fucus coronopifolius* L. *Turn.*, t. 122. *Engl. bot.*, t. 1478. *Gelidium coronopifolium* Lamour. *Sphaerococcus coronopifolius* Ag.

*Hab.* Costas de España (Lag., Clem.). (v. s.)

*Prov.* Vascongadas (Lge.): San Sebastian (Lge.)

Asturias (Lag.): Concha de Artedo, Candás (Lag.)

Valencia (R. García ex Lag.)

Andalucía (Clem.): Cádiz, Algeciras, Almería (Clem.), la Cortadura cerca de Cádiz (Wk.)

### CAULACANTEAS.

---

### Caulacanthus.

**C. ustulatus Kg.** *Fucus ustulatus* Mertens. *Sphaerococcus ustulatus* Ag. *Gigartina ustulata* Duby. *Olivia ustulata* Mont. *Expl. Alger.*, t. 16, f. 3.

*Hab.* Costas de España (Lge.). (n. v.)

Galicia (Lge.): Coruña, Ferrol (Lge.)

Andalucía (Lge.): Málaga (Lge.)

## GIGARTINEAS.

## Gigartina.

**G. pistillata** Lamour. *Fucus pistillatus* Gmel. *Fuc.*, t. 12, f. 1. *F. gigartinus* L. Turn., t. 28. *Engl. bot.*, t. 908. *Ceramium gigartinum* Roth.

*Hab.* Costas de España (Clem., Salcedo). (v. s.)

*Santander* (Salcedo, Lge.)

*Asturias* (Lag.): Concha de Artedo (Lag.)

*Andalucia* (Clem.): Rota, Puerto de Santa María, Cádiz, Algeciras, Málaga (Clem.)

**G. acicularis** Lamour. *Grev. Alg. brit.*, t. 16. *Fucus acicularis* Wulf. Turn., t. 126.

*Hab.* Costas de España en Vigo y la Coruña (Lge.). (n. v.)

**G. compressa** Kg.

*Hab.* Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

## Furcellaria.

**F. lumbricalis** Kg. *Polyides rotundus* Grev. *Alg. brit.*, t. 11. *P. lumbricalis* Ag. *Spongiocarpus rotundus* Grev. *Gigartina rotunda* Lamour. *Fucus rotundus* Gmel. *Hist.*, t. 6, f. 3. Turn., t. 5. *Engl. bot.*, t. 1738.

*Hab.* Costas de España (Lag., Clem.). (v. s.)

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.): Concha de Artedo (Lag.)

*Galicia* (L. Seoane).

*Andalucia* (Clem.): Cádiz (Clem., Cabr.), Sanlúcar de Barrameda (Clem., Lag.), Conil, Málaga (Clem.)

**F. fastigiata** Lamour. *Kg. Phyc.*, t. 71. *Grev. Alg. brit.*, t. 11. *F. lumbricalis* Lamour. *Fucus lumbricalis*. Gmel. Turn., t. 6. *Engl. bot.*, t. 824. *F. furcellatus* L. *F. fastigiatus* Huds.

*Hab.* Costas de España (Lag., Salcedo). (v. s.)

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.): *Concha de Artedo* (Lag.)

*Andalucia* (Clem., Cabr.): *Cádiz* (Clem., Cabr.), *Málaga* (Clem.)

### Solieria.

**S. chordalis J. Ag.** *Sphaerococcus chordalis* Ag. *Syn. Delesseria chordalis* Ag. *Spec. Gigartina gaditana* Mont. in *Webb. Otia*, t. 7, fig. d. t.

*Hab.* Costas de España en Cádiz (Cabr., Clem., Hered., Webb.). (v. s.)

### Callophyllis.

**C. laciniata Kg.** *Fucus laciniatus* Huds. *Turn.*, t. 69. *Engl. bot.*, t. 1068. *Sphaerococcus laciniatus* Lyngb., t. 4. *Halymenia laciniata* Duby. *Fucus ciliatus* Gmel. *Fuc.*, t. 21, f. 1. *Delesseria ciliaris* Lamour. *Fucus crispatus* Stackh.

*Hab.* Costas de España (Clem., Salcedo, Lge.). (v. s.)

*Prov.* *Vascongadas* (Lge.): San Sebastian (Lge.)

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.): *Concha de Artedo*, *Cudillero* (Lag.)

*Galicia* (Lge.): *Coruña* (Lge.)

*Andalucia* (Clem.): *Sanlúcar de Barrameda* (Clem.)

### Euhymenia.

**E. Lactuca Kg.** *Cryptomenia Lactuca* J. Ag. *Fucus Palmetta* Gmel. *Fuc.*, t. 22, f. 3, t. 23.

*Hab.* Atlántico y Mediterráneo (Ag.). (n. v.)

**E. seminervis Kg.** *Sphaerococcus seminervis* Ag. *Ic. ined.*, t. 17. *Cryptomenia seminervis* J. Ag.

*Hab.* Costas de España en Cádiz (Ag., Kg.). (n. v.)

**E. reniformis Kg.** *Fucus reniformis* Turn., t. 113. *Engl. bot.*, t. 2116. *Halymenia reniformis* Ag. *Iridaea reniformis* Bory.

*Hab.* Costas del Mediterráneo (Kg.) y las del Atlántico en la ria de Vigo (L. Seoane). (n. v.)

**E. Dubyi Kg.** *Kallymenia Dubyi* Harv. *Phyc. brit.*, t. 123. *Kallymenia Dubyi* Chauv. *Nemastoma Dubyi* J. Ag.

*Hab.* Costas de España (Kg.). (n. v.)

**E. Requienii Kg.** *Kallymenia Requienii* J. Ag. *Mont.*

*Expl. Alger.*, t. 10, f. 4. *Rhodomenia Requienii* J. Ag.

*Hab.* Mediterráneo (J. Ag.). (n. v.)

### Chondroclonium.

#### **Ch. horridum Kg.**

*Hab.* Costas meridionales de España en el Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

**Ch. Teedii Kg.** *Fucus Teedii* Turn., t. 208. *Ceramium Teedii* Roth. *Gigartina Teedii* Lamour. *Ess.*, t. 4, f. 11. *Sphaerococcus Teedii* Ag.

*Hab.* Costas de España (Lge.) y Portugal (Turn.). (v. s.)

*Santander* (Lge.)

*Galicia* (Lge.): *Coruña* (Lge.)

*Portugal* (Turn.)

### Chondrus.

**Ch. crispus Lyngb.** *Grev. Alg. brit.*, t. 15. *Fucus seu Quercus marina, minima, latifolia, crispa, hispanica, Tournef. Inst.* 566. *Fucus XIII Quer excl. synon. Fucus crispus L.* Turn., t. 216, 217. *F. polymorphus* Lamour. *excl. ser. quarta. Ciondrus polymorphus* Lamour. *Sphaerococcus crispus* Ag. *Fucus ceranoides* Gmel. *Fuc.*, t. 7. *Brot. F. lacerus* Stackh. *F. pumilus* Flor. dan., t. 1066.

*Hab.* Costas de España (Tournef., Quer, Lag.). (v. s.)

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.): *Candás, Gijon, Concha de Arredo* (Lag.)

*Galicia* (Quer, Guio): *Coruña* (Guio, Lag.), *Ferrol* (L. Seoane).

*Andalucia* (Clem.): *Cádiz* (Clem., Cabr.), *Sanlúcar de Barrameda, Rota, Málaga* (Clem.)

*Portugal* (Vand., Brot.): Tajo en la desembocadura (Vand., Brot.)

*Var. β pseudo-crispus.* *Fucus pseudo-crispus Clem. Ens.*  
Fronda plana, hinc subalata, coriaccea, molli, ramis sublinearibus, integris; tuberculis subconfertis, minutissimis, immersis, utrinque convexis. Clem. loc. cit. Cádiz (Clem., Cabr.), Rota (Clem.)

*Nomb. vulg. Cast.* Carragahen, Musgo perlado, Líquen de mar, Líquen de Irlanda (Bassag.)

*Ch. dubius Mont.* *Sphaerococcus crispus × dubius Ag.*  
*Chondrus Clementi et Ch. Cabreræ Bory herb.*

*Hab.* Costas de España en el Mediterráneo (Bory). (n. v.)

### Mastocarpus.

**M. mamillosus Kg.** *Phyc.*, t. 76, f. 3. *Sphaerococcus mamillosus Ag.* *Fucus mamillosus Ag.* *Turn.*, t. 218. *Engl. bot.*, t. 1054. *F. ceranoides* ð Gmel.

*Hab.* Costas de España (Lag., Colm.). (v. v.)

*Asturias* (Lag.): Concha de Artedo (Lag.)

*Galicia* (Lge): Vigo, Coruña (Lge.)

*Andalucia* (Colm.): Cádiz (Colm., Kg.)

### Grateloupia.

**G. filicina Ag.** *Harv. Phyc. brit.*, t. 100. *Fucus filicinus Wulf.* *Turn.*, t. 150. *Delesseria filicina Lamour.*

*Hab.* Costas de España (Lge.) y Portugal (Link.). (v. s.)

*Prov. Vascongadas* (Lge.): Portugalete (Lge.)

*Portugal* (Link., Brot.): Tajo en la desembocadura (Link., Brot.)

*Baleares:* Menorca (Texid.)

**G. verruculosa Grev.** *Kg. Phyc.*, t. 75, f. 1. *Fucus verruculosus Bertol.* *F. Rissoanus Turn.*, t. 253. *Sphaerococcus verruculosus Ag.* *Erinacea verruculosa Lamour.* *Kallymenia verruculosa Duby.*

*Hab.* Mediterráneo (Ag.). (n. v.)

**G. dichotoma J. Ag.**

*Hab.* Mediterráneo (Lenormand). (n. v.)

### Iridæa.

**I. edulis** Bory. *Harv. Phyc. brit.*, t. 97. *Halymenia edulis* Ag. *Delesseria edulis* Lamour. *Fucus edulis* Stackh. *Ner. brit.*, t. 12. *Turn.*, t. 114. *Engl. bot.*, t. 1307.

*Hab.* Costas de España (Lag., Clem.). (v. s.)

Santander (Lge.)

Asturias (Lag.): Cudillero, Concha de Artedo (Lag.)

Galicia (Lge.): Coruña (Lge.), Ferrol (L. Seoane).

**I. minor** Endl. *Halymenia edulis* β *minor* Ag. *Fucus reniformis tenuior* Turn., t. 113, fig. g.

*Hab.* Costas de España en Cádiz y Málaga (Hæns.). (n. v.)

**I. elliptica** Kg.

*Hab.* Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

### HALIMENIEAS.

### Catenella.

**C. Opuntia** Grev. *Alg. brit.*, t. 17. *Halymenia Opuntia* Ag. *Lomentaria Opuntia* Guill. *Chondria Opuntia* Hook. *Gigartina Opuntia* Lamour. *Rivularia Opuntia* Engl. *bot.*, t. 1868. *Fucus Opuntia* Turn., t. 107. *F. cæspitosus* Stackh. *Ner. brit.*, t. 12.

*Hab.* Costas de España (Clem., Lge.). (v. v.)

*Prov.* Vascongadas (Lge.): Portugalete (Lge.)

Galicia (Lge.): Ferrol (Lge.)

Andalucía (Clem., Lge.): Cádiz, Puerto de Santa María (Clem.), Málaga (Lge.)

Portugal (Loeffl.): Setubal (Loeffl.)

Baleares: Menorca (Texid.)

### Halarachnion.

**H. ligulatum Kg.** *Halymenia ligulata* Ag. *Ulva ligulata* Woodw. Engl. bot., t. 421. *U. furcata* Ag. *Dumontia inaequalis* Lamour.

*Hab.* Atlántico (Kg.). (n. v.)

**H. elongatum Kg.** *Halymenia elongata* Ag.

*Hab.* Costas meridionales de España (Kg.). (n. v.)

**H. ventricosum Kg.** *Halymenia ventricosa* Ag. *Dumontia incrassata* Lamour. Ess., t. 4, f. 6.

*Hab.* Costas del Mediterráneo (Kg.) y las del Atlántico en el Ferrol? (L. Seoane). (n. v.)

**H. cystophorum Kg.** *Dumontia et Halymenia cystophora* Mont.

*Hab.* Costas del Mediterráneo (Delile, Bory). (n. v.)

**H. pinnulatum Kg.** *Halymenia algeriensis* Mont.

*Ann. sc. nat. X, t. 9, f. 2.* *Chrysymenia pinnulata* J. Ag.

*Hab.* Mediterráneo (J. Ag., Mont.). (n. v.)

**H. spathulatum Kg.**

*Hab.* Mediterráneo (Lenormand). (n. v.)

**H. trigonum Kg.** *Halymenia trigona* Ag. *Fucus trigonus* Clem.

*Hab.* Costas de España en Rota, Puerto de Santa María, Cádiz (Clem.). (v. s.)

**H. Lanceola Kg.** *Halymenia Lanceola* J. Ag.

*Hab.* Costas de España en el Atlántico (Kg.). (n. v.)

### Dumontia.

**D. filiformis Grev.** *Alg. brit.*, t. 17. *Dumontia incrassata* Lamour. *Halymenia filiformis* Ag. *Conferva filiformis* Flor. dan., t. 1480, f. 2. *Fucus contortus* Gmel. *Fuc.*, t. 22, f. 1.

*Hab.* Costas de España en el Ferrol (L. Seoane). (n. v.)

**D. ventricosa Lamour.** *Ess.*, t. 4, f. 6.

*Hab.* Costas de las Baleares en Menorca (Texid.). (n. v.)

### Halymenia.

- H. Floresia Ag.** *Fucus Floresius Clem. Turn., t. 256.*  
*Fucus proteus Delile Flor. aegypt., t. 58. f. 1-4.*  
*Hab.* Costas de España cerca de Cádiz y Sanlúcar de Barrameda (Clem., Cabr.). (n. s.)
- H. curvicornis J. Ag.**  
*Hab.* Costas del Mediterráneo (J. Ag.). (n. v.)
- H. cyclocolpa Mont.** *Expl. Alger., t. 11, f. 1, a-f.*
- H. multifida J. Ag.**  
*Hab.* Mediterráneo (J. Ag.). (n. v.)
- H. Monardiana Mont.** *Expl. Alger., t. 11, f. 2,*  
<sup>g-g.</sup>  
*Hab.* Costas del Mediterráneo (Mont.). (n. v.)

### GIMNOFLEACEAS.

### Nemalion.

- N. multifidum J. Ag.** *Harv. Phyc. brit., t. 36.*  
*Mesogloia multifida Ag.* *Chordaria multifida Lingb.* *Chaetophora multifida Hook.*  
*Hab.* Atlántico (Ag.). (n. v.)
- N. coccineum Kg.** *Mesogloia coccinea Ag.* *Rivularia verticillata Engl., bot. t. 2466.*  
*Hab.* Costas de España en el Ferrol (L. Seoane). (n. v.)

### Gymnophlæa.

- G. dichotoma Kg.** *Nemastoma dichotoma J. Ag.* *Iridaea dichotoma Endl.*  
*Hab.* Mediterráneo (J. Ag.). (n. v.)

## CORALINEAS.

**Jania.**

**J. rubens** Lamour. *J. cristata* Endl. *Corallina rubens* Ell. et Soland. *C. rubens* et *cristata* Ellis, Corall., t. 24, fig. e. E. f. F.

*Hab.* Costas de España (Cav., Colm.). (v. v.)

*Cataluña* (Colm.)

*Valencia* (Cav.): Benicasim (Cav.)

*Andalucia* (Wk., Colm.): cercanías de Cádiz entre la Cerdadura y Torregorda (Wk., Colm.)

**J. longifurca** Zanard. *Corallina longifurca* Kg.

*Hab.* Costas de España en Cádiz (Bourg.). (n. v.)

**Corallina.**

**C. officinalis** Ell. et Soland. *Ellis Corall.*, t. 24, n. 2. A. *Corallina I.* Quer.

*Hab.* Costas de España (Quer.). (v. v.)

*Cataluña* (Sing. de Catal., Colm.)

*Santander* (Salcedo).

*Balcares:* Mallorca, Menorca (Texid.)

*Nomb. vulg. Cast.* Coralina (S. de Rib.)

**C. polychotoma** Lamour.

*Hab.* Costas de España en Cádiz (Lamour.). (v. v.)

**Amphiroa.**

**A. Beauvoisii** Lamour.

*Hab.* Costas de Portugal (Lamour.). (n. v.)

## ESPONGITEAS.

## Spongites.

- Sp. incrustans Kg.** *Lithophyllum incrustans* *Philippi.*  
*Ellis Corall.*, t. 27, f. 2, d. D.  
*Hab.* Mediterráneo (*Philippi*). (n. v.)
- Sp. agariciformis Kg.** *Melobesia agariciformis* *Harv.*  
*Phyc. brit.*, t. 73. *Millepora agariciformis* *Pallas.* *Millepora*  
*coriacea L.* *Millepora tortuosa* *Esper.*, t. 29. *Lithophyllum*  
*expansum* *Philippi.*  
*Hab.* Atlántico y Mediterráneo (*Philippi*). (n. v.)
- Sp. decussata Kg.** *Litophyllum decussatum* *Philippi.*  
*Melobesia decussata* *Endl.* *Millepora decussata* *Ell. et Soland.*  
*Zooph.*, t. 23, f. 9.  
*Hab.* Mediterráneo y costas de Portugal (*Philippi*). (n. v.)
- Sp. racemosa Kg.** *Phyc.*, t. 78, f. 3. *Lithothamnion*  
*crassum* *Philippi.*  
*Hab.* Mediterráneo (*Philippi*). (n. v.)
- Sp. fasciculata Kg.** *Melobesia fasciculata* *Harv.* *Phyc.*  
*brit.*, t. 74. *Millepora fasciculata* *Lamarck.*  
*Hab.* Atlántico y Mediterráneo (*Lamarck.*). (n. v.)
- Sp. nodosa Kg.**  
*Hab.* Mediterráneo (*Kg.*). (n. v.)
- Sp. stalactitica Kg.**  
*Hab.* Mediterráneo (*Kg.*). (n. v.)
- Sp. fruticulosa Kg.**  
*Hab.* Mediterráneo (*Kg.*). (n. v.)
- Sp. calcarea Kg.** *Millepora calcarea* *Ellis et Soland.*  
*Zooph.*, t. 23, f. 13. *Melobesia calcarea* *Harv.*  
*Hab.* Mediterráneo (*Kg.*). (n. v.)

## Melobesia.

- M. membranacea Lamour.** *Kg.* *Phyc.*, t. 78, f. 1.  
*Corallina membranacea* *Esper.* *Zooph.*, t. 12, f. 1-4.

*Hab.* Atlántico y Mediterráneo sobre las algas mayores (Lamour.). (n. v.)

**M. pustulata** Lamour. *Polyp. flex.*, t. 12, f. 2.  
a. B.

*Hab.* Atlántico y Mediterráneo sobre varias algas (Lamour.). (n. v.)

**M. corticiformis** Kg.

*Hab.* Atlántico sobre el *Gelidium corneum* Lamour. (Kg.) (n. v.)

**M. granulata** Menegh.

*Hab.* Mediterráneo sobre las *Udoteas* del mismo mar (Menegh.). (n. v.)

**M. verrucata** Lamour. *Millepora fucorum* Lamarck.

*Hab.* Mediterráneo sobre diversas algas (Lamour.). (n. v.)

### Hapalidium.

**H. Phyllactidium** Kg. *Phyllactidium confervicola*  
Kg. *Phyc. Lithocystis* Allmanni Harv. *Phyc. brit.*, t. 166.

*Hab.* Mediterráneo sobre varias algas (Kg.). (n. v.)

### PORFIREAS.

---

### Peyssonelia.

**P. squamaria** Dne. Kg. *Phyc.*, t. 77, f. 1. *Zonaria squamaria* Ag. *Dictyota squamaria* Lamour. *Ulva squamaria* DC. *Fucus squamarius* Gmel. *Fuc.*, t. 20, f. 1. *Turn.*, t. 244.

*Hab.* Costas de España (Clem., Lag., Cabr.). (v. v.)

*Cataluña* (Colm.)

*Prov.* Vascongadas (Lge.): Portugalete (Lge.)

*Santander* (Salcedo).

*Valencia* (Lag.): Alicante (Lag.)

*Andalucía* (Clem., Cabr.): Cádiz (Clem., Cabr., Lge.), Sanlúcar de Barrameda, Málaga (Clem.)

*Baleares: Mallorca, Menorca, Ibiza (Texid.)*

**P. rubra J. Ag.**

*Hab. Costas de España en Almería (Lge.). (n. v.)*

### Porphyra.

**P. bangiæformis Kg.**

*Hab. Golfo de Vizcaya sobre el *Chondrus crispus* Lyngb. (Kg.). (n. v.)*

**P. Boryana Mont. Explor. Alger., t. 13, f. 2.**

*Hab. Mediterráneo (Lenormand). (n. v.)*

**P. vulgaris Ag. Bot. Zeitg. P. purpurea Ag. Syst.**

*Ulva purpurea Roth. Cat. I, t. 6, f. 1.*

*Hab. Costas de España (Lag.). (v. s.)*

*Asturias (Lag.)*

*Galicia (L. Seoane).*

*Baleares: Mallorca, Menorca (Oleo, Texid.)*

**P. laciniata Ag. Ic., t. 27. P. umbilicalis Kg. Ulva laciniata Lightf., t. 33. U. umbilicalis Flor. dan., t. 1663.—*Lichen maritimus*, *flore rubente*, *flavescente et viridi*. *Lob. Grisl.*? La figura de Lobelio copiada por diversos autores pudiera representar un conjunto de ejemplares en tamaño muy reducido.**

*Hab. Costas de España (Clem.) y Portugal (Grisl.). (v. s.)*

*Galicia (L. Alonso): Ferrol (L. Alonso).*

*Andalucia (Clem.): Cádiz (Clem.)*

*Portugal (Grisl.)*

*Baleares: Menorca (Oleo).*

### CERAMIEAS.

---

### Microcladia.

**M. glandulosa Grev. Delesseria glandulosa Ag. Fucus glandulosus Soland. Turn., t. 38. Engl. bot., t. 2135. Halymenia implexa Duby.**

*Hab.* Costas de España en el Ferrol y la Coruña (L. Seoane). (n. v.)

### Centroceras.

**C. leptacanthum** Kg. *Spyridia clavulata* J. Ag.  
*Centroceras clavulatum* Mont.

*Hab.* Mediterráneo (J. Ag.). (n. v.)

### Ceramium.

**C. rubrum** Ag. *Conferva rubra* Huds. Dillw., t. 34.  
Engl. bot., t. 1166.

*Hab.* Costas de España (Clem., Lag.). (v. s.)

*Prov.* Vascongadas (Wk.): Fuenterrabia (Wk.)

Galicia (L. Seoane): Ferrol (L. Seoane).

Andalucía (Clem., Lag., Lge.): Rota, Cádiz, La Isla, Málaga, Algeciras (Clem., Lag.), Castillo de Puntales (Wk.)

**C. delicatum.** *Conferva delicata* Clem. Ens. Fronde gracillima, ramosa, tenerrima, valde glutinosa, globulis minutissimis, intense rubris, opacis, plus minus crebris interspersa, eleganter rubra, pellucida, obscuriuscule articulata, articulis depressis. Clem. loc. cit.

*Hab.* Costas de España en Sanlúcar de Barrameda, Rota, Puerto-Real, Algeciras (Clem.), Cabo de Gata (Clem., Lag.). (v. s.)

**C. flavigigerum** J. Ag. *Phyc. brit.*, t. 144.

*Hab.* Costas de España en Cádiz (Kg.). (n. v.)

**C. spiniferum** Kg.

*Hab.* Costas de España en Cádiz (Kg.). (n. v.)

**C. cancellatum** DC. *Conferva cancellata* Clem. Ens.?

*Hab.* Costas de España en Cádiz? (Clem.)

### Acanthoceras.

**A. echionotum** Kg. *Ceramium echionotum* Ag. Harv.  
*Phyc. brit.*, t. 141.

*Hab.* Atlántico y Mediterráneo (Ag.). (n. v.)

### Echinoceras.

**E. ciliatum Kg.** *Ceramium ciliatum* Auct. *Conferva ciliata* Ellis. *Clem. Ens.*

*Hab.* Costas de España en Cádiz (Clem., Cabr.). (n. v.)

**E. hirsutum Kg.**

*Hab.* Mediterráneo (Kg.). (n. v.).

### Hormoceras.

**H. diaphanum Kg.** *Ceramium diaphanum* Roth. *Conferva diaphana* Lightf.

*Hab.* Costas de España en Andalucía cerca de Cádiz (Clem., Cabr.), Algeciras (Clem.), y en Galicia cerca del Ferrol (L. Seoane). (v. s.)

**H. moniliforme Kg.** *Phyc.*, t. 46, f. 2.

*Hab.* Atlántico en las costas de Cádiz (Clem.) y Mediterráneo (Kg.). (v. s.)

**H. circinatum Kg.**

*Hab.* Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

### CALLITAMNIEAS.

---

### Ptilota.

**Pt. plumosa Ag.** *Lyngb.*, t. 9. *Harv. Phyc. brit.*, t. 80. *Plocamium plumosum* Lamour. *Ceramium plumosum* Roth. *Fucus plumosus L.* *Turn.*, t. 60. *Engl. bot.*, t. 1308.

*Hab.* Costas de España (Guío, Lag., Clem.) y Portugal (Brot.). (v. s.)

*Asturias* (Lag.): Candás, Avilés, Concha de Artedo (Lag.)

*Galicia* (Guío): Coruña (Guío), Ferrol (L. Seoane).

*Andalucia* (Clem., Lag.): Cádiz (Clem., Lag.) Conil, Santipetri (Clem.)

*Portugal* (Brot.): desembocadura del Tajo y entre Setubal  
y Cezimbra (Brot.)

*Baleares*: Menorca, Ibiza (Texid.)

### Spyridia.

**Sp. filamentosa** Harv. *Kg. Phyt.*, t. 48, f. 1-5.  
Harv. *Phyc. brit.*, t. 46. *Ceramium filamentosum* et *Hutchinsia filamentosa* Ag. *Fucus friabilis* Clem. *Ens. Conserva Griffitiana* Engl. *bot.*, t. 2312.

*Hab.* Costas de España en Cádiz (Clem., Lge.), Puerto de Santa María, Rota (Clem.) y el Ferrol (L. Seoane). (v. s.)

**Sp. nudiuscula** Kg.

*Hab.* Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

### Wrangelia.

**W. penicillata** Ag. *W. tenera* Ag. *Dasya spinella* Duby. *Mem. Ceram.*, t. 2, f. 4.

*Hab.* Mediterráneo (Duby). (n. v.)

### Halurus.

**H. equisetifolius** Kg. *Griffitsia equisetifolia* Ag. Harv. *Phyc. brit.*, t. 67. *Ceramium equisetifolium* DC. *Conservae equisetifolia* Lightf. Dillw., t. 54. Engl. *bot.*, t. 1479. *C. imbricata* Huds. *C. cancellata* Roth. Clem.? *C. supradecomposita* Clem. Ens.? *Dissert à cancellata fronde supra decomposita*, nec tantum composita, minus crassa, cirrhorum verticillis moniliformibus, distinctissimis, cirrhis ipsis rubris. Clem. loc. cit.

*Hab.* Costas de España en Cádiz (Clem., Cabr.,) Sanlúcar de Barrameda, Tarifa (Clem.), Coruña (Lge.). (v. s.)

### Griffitsia.

**G. corallina** Ag. *Conservae corallina* Lightf. Engl. *bot.*, t. 1815. Dillw., t. 98. *C. coralloides* L.

*Hab.* Costas de España (Clem., Lag.) y Portugal (Brot.).  
(v. s.)

*Santander* (Salcedo).

*Galicia* (L. Seoane); Vigo (L. Seoane).

*Andalucia* (Clem., Lag.): Cádiz (Clem., Lag.), Puerto de Santa María, Santi-Petri (Clem.)

*Portugal* (Brot.): Tajo en la desembocadura (Brot.)

**G. setacea Ag.** *Conferva setacea* Ellis. Engl. bot., t. 1689. *Dillw.*, t. 82. *Kg. Phyc.*, t. 44. V.

*Hab.* Atlántico y Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

**G. secundiflora J. Ag.** *G. crassa* Kg.

*Hab.* Costas de España en el Atlántico y Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

**G. sphærica Schousb.**

*Hab.* Costas de España en Cádiz (Lge.). (n. v.)

**G. Schousboei Mont.** in Webb. *Otia hisp.*, t. 10.

*G. Opuntia J. Ag.* *G. imbricata* Schousb. *G. cæspitosa* Harv.—*Conferva intricata* Clem. *Ens.?* Fronde tereti distiche ramosa, glutinosa, pellucida, ramis sparsis, parce ramulosis, articulis cylindrico-globosis. Clem. loc. cit.

*Hab.* Costas meridionales de Europa (Kg.), particularmente las de Cádiz (Clem.). (v. s.)

### Phlebothamnion.

**Ph. tripinnatum Kg.** *Callithamnion tripinnatum* Ag.

*Harv. Phyc. brit.*, t. 77.

*Hab.* Atlántico y Mediterráneo (Ag.). (n. v.)

**Ph. tetragonum Kg.** *Callithamnion tetragonum* Ag.

*Conferva tetragona* With. Engl. bot., t. 1690. *Ceramium brachiatum* Bonnem.

*Hab.* Mediterráneo (Ag.). (n. v.)

**Ph. Arbuscula Kg.** *Callithamnion Arbuscula* Lyngb.

*Hydr.*, t. 38. A. f. 1, 2, 3.

*Hab.* Costas de España en la Coruña (Lge.). (n. v.)

**Ph. versicolor Kg.** *Phyc.*, t. 44, f. 2. *Callithamnion versicolor* Ag. *Conferva versicolor* Draparn. *Ceramium fruticosum* Roth. *Conferva purpurascens* Huds. Engl. bot., t. 2465.

*Hab.* Atlántico y Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

**Ph. granulatum Kg.** *Ceramium granulatum* Ducluz.

**C. Grateloupii Duby.**

*Hab.* Costas de España en el Ferrol (Lge.) y las del Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

**Ph. pachycaulon Kg.**

*Hab.* Golfo de Vizcaya (De Martens). (n. v.)

### Callithamnion.

**C. variabile Ag.**

*Hab.* Costas occidentales de España (Ag.). (n. v.)

**C. intricatum Ag.** *Ceramium intricatum* Ag. *Syst.*

*Hab.* Costas de España en Cádiz (Kg.). (n. v.)

**C. refractum Kg.** *C. Plumula Ag. pro parte.*

*Hab.* Costas de España en el Atlántico (Kg.). (n. v.)

**C. Borreri Ag.** *Conferva Borreri Engl. bot., t. 1741.*

*Var.  $\beta$  flavellatum Kg.* *Callithamnion seminudum Ag.* Costas de Málaga (Lge.)

**C. flexuosum Ag.** *Callithamnion flexuosum Schousb.*

*Ceramium flexuosum Ag.*

*Hab.* Costas meridionales de España (?). (n. v.)

**C. nodulosum Kg.** *Griffithsia nodulosa Ag.* *Mesogloia attenuata Ag.* *Batrachospermum attenuatum Bonnem.* *Crouania attenuata J. Ag.* *Harv. Phyc. brit., t. 106.*

*Hab.* Mediterráneo (Ag.). (n. v.)

**C. multifidum Kg.** *Conferva multifida Huds. Engl. bot., t. 1816.* *Ceramium Casuarinæ DC.*

*Hab.* Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

## ISOCARPEAS.



## SARGASEAS.

## Sticophora.

**St. Hornschuchii Kg.** *Sargassum Hornschuchii Ag.*  
*Menegh. Alg. ital., t. 1. Fucus salicifolius Lamour. Ess., t. 1.*  
*f. 2, non Bertol. Sargassum salicifolium Mont. non Bory,*  
*S. amygdalifolium Bory.*

*Hab. Mediterráneo (Ag.). (n. v.)*

## Carpacanthus.

**C. Turneri Kg.** *Fucus natans γ acanthicarpus Turn..*  
*t. 44. Sargassum vulgare γ acanthicarpum Ag. S. amygdalifolium Bory pro parte. Sargassum Boryanum b amygdalifolium Mont.*

*Hab. Mediterráneo (Ag.). (n. v.)*

## Turbinaria.

**T. denudata Bory.** *Sargassum turbinatum Ag. pro parte. Fucus turbinatus Turn., t. 24, fig. a. c. d. e. F. conoides Forsk.*

*Hab. Costas de Menorca? (Hern., Camb., Oleo). (n. v.)*

## Sargassum.

**S. vulgare Ag.** *S. Boryanum Mont. Expl. Alger., t. 1,*  
*f. 3. Lenticula marina, serratis foliis Lobelii, Dalechampii.*  
*Grisl. Fucus VII Quer. Fucus natans G. Ort. Palau, Brot.*

*F. salicifolius* Bertol. non Lamour. *Sargassum salicifolium* Bory non Mont.

*Hab.* Costas de España (Sarm., Quer) y Portugal (Grisl., Brot.). (v. v.)

*Cataluña* (Texid.): Barcelona (Texid.)

*Galicia* (Sarm., Quer): Coruña (Guio), Ferrol (L. Alonso).

*Prov. Vascongadas* (Lardizab.): Guipúzcoa (Lardizab.)

*Andalucía* (Clem., Cabr.): Cádiz (Clem., Cabr., Colm.).

Marbella (Clem., Wk.), Cabo de Gata, Algeciras, (Clem.).

Fuengirola (Wk.), Sanlúcar de Barrameda (Colm.)

*Portugal* (Grisl., Brot.): Tajo en la desembocadura (Brot.)

*Baleares* (Ramis, Weyler): Menorca (Ramis).

*Nombr. vulg. Cast.* Alga marina, Yerba del mar, Alga ó Broza del mar (Martras), Sargazo (Lardizab., Palau), Lenteja marina (Lardizab.), Ceiba (Barnad. padre). *Port.* Sargaço (Mont., Brot.), Sargasso, Sargasso dos mares (Brot.), Uvas marinhas (Mártras); Alga, Seba (Mont.), Salgaço (Sarm.) *Gall.* Argazo, Sargazo, Salgazo, Golfe, Golfo, Corriola, Oca, Ocle, Estrume, Ceba, Xebra (Sarm.), Cebra, Xebre (Sobreira), Argazo, Ceiba, Seba, Xebre (Cornide). *Catal.* Uvas, Cuas (Mártras).—Corresponden igualmente estos nombres á los demás sargazos, y tambien se aplican algunos de ellos á diversas algas.

**S. bacciferum Ag.** *S. littoreum* Rumph. *Herb. amb.*

*VI, t. 76, f. 2. Fucus natans L.* *F. Sargasso* Gmel. *F. bacciferus* Turn., *t. 47.*

*Hab.* Costas de España (Clem., Salcedo). (v. v.)

*Cataluña* (Texid.): Barcelona (Texid.)

*Santander* (Salcedo).

*Andalucía* (Clem., Cabr.): Cádiz (Clem., Cabr.), Sanlúcar de Barrameda (Clem. Colm.), Málaga, Algeciras (Clem.)

**S. linifolium Ag.** *Lenticula marina* Serapionis Lobelii, *Dalechampii* Grisl. *Fucus linifolius* Turn., *t. 168.* *F. acinarius* Gmel.

*Hab.* Costas de España (Quer) y Portugal (Grisl., Vand.). (v. s.)

*Galicia* (Quer): Ferrol (L. Alonso.)

*Valencia* (Lag.)

*Andalucía* (Bourg.): Cádiz (Bourg.)

*Nomb. vulg. Cast.* Lentejas de mar (F. Nav.)

#### CISTOSIREAS.

---

#### *Pycnophycus.*

**P. tuberculatus Kg.** *Fucus tuberculatus Huds. Turn.*,

*t. Engl. bot., t. 726.*

*Hab.* Costas de España (Lag., Salcedo, Lge.). (v. s.)

*Santander* (Salcedo, Lge.)

*Asturias* (Lag.): Avilés, Gijón, Artedo (Lag.)

*Galicia* (Lge.): Coruña (Lge.)

*Baleares*: Menorca (Texid.)

#### *Halidrys.*

**H. siliquosa Lyngb.** *Cystoseira siliquosa Ag. Fucus*

*VI Quer. Fucus siliquosus L. Engl. bot., t. 474. Turn.*

*t. 159.*

*Hab.* Costas septentrionales de España (Quer, L. Alonso).

(v. s.)

*Prov.* Vascongadas (Eguia).

*Galicia* (Quer, L. Alonso): Ferrol (L. Alonso).

#### *Cystosira.*

**C. barbata Ag.** *Fucus barbatus Turn., t. 250. Engl.*

*bot., t. 2170. Barr. ic. 1290, f. 1.*

*Hab.* Costas de España (Clem., Colm.). (v. v.)

*Galicia* (L. Seoane): Ferrol (L. Seoane).

*Andalucía* (Clem., Colm.): Cádiz, Puerto de Santa María (Clem.), Sanlúcar de Barrameda (Colm.)

*Var.  $\beta$  concatenata Kg.* *Fucus mucronatus Bertol. Turn.*  
*ex Clem.?* Puerto de Santa María (Clem.)

**C. paniculata Kg.** *C. discors* β *paniculata* Ag. *C. særniculata* Grev. *Harv. Phyc. brit.*, t. 122.

*Hab.* Atlántico y Mediterráneo (Ag.). (n. v.)

**C. abrotanifolia Ag.** *Fucus abrotanifolius* L. Stackh., t. 14. *Engl. bot.*, t. 2130.

*Hab.* Costas de España (Clem., Lag., Cabr.) y Portugal (Vand., Brot.). (v. s.)

*Prov.* Vascongadas (Eguía).

*Santander* (Salcedo).

*Galicia* (L. Seoane).

*Andalucia* (Clem., Cabr., Lag.): Cádiz (Cabr., Lag.), Algeciras, Cabo de Gata (Clem.)

*Portugal* (Vand., Brot.): Tajo en la desembocadura, Setubal, Cezimbra (Brot.)

*Baleares:* Menorca (Oleo).

**C. fimbriata Lamour.** *Fucus fimbriatus Desf. Flor. atl.*, t. 259, non R. Br.

*Hab.* Costas meridionales de España en Cádiz, Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda (Clem.) (v. s.)

**C. discors Ag.** *Fucus discors* L. *Engl. bot.*, t. 2131.

*Hab.* Costas de España (Clem., Cabr.). (v. s.)

*Var.* β *microcarpa* Kg. Santander (Salcedo), Galicia en el Ferrol (L. Alonso), Andalucia en Cádiz (Clem., Cabr.), Puerto de Santa María, Algeciras, Cabo de Gata (Clem.)

**C. crinita Duby.** *Fucus crinitus Desf. Barr. ic.* 1290, f. 2.

*Hab.* Costas de las Baleares (Weyl.). (n. v.)

### Phyllacantha.

**Ph. granulata Kg.** *Cystoseira granulata* Ag. *Harv. Phyc. brit.*, t. 60. *Fucus granulatus* L.

*Hab.* Costas de España (?). (n. v.)

**Ph. concatenata Kg.** *Cystoseira concatenata* Ag. *Fucus concatenatus* L.

*Hab.* Costas de España (Wk.) y Portugal (Vand., Brot.) (v. s.)

*Galicia* (Texid.): Vigo (Texid.).

*Andalucía* (Wk.): Motril (Wk.)

*Portugal* (Vand., Brot.): Tajo cerca del Paço d'Arcos (Brot.)

**Ph. fibrosa** Kg. *Cystoseira fibrosa* Ag. *Fucus X Quer.*

*Barr. ic. 1297 (mala).* *Fucus fibrosus* Huds. *Turn.*, t. 209.

*Engl. bot.*, t. 1969. *F. baccatus* Gmel. *Fuc.*, t. 3, f. 2.

*Hab.* Costas de España (Quer., Lag., Salcedo). (v. s.)

*Prov.* Vascongadas (Lge.): San Sebastian (Lge.)

*Santander* (Salcedo, Lag.).

*Asturias* (Lag.): Candás, Avilés (Lag.)

*Galicia* (Quer., Lge.): Coruña (Lge.), Villagarcia (L. Seoane).

**Ph. Myrica** Kg. *Cystoseira Myrica* Ag. *Fucus Myrica* Gmel. *Fuc.*, t. 3, f. 1. *Turn.*, t. 192.

*Hab.* Costas de Portugal y riberas del Tajo cerca del Paço d'Arcos (Brot.). (n. v.)

### Halerica.

**H. ericoides** Kg. *Cystoseira ericoides* Ag. *Ericæfolia planta supina, marina, Eleborinha* Grisl. *Fucus ericoides* L. *Turn.*, t. 191. *Engl. bot.*, t. 1968. *F. tamariscifolius* Stackh.

*Hab.* Costas de España (Lag., Clem.) y Portugal (Grisl.). (v. v.)

*Cataluña* (Texid.): costas del Ampurdan (Texid.)

*Prov.* Vascongadas (Lge.): San Sebastian (Lge.)

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.): Candás (Lag.)

*Galicia* (L. Alonso): Ferrol (L. Alonso).

*Valencia* (Cav.): Calp (Cav.)

*Andalucía* (Clem., Cabr.): Cádiz (Clem., Cabr., Colm.). Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María, Algeciras, Málaga, Marbella, Almería, Cabo de Gata (Clem.)

*Portugal* (Grisl.)

**H. amentacea** Kg. *Cystoseira amentacea* Bory. Menegh.

*Alg. ital.*, t. 2.

*Hab.* Costas de España en Málaga y Almería (Lge.).

(n. v.)

*Var. β patens Kg.* *Cystoseira amentacea β laxa Mont.*  
*Explor. Alger., t. 2, f. 1.* *Mediterráneo (Mont.)*

**H. sedoides Kg.** *Cystoseira sedoides Ag.* *Fucus sedoides Desf.*

*Hab.* Costas de las Baleares (Weyl.). (n. v.)

**H. selaginoides Kg.** *Cystoseira selaginoides Bory.* *Fucus selaginoides L. Clem.*

*Hab.* Costas de España (Clem.) y Portugal (?). (n. v.)

*Cataluña* (Texid.): costas del Ampurdan (Texid.)

*Andalucía* (Clem.): Sanlúcar de Barrameda, Rota, Puerto de Santa María, Cádiz, Tarifa, Algeciras (Clem.)

### Treptacantha.

**T. Turneri Kg.** *Fucus Abies marina Turn., t. 249.*

*Cystoseira Abies marina Ag.*

*Hab.* Costas de España en Valencia entre Calp é Hisac (Cav.). (n. v.)

### FUCEAS.

#### Ozothallia.

**O. vulgaris Dne.** *Fucus nodosus L. Turn., t. 91.*  
*Engl. bot., t. 570.* *Halydris nodosa Lyngb.* *Physocaulon nodosum Kg.*

*Hab.* Costas de España (Loeffl., Salcedo). (v. s.)

*Prov.* *Vascongadas* (Herb. Madr.): Bilbao (Herb. Madr.)  
*Santander* (Salcedo, Lag.).

*Galicia* (L. Alonso, Lge.): Ferrol (L. Alonso, Lge.)

#### Fucus.

**F. vesiculosus L.** *Fucus I et XIV Quer. Turn., t. 88.*  
*Engl. bot., t. 1056.* *Fucus inflatus L.*

*Hab.* Costas de España (Escolano, F. Nav., Quer) y Portugal (Vand., Brot.). (v. v.)

*Prov. Vascongadas* (Palau, Cav., Eguía, Wk.): Bilbao (Palau, Cav.), desembocadura del Bidasoa, ria de Bilbao (Eguía, Wk.)

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.): Gijon (Lag.)

*Galicia* (Quer): Padron, Noya (Quer), Ferrol (L. Alonso), Tuy (R. Bust.), Vigo (Lge.), Coruña (Colm., Texid.)

*Valencia* (Escolano, F. Nav.)

*Andalucía* (Escolano, F. Nav.): Gibraltar (Escolano, F. Nav., Talbot), Marbella, Conil (Clem.), Puerto de Santa María (Gutierrez), Cádiz (Cabr., Lge.), Málaga (Prol.), Sanlúcar de Barrameda (Clem.)

*Portugal* (Vand., Brot., Figueir.): toda la costa (Brot.)

*Var.  $\gamma$  spiralis Turn. Fucus spiralis L. Engl. bot., t. 1685.*

*F. vesiculosus longissimus Clem. Ens.?* Fronde vesiculosa, spirali, longissima, duas lineas lata, apicibus sterilibus, brevibus, obtusis. Clem. loc. cit. Asturias (Lag.), Galicia en el Ferrol (L. Alonso) y la Coruña (Texid.), Andalucía en Cádiz y la Isla (Clem., Lag.), entre Cádiz y el Castillo de Puntales (Wk., Bourg.), y Portugal (Vand.)

*Var.  $\epsilon$  longifructus Kg. Fucus longifructus DC. F. angustifolius With. Galicia (Quer, L. Seoane).*

*Var.  $\gamma$  cystocarpus Kg. Golfo de Vizcaya (Kg.)*

*Var.  $\iota$  Sherardi Turn. Fucus Sherardi Stackh. Ner. brit., t. 13. Atlántico (Kg.)*

*Var.  $\times$  linearis Kg. Fucus linearis Flor. Angl. F. ceranoides Esp., t. 146. F. distichus Lightf. Costas de Cantabria (?).*

*Var.  $\mu$  macrocystus Kg. Atlántico (Kg.)*

*Var.  $\nu$  monocystus Kg. Fucus divaricatus L. Brot. non R. Br. Santander (Salcedo), Asturias (Lag.), Galicia en el Ferrol (L. Alonso), Andalucía en Rota (Clem.), Cádiz (Kg.) y Portugal (Vand., Brot.)*

*Vas.  $\xi$  tricystus Kg. Costas de España (Kg.)*

*Nomb. vulg. Cast. Encina de mar ó marina (Escolano, Quer, Palau), Roble marino (F. Nav.), Sargazo vejigoso (Lag.)*

*Port. Bodelha, Carvalho marinho (Brot.), Botilhão (A. da Silveira), Sargaço vesiculoso, Botilhao vesiculoso, Carvalho do mar (Figueir.)*

**F. ceranoïdes** L. non Gmel. *Brot. Turn.*, t. 89. *Engl. bot.*, t. 215. *Fucus XIII Quer ex G. Ort. synon.*

*Hab.* Costas de España (G. Ort., Lag.) y Portugal (Vand.), (v. v.)

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.): Gijon (Lag.)

*Galicia* (G. Ort., L. Alonso): Ferrol (L. Alonso). Vigo (Texid.)

*Andalucia* (Rodr., Colm.): Sanlúcar de Barrameda, Cádiz (Rodr., Colm.)

*Portugal* (Vand.)

*Baleares*: Mallorca, Menorca en Mahon (Texid.)

**F. serratus** L. *Turn.*, t. 90. *Engl. bot.*, t. 1221. *Fucus III Quer.*

*Hab.* Costas de España (Loeffl., Quer). (v. s.)

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.): Gijon (Lag.)

*Galicia* (Quer, L. Alonso): Ferrol (L. Alonso), Coruña (Texid.), Villagarcía, Vigo (L. Seoane).

*Portugal* (Vand.)

*Nomb. vulg. Port. Sargaço* (Vand.)

**F. canaliculatus** L. *Gmel. Fuc.*, t. 1. A. f. 2. *Engl. bot.*, t. 823. *Turn.*, t. 4. *Fucus IV Quer. Fucus excisus* L. G. *Ort.*

*Hab.* Costas de España (Quer, Lag., Salcedo). (v. s.)

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.): Gijon, Candás (Salcedo).

*Galicia* (Quer, L. Alonso): Ferrol (L. Alonso, Lge., L. Seoane), Vigo (Lge.), Pontevedra, Coruña (Texid.)

*Baleares*: Menorca (Texid.)

### Himanthalia.

**H. lorea** Lyngb. *Fucus loreus* L. *Turn.*, t. 196. *Engl. bot.*, t. 569. *F. elongatus* L. *Gmel. Ulva pruniformis* Gunn.

*Hab.* Costas de España (Loeffl., Lag., Salcedo) y Portugal (Brot.). (v. s.)

*Santander* (Salcedo).

- Asturias* (Lag.): Gijon (Lag.)  
*Galicia* (L. Alonso): Ferrol (L. Alonso), Coruña (Lge.)  
*Andalucia* (Cabr.): Cádiz? (Cabr.)  
*Portugal* (Brot.): Boarcos y Figueira en Beira (Brot.)  
*Baleares*: Menorca (Ramis).  
*Nomb. vulg. Cast.* Correas (Lag.)

#### LAMINARIEAS.

---

#### Alaria.

**A. esculenta** Grev. *Aly. brit.*, t. 4. *Laminaria esculenta* Lamour. *Fucus esculentus* L. *Turn.*, t. 117. *Engl. bot.*, t. 1759.

*Hab.* Costas septentrionales y occidentales de España, y particularmente en las de Galicia (L. Seoane). (n. v.)

#### Haligenia.

**H. bulbosa** Dne. *Laminaria bulbosa* Lamour. *Fucus bulbosus* L. *Turn.*, t. 161. *Engl. bot.*, t. 1760. *F. palmatus* Gmel. *Fuc.*, t. 30. *Ulva bulbosa* DC.

*Hab.* Costas de España (Lag., Clem.). (v. s.)

*Asturias* (Lag.): Cudillero (Lag.)

*Galicia* (Lge.): Coruña (Lge.), Ferrol (L. Seoane).

*Andalucia* (Clem.): Conil, Tarifa, Algeciras (Clem.)

#### Hafgygia.

**H. digitata** Kg. *Laminaria digitata* Lamour. *Fucus IX Quer.* *Fucus digitatus* L. *Stackh.* *Ner. brit.*, t. 3. *Turn.*, t. 162. *Engl. bot.*, t. 2274. *Ulva digitata* DC.

*Hab.* Costas de España (Salv., Quer.). (v. s.)

*Prov.* Vascongadas (Eguía).

*Santander* (Salcedo).

*Galicia* (Quer, L. Alonso): Ferrol (L. Alonso).

*Andalucía* (Salv.): Cádiz, Marbella (Salv.)

*Portugal* (Brot.): desembocadura del Tajo y Algarbes (Brot.)

*Var. ♂ membranacea Kg.* *Fucus digitatus pellucidus. Clem.*  
*Flor. bæt. ined.* Fronde membranacea, laciniata, stipitata, laciniis polymorphis, stipite tereti, radice fibrosa. Clem. loc. cit. Málaga (Clem.)

### Laminaria.

**L. saccharina** Lamour. *Kg. Phyc., t. 24. I. Fucus saccharinus L. Turn., t. 163. Ulva saccharina DC.*

*Hab.* Costas de España en Galicia (Texid.), Gibraltar (Talbot) y Portugal en la desembocadura del Tajo (Brot.), (v. s.)

*Nomb. vulg. Cast.* Alga marina, Ova marina (Nebr., A. Lus., Laguna), Sargazo azucarado, Fuco azucarado (Palau).

**L. Phyllitis** Lamour. *Fucus Phyllitis Stackh. Ner. brit., t. 9. Turn., t. 164. Engl. bot., t. 1331.*

*Hab.* Costas de España (?). (n. v.)

**L. elliptica** Ag. *Mont. Expl. Alger., t. 9.*

*Var. ♂ Cabrera Mont.* Cádiz (Mont.). (n. v.)

### ESPOROCHNEAS.

### Desmarestia.

**D. viridis** Lamour. *Sporochnus viridis Ag. Fucus viridis Flor. dan., t. 886. Turn., t. 97. Engl. bot., t. 1669.*

*Hab.* Costas de España en Galicia cerca del Cabo Ortegal (L. Seoane). (n. v.)

**D. aculeata** Lamour. *Fucus aculeatus L. Turn., t. 187. Sporochnus aculeatus Ag. Fucus muscoides Gunn. Gmel. Fuc., t. 12.*

*Hab.* Costas de España (F. Nav., Lag., Salcedo). (v. v.)

*Cataluña* (Sing. de Catal.)

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.): Gijon, Candás, Concha de Arredo (Lag.)

*Andalucía* (F. Nav.): Cádiz (F. Nav., Colm.), Rota (Clem.).

*Málaga* (Prol.), Sanlúcar de Barrameda (Colm.)

*Nomb. vulg. Cast.* *Musgo marino* (Lagun.), *Almugo* (F. Nav.)

**D. pinnatinervia** Mont. *Cent. III, n.º 57, t. 7,*  
*f. 2.*

*Hab.* Costas septentrionales de España en San Sebastian (Mont.). (n. v.)

**D. ligulata** Lamour. *Sporochnus ligulatus* Ag. *Laminaria ligulata* Hook. *Fucus ligulatus* Lightf. *Flor. scot.*, *t. 29. Turn.*, *t. 98. Engl. bot.*, *t. 1636.*

*Hab.* Costas de España en Galicia cerca del Cabo Ortegal (L. Seoane). (n. v.)

### **Carpomitra.**

**C. Cabrera** Kg. *Fucus Cabrera* Turn., *t. 140. Sporochnus Cabrera* Ag.

*Hab.* Costas de España en Cádiz (Clem., Cabr.). (n. v.)

### **Sporochnus.**

**Sp. pedunculatus** Ag. *Menegh. Alg. ital.*, *t. 3. Fucus pedunculatus* Huds. *Turn.*, *t. 188. Gigartina pedunculata* Lamour.

*Hab.* Costas de España en Cádiz (Cabr.) y en el Ferrol (L. Seoane). (v. s.)

**Sp. Gaertnera** Ag. *Fucus Gaertnera* Gmel. *Fuc.*, *t. 19.*

*Hab.* Costas de España en Cádiz (Webb.). (n. v.)

## DICTIOTEAS.

## Phyllitis.

**Ph. debilis Kg.** *Laminaria debilis Ag.*

*Hab.* Atlántico y Mediterráneo (Ag.). (n. v.)

**Ph. lanceolata Kg.** *Ulva lanceolata Thore.*

*Hab.* Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

**Ph. brevipes Kg.** *Haligenia brevipes Lamour.* *Laminaria brevipes, purpurascens et reniformis Ag.* *Lamour. Ess., t. 1, f. 3.* *L. papyrina Bory.* *Fucus Phyllitis subsessilis Clem.* *Ens.*

*Hab.* Costas de España en Cádiz sobre la Encina de mar ó Sargazo vejigoso (Clem.). (n. v.)

## Zonaria.

**Z. pavonia Ag.** *Fucus pavonius L.* *F. pavoninus Vand.*

*Ulva pavonia Engl. bot., t. 1276.* *U. cucullata Cav. ex Auct. variis non ex Ic., t. 191, f. 2, e.* *Dictyota pavonia Lamour.* *Flabellaria pavonia Lamarck.* *Padina pavonia Gail.*

*Hab.* Costas de España (Salv., Cav., Lag., Clem.) y Portugal (Vand.). (v. v.)

Cataluña (Salv.): Blanes (Salv.), Cabo de Creus (Texid.)

Galicia (L. Seoane): Ferrol (L. Seoane).

Valencia (Cav., Lag.): Calp é Hifac (Cav.), Alicante (Lag.)

Andalucía (Clem.): Cádiz (Clem., Colm.), Tarifa, Algeciras, Almería (Clem.), Málaga (Clem., Prol.), Sanlúcar de Barrameda (Clem.)

Portugal (Vand.).

Baleares: Menorca (Texid.)

**Z. collaris Ag.** *Padina]collaris Grev.*

*Hab.* Costas de España en Málaga (Cabr., Lge.). (n. v.)

### Styptodium.

**St. flavum Kg.** *Zonaria flava Ag.* *Fucus flavus Clem.*  
*Ens.* *Fucus spongiosus selinoides Tournef.* *Inst., t. 536. F.*  
*Tournefortii Lamour.* *Diss., t. 26, f. 1.* *Dictyota Tournefortiana Lamour.* *Zonaria Tournefortiana Mont.*

*Hab.* Costas de España (Clem., Lag.). (v. v.)

Galicia (L. Seoane): Ferrol (L. Seoane).

Andalucia (Clem., Lag.): Sanlúcar de Barrameda (Clem., Lag., Wk., Colm.); Cádiz (Clem., Cabr., Colm.)

**St. Atomaria Kg.** *Dictyota Atomaria Grev.* *Harv.*  
*Phyc. brit., t. 1.* *Zonaria Atomaria Ag.* *Ulva Atomaria Woodw.* *Fucus zonalis Lamour.* *Diss., t. 25, f. 1.*

*Hab.* Mediterráneo (Ag.). (v. s.)

*Var.*  $\beta$  *ciliata Ag.* *Fucus pseudo-ciliatus Lamour.* *Diss., t. 25, f. 2.* *Ulva serrata DC.* *Dictyota ciliata Lamour.* *Ess.* *Ulva fastigiata Clem.* *Ens.* Cádiz (Clem., Cabr.), Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María, Algeciras (Clem.), Galicia en la ría de Ares (L. Seoane).

### Halyseris.

**H. polypodioides Ag.** *Kg.* *Phyc., t. 23.* *Dictyopteris elongata Lamour.* *Ess.* *Fucus polypodioides Lamour.* *Diss., t. 24, f. 1.* *Fucus membranaceus Stackh.* *Ner. brit., t. 6.* *Tourn., t. 87.* *Engl. bot., t. 1758.* *Fucus ambiguus Clem.* *Ens.* *Ulva polypodioides DC.* *Dictyopteris polypodioides Lamour.*

*Hab.* Costas de España (Lag., Clem.). (v. v.)

Asturias (Lag.): Gijón, La Concha (Lag.)

Andalucia (Clem., Cabr.): Cádiz (Clem., Cabr., Colm.), Rota, Puerto de Santa María, Algeciras, Almería (Clem.)

### Spatoglossum.

**Sp. Solierii Kg.** *Dictyota Solierii Chaw.* *Laminaria padinipes Bory.*

*Hab.* Mediterráneo (J. Ag.). (n. v.)

### Cutleria.

**C. adspersa** De Notar. *Padina adspersa* Grev. *Zonaria adspersa* Ag. *Ulva adspersa* Roth. Cat. III, t. 11, f. B.

*Hab.* Costas de España en Cádiz (Cabrera). (n. v.)

**C. multifida** Grev. *Alg. brit.*, t. 10. *Zonaria multifida* Ag. *Dictyota penicillata* Lamour. *D. multifida* Bory. *Ulva multifida*. Engl. bot., t. 1913.

*Hab.* Mediterráneo (Ag.). (n. v.)

### Dictyota.

**D. vulgaris** Kg. *D. dichotoma* Grev. *Alg. brit.*, t. 10, f. 1, 2, 3. *Dichophyllum vulgare* Kg. *Phyc.*, t. 22, f. II, 1-1.

*Hab.* Atlántico (Kg.) (n. v.)

*Var.*  $\beta$  *intricata* Kg. *Zonaria dichotoma*  $\beta$  *intricata* Ag. Menorca (Texid.)

**D. dichotoma** Kg. *D. dichotoma* Grev. *Alg. brit.*, t. 10, f. 5. *Zonaria dichotoma* Ag. *Ulva dichotoma* Huds.

*Hab.* Costas de España (Lag., Clem.). (v. v.)

Asturias (Lag.): Gijon, Artedo (Lag.), Vigo (Texid.)

Galicia (L. Seoane): Ferrol (L. Seoane).

Andalucía (Clem.): Sanlúcar de Barrameda, Conil, Algeciras (Clem.), Cádiz (Clem., Cabr., Colm.)

Baleares: Menorca (Texid.)

*Var.*  $\beta$  *recisa*. *Ulva recisa* Poir. Costas de Portugal (Beauv.)

**D. ligulata** Kg.

*Hab.* Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

**D. repens** J. Ag.

*Hab.* Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

**D. implexa** Lamour. *Del. Flor. ægypt.*, t. 56, f. 2.

*Hab.* Costas de España (Lge.). (n. v.)

Prov. Vascongadas (Lge.): San Sebastian (Lge.)

Andalucía (Lge.): Málaga, Almería (Lge.)

**D. Fasciola Lamour.** *Zonaria Fasciola* Ag. *Fucus Fasciola* Roth. *Cat. I. t. 7, f. 1.* *Fucus linearis* Forsk. ex Ag.

Hab. Costas de España en la Coruña (Lge.). (n. v.)

**D. linearis Grev.** *Zonaria linearis* Ag.

Hab. Costas de España (Wk., Lge.). (n. v.)

*Galicia* (Lge.) *Coruña* (Lge.)

*Andalucia* (Wk.): Cádiz, La Cortadura (Wk.)

#### ENCELIEAS.

---

#### Striaria.

**St. attenuata Grev.** *Harv. Phyc. brit.*, t. 25. *Solenia attenuata* Ag. *Zonaria lineolata* Ag. *Ic.*, t. 40. *Ulva attenuata* Nacc. *Dictyota lineolata* Grev.

Var.  $\beta$  *crinita* Kg. *Striaria crinita* J. Ag. *Solenia crinita* C. Ag. *Conserva crinita* Ruch.

Hab. Costas de toda Europa (Ag.). (n. v.)

#### Encœlium.

**E. echinatum Ag.** *Asperococcus rugosus* Lamour. *A. fistulosus* Hook. *A. echinatus* Grev. *Ulva rugosa* DC.

Hab. Atlántico (Ag.). (n. v.)

**E. bullosum Ag.** Kg. *Phyc.*, t. 21, f. 1. *Asperococcus bullosus* Lamour. *Ess.*, t. 6, f. 5. *A. Turneri* Hook. *Harv. Phyc. brit.*, t. 11. *Ulva Turneri*. *Engl. bot.*, t. 2570.

Hab. Atlántico (Ag.). (n. v.)

**E. sinuosum Ag.** *Asperococcus sinuosus* Bory. *Ulva sinuosa* Roth. *Tremella rugosula et cerina* Clem. *Ens.*

Hab. Costas de España en Cádiz (Clem.). (v. s.)

## CORDEAS.

## Spermatochnus.

**Sp. rhizodes Kg.** *Sporochnus rhizodes* Ag. *Chordaria rhizodes* Lyngb. *Hydr.*, t. 13. *Stilophora rhizodes* J. Ag. *Harv. Phyc. brit.*, t. 70. *Ceramium tuberculatum* Roth.

*Hab.* Costas de España en Galicia (L. Seoane). (n. v.)

**Sp. papillosum Kg.** *Zonaria papillosa* Ag. *Dictyota papillosa* Lamour. *Stilophora adriatica* Menegh. *Alg. ital.*, t. 3, f. 2.

*Hab.* Costas de las Baleares en Menorca (Texid.). (n. v.)

## Chorda.

**Ch. Filum Lamour.** *Grev. Alg. brit.*, t. 5. *Fucus Filum* L. Turn., t. 88. *Engl. bot.*, t. 2487. *Ceramium Filum* Roth. *Fucus Tendo Esp. Fuc.*, t. 22.

*Hab.* Costas de España (F. Nav., Lag.). (v. s.)

Asturias (Lag.): Gijon (Lag.)

Galicia (R. Bust.)

Andalucía (Lag.): Cabo de Gata (Lag.)

Baleares: Menorca (Ramis).

Nomb. *vulg.* Cast. Alga de muelles (F. Nav.)

Var.  $\delta$  *fistulosa* Kg. *Ulva fistulosa* Huds. *Engl. bot.*, t. 642.

*U. simplicissima*. Clem. *Ens. ex Ag. Conserva fistula* Roth. *Scytophion fistulosum* Ag. Costas de Asturias (Lag.), Galicia (L. Seoane), Andalucía en Sanlúcar de Barrameda, Rota, Puerto de Santa María, Cádiz (Clem.) y Baleares en Menorca é Ibiza (Texid.).

## MESOGLEACEAS.

## Chordaria.

**Ch. flagelliformis Ag.** *Gigartina flagelliformis* Lamour. *Fucus flagelliformis* Turn., t. 85. Engl. bot., t. 1222. *F. longissimus* Stackh.

*Hab.* Costas de España en la Isla de Leon, Cádiz, Puerto-Real (Clem.). (n. v.)

## Mesogloea.

**M. vermicularis Ag.** *Rivularia vermicularis*. Engl. bot., t. 1818. *Chætophora vermicularis* Hook.

*Hab.* Atlántico y Mediterráneo (J. Ag.). (n. v.)

## Leathesia.

**L. marina Endl.** *Nostoc marinum et mesentericum* Ag. *Tremella difformis* L. ex L. Alonso. *Clavaria Nostoc* Bory. *Chætophora marina* Lngb. Hydr., t. 66. *Rivularia tuberifor-mis*. Engl. bot., t. 1956.

*Hab.* Costas de España en el Ferrol (L. Alonso) y en Cádiz (Colm.). (v. v.)

## LIAGOREAS.

## Liagora.

**L. distenta Lamour.** *Fucus distentus* Mertens in Roth. Cat. III, t. 2. *F. lichenoides* Desf.

*Hab.* Costas de España en el Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

**L. viscosa Ag.** *Fucus viscidus* Forsk. Turn., t. 119.

*Liagora ceranoides* Lamour.

*Hab.* Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

**L. versicolor** Lamour. *L. complanata* Ag. *Fucus lichenoides* Esper. *Fuc.*, t. 50.

Var.  $\beta$  *ramellifera* Kg. *Liagora versicolor* A. Lamour. *Fucus canalicularioides* Clem. *Ens.?* Fronde compressa, ramosissimo-corymbosa, ramis sparsis, superne dichotomis. Clem. loc., cit. Sanlúcar de Barrameda, Rota (Clem.), Cádiz (Clem., Cabr.)

#### BATRACOSPERMEAS.

---

#### Batrachospermum.

**B. moniliforme** Roth. *Conferva gelatinosa* L. Dillw., t. 32. *Chara gelatinosa* Roth.

Hab. España (Clem., Hæns.) en las aguas claras y frias.  
(v. v.)

Cataluña (Colm.)

Aragon (Pardo, Loscos): Alcañiz, Castelserás (Pardo, Loscos).

Galicia (L. Seoane).

Valencia (Clem.): Titáguas (Clem.)

Andalucía (Clem., Hæns.): Carratraca (Hæns.)

Nomb. *vulg.* Cast. Barba de mula (Clem.)

Var.  $\beta$  *Boryanum* Ag. *Batrachospermum moniliforme*

Vauch. *Conf.*, t. 11, f. 1, 3. Valencia en Titáguas (Clem.).

Cast. Barba de mula (Clem.)

#### QUETOFOREAS.

---

#### Thorea.

**T. ramosissima** Bory. Ann. *Conferva hirsuta* Thore. *C. flexuosa* Bory it., t. 2, *Batrachospermum hispidum* DC. *Thorea hispida* Desv.

*Hab.* España en Galicia cerca de Cuntis en los riachuelos (L. Seoane). (n. v.)

### Chætophora.

**Ch. endiviæfolia** Ag. *Lyngb.*, t. 65. *Rivularia endiviæfolia* Roth. *Batrachospermum fasciculatum* Vauch., t. 113, f. 1, 2. *Tremella palmata* Hedw.

*Hab.* Toda Europa en las acequias (Kg.). (n. v.)

### LEMANIEAS.

#### Lemania.

**L. fluviatilis** Ag. *Conferva fluviatilis* Dillw., t. 7, f. 47. Linn. *Polysperma fluviatilis* Vauch. *Conf.*, t. 1, f. 3. *Chantransia fluviatilis* DC.

*Hab.* España en Cataluña (E. Bout.), Aragon (Pardo, Loscos), Galicia (L. Seoane), Andalucía (Clem.) y demás provincias sobre las piedras y leños en los ríos y riachuelos. (v. v.)

*Nomb. vulg.* Cast. Alga de río. (Palau.)

### CARACEAS.

#### Chara.

##### **Ch. gymnochilla** A. Braun.

*Hab.* España en los charcos y regueras en el Dornajo de la Sierra-Nevada (Wk.) y en Málaga (Lge.). May. (n. v.)

**Ch. aspera** Willd. *Ch. hispida* Wahlenb. Linn. pro parte. *Ch. aspera et fallax* Ag.

*Hab.* España en Almería en los charcos de agua salada (Lge.). May., Jun. (n. v.)

*Var. ξ capillacea Kg.* Pozos del Mezquin en Aragon (Pardo, Loscos).

*Ch. fragilis Desv.* *Ch. vulgaris L. et Auct. pro parte,*  
*Ch. Hedwigii Ag.* *Ch. hirta Meyer.*

*Hab.* España cerca de Santander (Lge.) en las aguas poco corrientes. May., Jun. (v. s.)

*Var. η tuberculifera A. Braun.* Galicia en la laguna de Doñinos (Lge.)

*Ch. vulgaris Wallr.* *Equisetum VI Quer.* *Ch. fætida A. Braun.*

*Hab.* España (Loeffl., Quer) y Portugal (Brot.) en las aguas de lento curso en muchas provincias, llegando en las orientales á la altura de 5.000' (Wk.). May., Jun. (v. v.)

*Cataluña* (E. Bout., Colm.): Monserrat (E. Bout.)

*Aragon* (Asso); Zaragoza en el riachuelo de la Guerba (Asso), Villarluengo (Xarne.)

*Santander* (Lge.)

*Asturias* (Dur.): Gijon (Dur.)

*Castilla la Vieja* (M. P. Ming.): Valladolid (M. P. Ming.)

*Castilla la Nueva* (Quer, Palau): circuito de Madrid (Quer, Palau, P. de Escob.), Soto de Migas-Calientes hacia el Puente-Verde, vega de San Fernando y Ribas (Quer), Aranjuez (Colm.)

*Valencia* (Cav., Clem.): Titáguas (Clem.)

*Andalucia* (Clem., Hæns.): Málaga (Clem., Hæns., Prol., Boiss.), Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María, Sorbas (Clem.), Carratraca (Hæns.)

*Portugal* (Brot.): Serra da Arrabida, costa da Trasaria, cercanías de Coimbra en la Quinta das Lágrimas (Brot.)

*Var. δ subhispida A. Braun.* Sierra de Chiva en la fuente de Boquiva 'del monte de Santa María, á la altura de 5.000' (Wk.)

*Nomb. vulg. Val.* Asprella, Esprella, Borró, Asprella pendula (Cav.)

*Ch. hispida L.* *Ch. spinosa Ruprecht.* *Ch. hispida et tomentosa Willd.*

*Hab.* España (Wk., L. P. Ming.) en las acequias y charcos de varias provincias. May., Jun. (v. v.)

- Cataluña* (Texid.): Gerona (Texid.)  
*Aragon* (Pardo, Loscos).  
*Castilla la Vieja* (M. P. Ming.): Valladolid (M. P. Ming.)  
*Valencia* (Wk.).  
*Murcia* (Palau): Hellin (Palau, Cav.)  
*Baleares*: Ibiza (Camb.)  
*Var. r. longe hirsuta* A. Braun. Albufera de Valencia  
(Wk.) Val. Asprella (Wk.)

### Nitella.

#### **N. flexilis Ag.** *Chara flexilis L.*

*Hab.* España en las aguas de lento curso cerca de Madrid (Colm.) May. (v. v.)

*Var. β glomerulifera Kg.* *Chara glomerulifera A. Braun.*  
Toda Europa (Kg.)

**N. hyalina Kg.** *Chara hyalina DC.* *Ch. pellucida*  
*Ducros.*

*Hab.* España en la Albufera de Valencia (Wk.) y en Aragón en el Guadaloce (Pardo, Loscos). May. (n. v.)

### VALONIEAS.

---

#### Acetabularia.

**A. mediterranea Lamour.** *Tubularia Acetabulum*  
*Gmel.* *Corallina Acetabulum Cav.*

*Hab.* España en Valencia cerca de Calp (Cav.). (v. s.)

#### Dasycladus.

**D. clavæformis Ag.** *Kg. Phyc., t. 40, f. 1,* *Cladostephus clavæformis Ag.* *Conferva clavæformis Roth.*

*Hab.* Mediterráneo (Ag.). (n. v.)

### Ascothamnion.

**A. intricatum Kg.** *Valonia intricata* Ag. *Ulva intricata* Clem. *Ens.* *U. conspurcata* Clem. *Flor.* bæt. ined.

*Hab.* Costas de España en Cádiz (Clem., Cabr., Bourg.), muelle de Málaga (Clem.), Cabo de Gata (Lag.). (n. v.)

### Valonia.

**V. utricularis Ag.** *Conserva utricularis* Roth. *Cat. I.* t. 1, f. 1.

*Hab.* Costas meridionales de España (Kg.). (n. v.)

### CODIEAS.

### Espera.

**E. mediterranea Dne.**

*Hab.* Mediterráneo (Dne.). (n. v.)

### Halimeda.

**H. Opuntia Lamour.** *Exp.*, t. 20, f. 6. *Flavellaria Opuntia Lamarck.* *Corallina Opuntia Ell. et Sol.*, t. 20, b. *Kg. Phyc.*, t. 43, II.

*Hab.* Atlántico y Mediterráneo (Lamarck.). (n. v.)

### Udotea.

**U. Desfontainii Dne.** *Flavellaria Desfontainii Lamour.* *Ess.*, t. 6, f. 4. *Codium membranaceum* Ag. *Conserva flavelliformis Desf.* *Ulva flavelliformis* Wulf.

*Hab.* Mediterráneo (Ag.). (n. v.)

## Codium.

**C. tomentosum** Ag. *Spongodium dichotomum* Lamour. *Ulva tomentosa* DC. *Fucus tomentosus* Huds. Turn., t. 135. Engl. bot., t. 712. *Agardhia dichotoma* Cabr.

Hab. Costas de España (Clem., Cabr.). (v. v.)

Cataluña (Colm.)

Santander (Salcedo).

Asturias (Lag.): Candás (Lag.)

Galicia (Lge.): Coruña (Lge.)

Andalucia (Clem., Lge.): Cádiz (Clem., Lge., Colm.), Castillo de San Pedro cerca de Cádiz (Clem., Cabr.), Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María, Tarifa, Algeciras, Málaga (Clem.)

Baleares: Menorca (Oleo).

Var.  $\gamma$  *divaricatum* Kg. *Fucus textilis* Clem. Ens. Fronde ex fibrillis contexta, tenaci, stipitata, stipite tereti in folia cu-neiformia dilatato, fibrillis ad apicem solutis. Clem. loc. cit. Cádiz (Clem., Lge.)

Var.  $\delta$  *gracile* Kg. *Fucus tomentosus fastigiatus* Clem.

Flor. bæt. ined. Málaga (Clem.)

Var.  $\epsilon$  *implicatum* Ag. Cádiz (Kg.)

**C. elongatum** Ag. Mont. Expl. Alger., t. 13, f. 1.

*Ulva decorticata* Woodw. Linn.

Hab. Costas de España en San Sebastian (Bory), y en Cádiz (Cabr., Monnard, Bedeau). (v. v.)

Var.  $\alpha$  *axillare* Bory. *Agardhia areolata* Cabr. Cádiz, (Cabr.)

**C. lineare** Ag. *Agardhia ramentacea* Cabr.

Hab. Costas de España en Cádiz (Cabr.). (n. v.)

**C. adhærens** Ag. Harv. *Phyc. brit.*, t. 35. A. *Spongodium adhærens* Lenormand. *Codium difforme* Kg.

Hab. Costas de España en Cádiz sobre las conchas y coralinas (Monnard). (n. v.)

**C. Bursa** Ag. *Spongodium Bursa* Lamour. *Agardhia Bursa* Cabr. *Fucus Bursa* Turn., t. 136. Engl. bot., t. 2183. *F. subglobosus* Clem. Flor. bæt. ined.

- Hab.* Costas de España (Clem., Wk.). (v. v.)  
*Cataluña* (Colm.)  
*Andalucia* (Clem., Wk.): Rota, Cádiz, Málaga (Clem.),  
 Cádiz cerca de la Cortadura (Wk., Colm.)  
*Nomb. vulg. Cast.* Alocas (Clem.)

#### CAULERPEAS.

---

#### Phyllerpa.

- Ph. flagelliformis Kg.** *Caulerpa flagelliformis* Ag.  
*C. filiformis* Hering.  
*Hab.* Costas de España en Cádiz (Spr. Kg.). (n. v.)  
**Ph. prolifera Kg.** *Fucus prolifer* Forsk. *F. Ophio-*  
*glossum* Web. et Mohr. *Turn.*, t. 58. *Ulva repens* Clem. *Ens.*  
*U. prolifera* DC. *Caulerpa prolifera* Lamour.  
*Hab.* Costas de España (Clem., Lag.). (v. v.)  
*Valencia* (Lag.): Alicante (Lag.)  
*Andalucia* (Clem.): Cádiz (Clem., Cabr., Colm., Bourg.),  
 Rota, Tarifa, Algeciras, Málaga (Clem.), Castillo de Puntales  
 (Wk.), Almería (Lge.)  
*Var.  $\gamma$  concatenata Kg.* Málaga (Frölich).  
*Nomb. vulg. Cast.* Laurel de mar (Clem.)

#### VAUCHERIEAS.

---

#### Bryopsis.

- B. tenuissima Moris.** *Vaucheria marina* Lyngb.,  
 t. 22.  
*Hab.* Costas de España (?) é Islas Baleares en Mallorca  
 (Texid.). (n. v.)  
**B. corymbosa J. Ag.**  
*Hab.* Mediterráneo (J. Ag.). (n. v.)

**B. cupressoides** Lamour. *Mem.*, t. 1, f. 3.

*Hab.* Mediterráneo (J. Ag.). (n. v.)

**B. muscosa** Lamour. *Ulva muscoides* Clem. *Ens.*?

Fronde tereti, tubulosa, ramosa, implexa, viridi; ramis sparsis, elongatis, patentibus, ramulis capillaribus. Clem. loc. cit.

*Hab.* Costas de España en Málaga (Lge.), Cádiz (Clem., Cabr.), Tarifa, Algeciras (Clem.). (n. v.)

**B. myura** J. Ag. *B. Petrerii* Menegh.

*Hab.* Mediterráneo (J. Ag.). (n. v.)

**B. plumosa** Huds.

*Hab.* Atlántico (J. Ag.). (n. v.)

### Vaucheria.

**V. dichotoma** Lyngb. *Hydr.*, t. 19. *Conferva dichotoma* L. *Dillw.*, t. 15. *Engl. bot.*, t. 932.

*Hab.* Toda Europa en las regueras y charcos de agua dulce (Kg.), y en España cerca de Tuy en Galicia (L. Seoane). (v. s.)

**V. Dillwynii** Ag. *Kg. Phyc.*, t. 15, f. 4. *Conferva frigida* Dillw., t. 16.

*Hab.* Toda Europa principalmente en las huertas sobre la tierra (Kg.). (n. v.)

**V. sessilis** Lyngb., t. 22. *Ectosperma sessilis* Vauch., t. 2, f. 7.

*Hab.* Toda Europa en las regueras y charcos de agua dulce (Kg.), y en España cerca de Tuy en Galicia (L. Seoane). (n. v.)

**V. geminata** Engl. *bot.*, t. 1766. *Ectosperma geminata* Vauch., t. 2, f. 5.

*Hab.* España en Galicia cerca de Betanzos (L. Seoane) en las aguas estancadas. (n. v.)

**V. cespitosa** Ag. Lyngb., t. 23. *Ectosperma cespitosa* Vauch., t. 2, f. 4. *Conferva canalicularis* L. *C. fontinalis* Blumenb.

*Hab.* España en Cataluña (E. Bont.) Aragon (Xarne) y demás provincias en las fuentes y acueductos. (n. v.)

**V. terrestris Ag.** *Ectosperma terrestris* Vauch. Conf., t. 2, f. 3. *Lyngb.*, t. 21. *Vaucheria frigida* Ag. *Byssus velutina* Asso? *Brot.*?

*Hab.* España (Asso?) y Portugal (Brot.) sobre la tierra húmeda (v. v.)

*Aragon* (Asso?) *Tronchon* (Asso?)

*Galicia* (L. Seoane): *Ferrol* (L. Seoane).

*Castilla la Nueva* (Lag.): Madrid dentro del Jardín botánico (Lag.)

*Portugal* (Brot.?): cercanías de Coimbra (Brot.?)

**V. racemosa Lyngb.**; t. 23. *Ectosperma racemosa* Vauch. Conf., t. 3, f. 8. *Vaucheria multicornis* Ag. *Ectosperma multicornis* Vauch. Conf., t. 3, f. 9. *Conferva amphibia* Brot.?

*Hab.* Toda Europa en las regueras y charcos de agua dulce y sobre la tierra húmeda en las huertas (Kg.), y en sitios sombríos más ó menos aguanosos en Portugal (Brot.?). (n. v.)

### Botrydium.

**B. argillaceum Wallr.** *Ulva granulata* L. Sp. *U. sphaerica aggregata* L. *Flor. suec.* *Tremella granulata* Huds. *Vaucheria granulata* Ag. *Hydrogastrum granulatum* Desv. *Botrydium granulatum* Grev. Br. *Alg.*, t. 19. *Byssus granulata* L. ex Lag.?

*Hab.* Toda Europa en las regueras y charcos desecados sobre terrenos arcillosos (Kg.), y en España cerca de Tuy en Galicia (L. Seoane). (v. s.)

### DIPLOSTROMIEAS.

---

### Phycolapathum.

**Ph. plantagineum Kg.** *Ulva plantaginea* Roth. *Punctaria plantaginea* Grev. *Alg. brit.*, t. 9. *Ulva calendulæfolia* Gmel.

*Hab.* Costas de España en Alicante (Clem.) é Islas Baleares en Mallorca (Texid.) (v. s.)

#### ENTEROMORFEAS.

---

#### Enteromorpha.

**E. intestinalis** Link. *Solenia intestinalis* Ag. *Ulva intestinalis* L. *Fistularia intestinalis* Grev. *Conserva intestinalis* Roth.

*Hab.* Costas de España (Cav., Lag.) y Portugal (Brot.).  
(v. v.)

*Cataluña* (Colm.)

*Prov.* *Vascongadas* (Wk.): *Fuenterrabía* (Wk.)

*Asturias* (Lag.): *Gijon* (Lag.)

*Galicia* (L. Alonso): *Ferrol* (L. Alonso), *Vigo* (L. Seoane).

*Valencia* (Cav., Lag.): *Calp* é *Hifac* (Cav.), *Alicante* (Lag.), *Albufera de Valencia* (Wk.)

*Andalucía* (Clem.): *Cádiz*, *Tarifa*, *Algeciras* (Clem.)

*Portugal* (Brot.)

*Baleares*: *Menorca* (Hern., Camb., Oleo)

**E. ramulosa** Hook. *Ulva ramulosa* Engl. bot., t. 2137.  
*U. uncinata* Mohr. *U. confervoides* Lamour. *Solenia clathrata uncinata* Ag.

*Hab.* Costas de España en el Ferrol (Lge.). (n. v.)

**E. paradoxa** Kg. *Conserva paradoxa* Dillw., t. F. Engl. bot., t. 2328.

*Hab.* Atlántico y Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

**E. divaricata?** *Ulva divaricata* Clem. *Ens.* Fronde gelatinosa, tenerrima, subtereti, tubulosa, ramosa; ramis irregulariter subtripinnatis, pinnis primariis crebris, secundariis distantibus, apicibus obtusis. Clem. loc. cit.

*Hab.* Costas de España en Cádiz? (Clem., Lag.) y Algeciras (Clem.). (n. v.)

**E. compressa** Grev. *Ulva compressa* L. *Conserva compressa* Roth.

*Hab.* Costas de España (Clem., Lag.). (v. v.)

*Cataluña* (Colm.)

*Prov.* Vascongadas (Eguía).

*Asturias* (Lag.): Gijon (Lag.)

*Galicia* (Lge.): Coruña (Lge.), Ferrol (L. Seoane).

*Valencia* (Lag.): Alicante (Lag.)

*Andalucia* (Clem., Lag.): Tarifa, Algeciras (Clem.), Cádiz (Cabr., Lag., Colm.). Sanlúcar de Barrameda, Promontorio de San Sebastian cerca de Cádiz (Wk.)

*Baleares*: Menorca (Hern., Camb., Oleo).

**E. complanata Kg.** *Ulva compressa Auct.*

*Hab.* Costas de toda Europa (Kg.). (v. s.)

*Var. β crista Kg.*

*Var. γ crinita Kg.* *Enteromorpha littorea Suhr.*

### Phycoseris.

**Ph. Linza Kg.** *Fucus XII Quer.* *Ulva Linza L.* *Solenia Linza Ag.*

*Hab.* Costas de España (Quer., L. Alonso) y Portugal (Brot.). (v. v.)

*Cataluña* (Cav.): Barcelona (Cav.)

*Galicia* (Quer., L. Alonso): Ferrol (L. Alonso), Coruña Vigo (Texid.)

*Andalucia* (Clem.): Cádiz (Clem., Colm.)

*Portugal* (Brot.): Tajo en la desembocadura (Brot.)

**Ph. lanceolata Kg.** *Ulva lanceolata L.* *U. Linza Harv.*, *Phyc. brit.*, t. 39.

*Hab.* Costas de España en Barcelona, Tarragona (Texid.), el Ferrol (L. Alonso) y Cádiz (Clem.). (v. s.)

**Ph. crispata Kg.** *Ulva crispata Bertol.* *U. Bertolonii J. Ag.*

*Hab.* Mediterráneo (Bertol.) y Atlántico en Galicia? (L. Seoane). (n. v.)

**Ph. rigida Ag.** *Ulva rigida Ag.*

*Hab.* Costas de España (Lge.). (n. v.)

*Prov.* Vascongadas (Lge.)

*Galicia* (Lge.)

*Andalucía* (Lge.): Málaga, Almería (Lge.)

**Ph. fasciata** Mont. *Ulva fasciata* Delile. *U. divisa* Suhr. *U. nematoidea* Bory.

*Hab.* Mediterráneo (Mont.). (n. v.)

#### ULVACEAS.

##### **Ulva.**

**U. Lactuca** L. *Lichen maritimus* sive *Lactuca maritima* C. Bauhini, *Lobelii*, Grisl. *Fucus II* Quer.

*Hab.* Costas de España (Quer, Lag., Clem.) y Portugal (Grisl., Vand.). (v. v.)

*Cataluña* (Colm., Texid.)

*Santander* (Salcedo).

*Asturias* (Lag.): Gijon, Candás, Concha de Arredo (Lag.)

*Galicia* (L. Alonso): Ferrol (L. Alonso), Coruña (Texid.)

*Valencia* (Lag.): Alicante (Lag.)

*Andalucía* (Clem., Cabr.): Cádiz (Clem., Cabr., Colm.), Sanlúcar de Barrameda, Tarifa, Algeciras (Clem.), Málaga (Prol., Hæns.), Promontorio de San Sebastian cerca de Cádiz (Wk.)

*Portugal* (Grisl., Vand.).

*Baleares* (Camb., Oleo): Menorca (Oleo).

*Nomb. vulg. Cast.* Lechuga de mar (Quer), Lechuguilla de mar (Prol.), Alga sensitiva (Bassag.) *Port.* Alfase marinha (Brot.)

**U. obscura** Kg.

*Hab.* Golfo de Vizcaya sobre otras algas (Kg.). (n. v.)

**U. latissima** Kg. *Phyc.*, t. 20, f. 4.

*Hab.* Costas de España en Cádiz (Clem.) y Portugal (Brot.). (v. v.)

*Nomb. vulg. Cast.* Lechuga de mar (Quer). *Port.* Alfase marinha (Brot.)

**Prasiola.**

**P. crispa Kg.** *Ulva crispa* Lightf.

*Hab.* España en Galicia cerca del Ferrol sobre la tierra húmeda (L. Seoane). (n. v.)

**ECTOCARPEAS.****Cladostephus.**

**C. Myriophyllum Ag. Kg.** *Phyc.*, t. 18, f. 1. *Cladostephus verticillatus* Lyngb., t. 30, f. B. *Ceramium verticillatum* DC. *Fucus verticillatus* Wulf. *Conserva verticillata* Lightf. Dillw., t. 53. *Engl. bot.*, t. 1718 et 2427, f. 2.

*Hab.* Costas de España (Lag., Clem.). (v. v.)

Asturias (Lag.): Gijon, Concha de Artedo (Lag.)

Galicia (L. Seoane): Ferrol, Coruña (L. Seoane).

Andalucia (Clem., Lag.): Castel de Ferro, Adra (Clem., Lag.), Cádiz (Clem., Cabr., Colm.), Sanlúcar de Barrameda (Clem., Wk., Colm.), Rota, Conil, Tarifa (Clem.), Chipiona (Wk.)

**C. spongiosus Ag.** *Ceramium spongiosum* DC. *Conserva spongiosa* Lightf. Roth. Dillw., t. 42. *Engl. bot.*, t. 2427, f. 1. *Fucus hirsutus* L.

*Hab.* Costas de España (Clem.). (v. v.)

Valencia (Lag.): Alicante (Lag.)

Andalucia (Clem., Colm.): Cádiz (Clem., Colm.), Sanlúcar de Barrameda, Conil, Tarifa, Málaga (Clem.)

**C. tomentosus Kg.**

*Hab.* Costas de España en Cádiz (Kg.). (n. v.)

**Chætopterus.**

**Ch. plumosa Kg.** *Sphaelaria plumosa* Lyngb., t. 30.

*C. Harv.* *Phyc. brit.*, t. 87. *Ceramium pennatum* Flor. dan., t. 1481. *Conserva pennata* Engl. *bot.*, t. 2330, fig. media.

*Hab.* Costas de España en el Ferrol (L. Seoane). (n. v.)

### Stylocaulon.

**S. scoparium** Kg. *Phyc.*, t. 18, II. *Sphacelaria scoparia* Lyngb., t. 31. *Ceramium scoparium* Roth, *Conserua scoparia* L. Dillw., t. 52. *Engl. bot.*, t. 1552.

*Hab.* Costas de España (Lag., Clem.). (n. v.)

*Cataluña* (Colm.)

*Prov.* Vascongadas (Eguía, Lge.): San Sebastian (Lge.)  
Santander (Salcedo).

*Asturias* (Lag.): Avilés, Gijón, (Lag.)

*Galicia* (L. Seoane): Vigo (L. Seoane).

*Andalucia* (Clem., Cabr.): Cádiz (Clem., Cabr., Colm., Bourg., Lge.), Sanlúcar de Barrameda (Clem., Wk.), Conil, Tarifa, Algeciras, Málaga (Clem.), Almería (Lge.)

*Baleares*: Mallorca, Menorca (Texid.).

### Sphacelaria.

**Sph. pennata** Lyngb. *Hydr.*, t. 31. *Conserva pennata* Dillw., t. 86. B.

*Hab.* Costas de España en Galicia (L. Seoane) é Islas Baleares en Menorca (Texid.). (n. v.)

### Halopteris.

**H. filicina** Kg. *Sphacelaria filicina* Ag. *Harv. Phyc. brit.*, t. 142. *Ceramium filicinum* Gratel.

*Hab.* Atlántico y Mediterráneo (Ag.). (n. v.)

### Spongonema.

**Sp. tomentosum** Kg. *Ectocarpus tomentosus* Lyngb., t. 44. *Conserva tomentosa* Lightf. Dillw., t. 56. *Ceramium tomentosum* Ag.

*Hab.* Costas de España en el Ferrol (L. Seoane). (n. v.)

### Ectocarpus.

#### **E. secundus Kg.**

*Hab.* Golfo de Vizcaya (Kg.) (n. v.)

#### **E. rufulus Kg.**

*Hab.* Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

#### **E. radiciformis Kg.**

*Hab.* Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

#### **E. littoralis Ag.** *Conserva littoralis* Dill., t. 31.

*Hab.* Costas de España (Lag., L. Alonso) y Portugal (Vand.). (v. s.)

*Prov.* Vascongadas (Eguía).

Asturias (Lag.): Gijon, Candás (Lag.)

Galicia (L. Alonso): Ferrol (L. Alonso).

Andalucia (Prol.): Málaga (Prol.)

Portugal (Vand.)

### HIDRODICTIEAS.

### Hydrodictyon.

#### **H. utriculatum Roth.** *H. pentagonum* Vauch., t. 9.

f. 1-6. *Conserva reticulata* Pluk. *Phyt.*, t. 24, f. 2. Dillw., t. 4.

*Hab.* España (F. Nav., E. Bout., Clem.) y Portugal (Brot.) en las aguas tranquilas ó corrientes (v. v.)

Cataluña (E. Bout.)

Galicia (L. Seoane): laguna de Doñinos (L. Seoane).

Andalucia (Clem.): Cádiz (Clem.)

Portugal (Brot.): márgenes del Mondego (Brot.)

Nomb. vulg. Cast. Telarañas de agua (F. Nav.)

## ZIGNEMACEAS.

## Zygogonium.

**Z. ericetorum Kg.** *Conferva ericetorum* Dillw.

*Hab.* España en Galicia entre el Porriño y Tuy (Lge.) en sitios húmedos (n. v.)

**Z. lutescens Kg.** *Conjugata lutescens* Vauch., t. 6, f. 3.

*Conferva bulbosa L.*

*Hab.* España en el Monserrat de Cataluña (E. Bout.) y Portugal (Vand., Brot.) en las aguas. (n. v.)

## Zygnema.

**Z. cruciatum Ag.** *Kg.* *Phyc.*, t. 15, f. 2. *Conjugata cruciata* Vauch., t. 6, f. 4.

*Hab.* Toda Europa en los charcos y acequias (Kg.). (n. v.)

## Spirogyra.

**Sp. elongata Kg.** *Zygnema elongatum* Berk. *Glean.*, t. 12, f. 2.

*Hab.* España en Galicia en la laguna de Doñinos (L. Seoane). (n. v.)

**Sp. decimina Kg.** *Zygnema deciminum* Ag. *Conferva decimina* Müll.

*Hab.* Toda Europa en las aguas tranquilas (Kg.). (n. v.)

**Sp. adnata Kg.** *Conjugata adnata* Vauch., t. 5, f. 4.

*Zygnema adnatum* Ag.

*Hab.* Toda Europa en los ríos y riachuelos, libre y sobre las piedras (Kg.). (n. v.)

**Sp. majuscula Kg.**

*Hab.* España en Aragón cerca de Castelserás (Pardo, Loscos). (n. v.)

### Staurospermum.

**S. cœrulescens Kg.** *Conferva cœrulescens Engl. bot., t. 2457. Mongeotia cœrulescens Ag. Conferva alpina Bory.*

*Hab.* España en los Borreguiles de la Sierra-Nevada (Bory). (n. v.)

### Mongeotia.

**M. genuflexa Ag.** *Syst. Conferva genuflexa Roth. Dillw., t. 6. Conjugata angulata Vauch., t. 8, f. 1-6. Zygnuma genuflexum Ag. Lyngb., t. 58.*

*Hab.* Toda Europa en los charcos (Kg.). (n. v.)

**M. compressa Ag.** *Zygnuma compressum Lyngb., t. 58.*

*Hab.* España en Galicia en la laguna de Doñinos (L. Seoane). (n. v.)

**M. gracilis Kg.** *M. genuflexa Kg. Alg. Dec.*

*Hab.* Toda Europa en los charcos (Kg.). (n. v.)

### CONFERVEAS.

---

### Chroolepus.

**Ch. aureum Kg.** *Ectocarpus aureus Lyngb., t. 44. Conferva aurea Dillw., t. 35. Byssus aurea L. Engl. bot., t. 212.*

*Hab.* España (Colm.) y Portugal en Beira, entre Duero y Miño, y Tras-os-Montes (Brot.) sobre los musgos, muros y rocas (v. v.)

### Cladophora.

**C. catenata Kg.** *Conferva catenata Ag.*

*Hab.* Costas de España (Salcedo, Clem., Lag.). (v. v.)

*Santander* (Salcedo).

*Galicia* (L. Seoane): Ferrol (L. Seoane).

*Andalucia* (Clem., Lag.): Sanlúcar de Barrameda, Rota, Cádiz, Chiclana (Clem., Colm.)

**C. prolifera** Kg. *Conserva prolifera* Roth. *Cat. I.*, t. 3, f. 2. *Ceramium catenatum* DC.

*Hab.* Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

**C. rupestris** Kg. *Conserva rupestris* L. *Dillw.*, t. 23. *Engl. bot.*, t. 1699. *C. glauca et virgata* Roth. *Ceramium rupestre* DC.

*Hab.* Costas de España en el Ferrol (L. Alonso). (v. s.)

**C. opposita** Kg.

*Hab.* Mediterráneo sobre la *Phyllophora nervosa* Grev. (Kg.). (n. v.)

**C. sericea** Kg. *Conserva sericea* Lyngb., t. 53, A.

*Var.  $\beta$  mediterranea* Duby. Costas de las Islas Baleares (Texid.). (n. v.)

**C. glomerata** Kg. *Conserva glomerata* L. *Dillw.*, t. 13. *Engl. bot.*, t. 2192. *C. polymorpha* L. *Chantransia glomerata* DC.

*Hab.* España (E. Bout., Clem.) en los riachuelos y ríos (v. v.)

*Cataluña* (E. Bout.): Monserrat (E. Bout.)

*Aragón* (Pardo, Loscos).

*Galicia* (L. Seoane): Ferrol (L. Seoane).

*Castilla la Nueva* (Colm., Wk.): Madrid (Colm.), Aranjuez (Wk.)

*Andalucía* (Clem.)

*Var.  $\beta$  marina* Mont.

*Var.  $\gamma$  longissima* Mont. *Conserva longissima* Desf. Cádiz (Clem.)

*Nomb. vulg.* Cast. Ova (Wk.)

**C. insignis** Kg.

*Var.  $\gamma$  fluviatilis* Kg. *Conserva usneoides* Vallr. *Chantransia rivularis* DC. *Prolifera rivularis* Vauch. Ríos y riachuelos (v. v.)

**C. elongata** Kg. *Conserva elongata* Lag.

*Hab.* España en los ríos y riachuelos de Asturias (Lag.) y Galicia (L. Seoane). (n. v.)

**C. fracta Kg.** *Conferva vagabunda Huds.*  
**C. patens Ag.**

*Hab.* España en el Ferrol (L. Alonso) y cerca de Aranjuez en el lago de Ontígola (Wk.). (v. v.)

?**C. æruginosa.** *Conferva æruginosa Huds.*

*Hab.* Costas de España en Galicia (L. Seoane) y las de Portugal (Vand.). (n. v.)

### Rhizoclonium.

**R. rivulare Kg.** *Conferva rivularis L.* *Dillw., t. 39.*

*Alga II Quer.*

*Hab.* España (Quer, Asso) y Portugal (D. Bapt., Brot., Figueir.) en los riachuelos (v. v.)

*Cataluña* (E. Bout.): Monserrat (E. Bout.)

*Aragon* (Asso, Xarne): Tarazona (Jubera).

*Galicia* (Colm.): Cuntis (L. Seoane).

*Castilla la Nueva* (Herb. Madr.): fontines del Jardin botánico (Herb. Madr.)

*Valencia* (Cav.): Albufera (Cav.)

*Andalucia* (Prol.): Málaga (Prel.)

*Extremadura* (Villaescusa): Alange (Villaescusa).

*Portugal* (D. Bapt., Brot., Figueir.): Coimbra (D. Bapt.)

*Baleares* (Weyler).

*Nomb. vulg. Cast.* Ova de agua (Huerta), Alga de rio (Quer), Ova de rio, Verdin, Ajomate (M. Jimen.), Ova, Sedas, Limos (Pardo, Loscos). *Port.* Limos (Mont., Brot., Figueir.), Limon (Brot.) *Val.* Cabells de serp. (?)

### Chætomorpha.

**Ch. implexa Kg.** *Conferva implexa Auct.*

*Hab.* Costas de las Islas Baleares (Texid.)—Pudiera ser la *Ch. mediterranea Kg.*

**Ch. chlorotica Kg.** *Conferva chlorotica Mont.*

*Hab.* Mediterráneo (Mont.). (n. v.)

**Ch. setacea Kg.** *Phyc., t. 11, f. 2. Conferva setacea*

*Ag.*

*Hab.* Atlántico y Mediterráneo (Ag.). (n. v.)

*Ch. aerea Kg.* *Conferva aerea Dillw.*, t. 80. *Lyngb.*

t. 51.

*Hab.* Atlántico y Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

*Ch. mediterranea Kg.*

*Hab.* Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

### Psichohormium.

*Ps. verrucosum Kg.* *Conferva verrucosa Ag.*

*Hab.* España en Galicia cerca de Tuy en las aguas estancadas (L. Seoane). (n. v.)

### Conferva.

*C. floccosa Ag.* *Prolifera floccosa Vauch.* *Conf.*, t. 14, f. 3.

*Hab.* España en los riachuelos y acequias de Galicia cerca de Tuy (L. Seoane) y de Aragon cerca de Castelserás (Pardo, Loscos). (n. v.)

*C. bombycina Ag.* *Prolifera composita Vauch.* *Conf.*, t. 14, f. 6.

*Var. γ sordida Kg.* *Conferva sordida Dillw.*, t. 60. Aragón cerca de Castelserás en las peñas del río (Pardo, Loscos).

### Œdогonium.

*Œ. capillare Kg.*

*Var. α fluctuans Kg.* *Ulothrix maxima Kg.* En los riachuelos sobre las plantas acuáticas (Kg.). (v. v.)

*Var. β natans Kg.* *Conferva capillaris Ag.* *Ceramium capillare DC.* *Chantransia crispa DC.* *Prolifera crispa Vauch.*, t. 14, f. 2. *Ulothrix rivularis Kg.* Charcos y acequias de Cataluña (Salv., E. Bout.), Aragón (Asso, Xarne), Santander Salcedo), Galicia (Sarm.), Castilla (Colm.). (v. v.)

*Nomb. vulg.* Linillo de agua (F. Nav.), Moho verde del agua (Sarm.) *Gall.* Rabaza, Marujan (Sarm.)

## ULOTRIQUEAS.

**Bangia.****B. versicolor Kg.**

*Var. γ malacensis Kg.* Málaga (Wk.)

**B. fusco-purpurea Lyngb., t. 24, f. C.**

*Hab.* Costas de España en el Ferrol (L. Seoane). (n. v.)

**B. atro-purpurea Ag.** *Conferva atropurpurea Dillw., t. 103. Ag. Ic., t. 25. Conferva castanea Trev. Oscillatoria atro-purpurea Ag.*

*Hab.* España (?) en los ríos y riachuelos, particularmente en las ruedas de los molinos y en los acueductos (Kg.). (n. v.)

**Goniotrichum.****G. ceranicola Kg.** *Conferva ceranicola Lyngb., t. 48.*

*Hab.* Atlántico y Mediterráneo sobre diversas algas filiformes (Kg.). (n. v.)

**Draparnaldia.****D. glomerata Ag.** *Lyngb., t. 64. Batrachospermum glomeratum Vauch. Conf., t. 12, f. 1. Conferva mutabilis Engl. bot., t. 1746.*

*Hab.* España (?) en las acequias (n. v.)

**D. plumosa Ag.** *Conferva mutabilis Roth. Dillw., t. 12. Batrachospermum plumosum Vauch., t. 11, f. 2.*

*Hab.* España en Galicia cerca de la Coruña (L. Seoane), en los riachuelos (n. v.)

**Stigeoclonium.****St. tenuis Kg.** *Draparnaldia tenuis Ag. Conferva exigua Dillw., t. D.?*

*Hab.* España en Aragón (Pardo, Loscos) en los riachuelos y depósitos de agua (n. v.)

**St. pusillum Kg.** *Confervaria pusilla Lyngb.*, t. 51.

*Hab.* España en Galicia cerca de Betanzos (L. Seoane) en las acequias y riachuelos (n. v.)

### Schizogonium.

**Sch. murale Kg.** *Phyc.*, t. 3, f. VII, 4. *Bangia velutina Kg.* *Alg. ag. dulc.*

*Hab.* Toda Europa sobre la tierra (Kg.). (n. v.)

### Ulothrix.

**U. zonata Kg.** *Confervaria lucens Dillw.*, t. 47. *Engl. bot.*, t. 1655. *Draparnaldia confervoides Bory*.

*Hab.* España en Galicia (L. Seoane) en los riachuelos sobre las piedras (n. v.)

**U. crispa Kg.** *Confervaria bicolor Engl. bot.*, t. 2288.

*Hab.* España cerca de Málaga y Almería (Lag.) en los riachuelos (n. v.)

**U. radicans Kg.** *Lyngbia muralis Ag.* *Oscillatoria muralis Lyngb.*

*Hab.* España en Santiago de Galicia (Texid.) sobre la tierra, muros y leños en sitios húmedos (v. v.)

### RIVULARIEAS.

#### Euactis.

**E. prorumpens Kg.** *Phyc. Rivularia mediterranea Kg.* *Actien.*

*Hab.* Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

**E. hemisphærica Kg.** *Phyc. Rivularia hemisphærica Kg.* *Actien. Tremella hemisphærica Linn. ex L. Alonso.*

*Hab.* Costas de España en el Ferrol (L. Alonso). (n. v.)

**E. rivularis Nægeli.**

*Hab.* España en Aragón cerca de Castelserás (Pardo, Loscos). (n. v.)

**Rivularia.****R. Lenticula Kg.**

*Hab.* España sobre la página inferior de las hojas del Nenúfar amarillo (Colm.). (v. v.)

?**R. plana Herv.** *Chetophora plana Ag. Tremella adnata L. ex Spr.*

*Hab.* España en el Ferrol? (L. Alonso) sobre las rocas marinas (n. v.)

**Limnactis.****L. Lyngbyana Kg.** *Linckia dura Lyngb.*

*Hab.* Toda Europa sobre las plantas acuáticas (Kg.). (n. v.)

**ESCITONEMEAS.****Stigonema.**

**St. pannosum Kg.** *Collema pannosum Hoffm. Collema velutinum Ach. Parmelia pannosa Ach. Byssus petræa Wolf. Dillw., t. 1, f. 18.*

*Hab.* Toda Europa sobre las piedras entre los musgos (Kg.). (n. v.)

**Scytonema.****Sc. myochrous Ag.**

*Hab.* Toda Europa sobre las rocas húmedas (Ag.). (n. v.)

**Sc. byssoidaeum Ag.**

*Hab.* España (?) sobre la tierra, las rocas y los troncos de los árboles (n. v.)

## NOSTOCEAS.

## Nostoc.

**N. lichenoides** Vauch. *Conf.*, t. 16, f. 3.

*Hab.* España (E. Bout., Salcedo, Lag.) sobre la tierra y las piedras despues de las lluvias (v. v.)

Cataluña (E. Bout., Colm.): Monserrat (E. Bout.)

Santander (Salcedo).

Andalucia (Lag.): Jaen (Lag.)

**N. sphæricum** Vauch. *Conf.*, t. 16, f. 2. *N. pusillum* Bory.

*Hab.* España en Cataluña (Colm.), Aragon cerca de Castelserás y Peñaroya (Pardo, Loscos) y demás provincias sobre las piedras en los riachuelos (v. v.)

**N. pomiforme** Ag. *Lyngb. Hydr.*, t. 68. A. *Ulva pomiformis* L. *Engl. bot.*, t. 968.

*Hab.* España en los prados de Guadarrama (Lag.). (n. v.)

**N. commune** Vauch. *Conf.*, t. 16, f. 1. *N. Paracelsi Geoffr.* *N. vulgare* Wahlenb. *N. ciniflorum* Tournef. *Tremella Nostoc* L. *T. atro-virens* Bull., t. 184. *T. terrestris* Dillw., t. 10, f. 14. *Ulva ætherea* Poir.

*Hab.* España (F. Nav., Clem.) y Portugal (Vand., Brot.) sobre la tierra en los campos despues de las lluvias (v. v.)

Cataluña (Graells, Colm.)

Aragon (Xarne, Pardo, Loscos): Villarluengo (Xarne).

Galicia (L. Seoane): Tuy (L. Seoane).

Castilla la Nueva (F. Nav.) cercanías de Madrid (F. Nav., Colm.)

Valencia (Cav., Clem.): Artana (Cav.), Titaguas (Clem.)

Andalucia (Clem.): Andújar, Menjibar, Málaga (Clem.), Granada (Wk.)

Portugal (Vand., Brot.)

Nomb. *vulg.* Cast. Ojos del rocio (F. Nav.) Catal. Ungüen de la pluja (Bassag.)

**N. verrucosum** Vauch. *Conf.*, t. 16, f. 3. *Tremella verrucosa* L. *T. fluvialis* Clem. *Ens.*

*Hab.* España (Clem., L. Alonso) sobre las piedras sumergidas en los riachuelos (v. v.)

Aragón (Pardo, Loscos): Chiprana, Castelserás (Pardo, Loscos).

Galicia (L. Alonso, Colm.): Ferrol (L. Alonso), Villagarcía (L. Seoane).

Castilla la Nueva (Graells): Escorial en el lago superior de la Granjilla (Graells).

Andalucía (Clem.): Alcalá de los Gazules (Clem.), Sierra-Nevada en las rocas sumergidas desde el Dornajo hasta San Gerónimo, á la altura de 5.000' (Wk.).

### Cylindrospermum.

**C. riparium** Kg. *Anabaina macrocephala* Menegh.

*Hab.* Toda Europa en las orillas de las acequias y ríos (Kg.). (n. v.)

### Sphærozyga.

**Sph. flexuosa** Ag. *Ic.*, t. X. *Oscillatoria flexuosa* Ag.  
*Anabaina impalpebralis* Bory.

*Hab.* Toda Europa en las aguas corrientes ó estancadas (Kg.). (n. v.)

### Limnochlide.

**L. Flos-aquæ** Kg. *Byssus Flos-aquæ* L. *Oscillatoria Flos-aquæ* Ag.

*Hab.* España (Lag.) y Portugal (Vand.) en los charcos y lagunas (v. v.)

## LINGBIEAS.

## Lyngbya.

**L. crispa** Ag. *Conferva stuposa* Roth. *Oscillatoria crispa* Ag. *O. littoralis* Harv. *Phyc. brit.*, t. 105, f. A.

*Hab.* Costas de España en Galicia cerca de Cambados (L. Seoane). (n. v.)

**L. confervoides** Ag.

*Hab.* Costas de España en Cádiz cerca de la Cortadura (Wk.). (n. v.)

## Leibleinia.

**L. purpurea** Kg.

*Hab.* Atlántico sobre diferentes algas (Kg.). (n. v.)

## LEPTOTRIQUEAS.

## Leptothrix.

**L. lamellosa** Kg. *Anabaina monticulosa* Bory. *Oscillatoria labyrinthiformis* Ag. *Ulva labyrinthiformis* L.

*Hab.* Portugal (Vand.). (n. v.)

## OSCILARIEAS.

## Chthonoblastus.

**Ch. Vaucherii** Kg. *Oscillatoria vaginata* Vauch. *Conf.* t. 15, f. 13. *Microcoleus terrestris* Desmar.

*Hab.* Toda Europa sobre la tierra (Kg.). (n. v.)

### Phormidium.

**Ph. vulgare Kg.** *Tab. Phyc., t. 46, f. 4. Oscillatoria autumnalis Ag.*

*Hab.* España en las Castillas (Colm.) y Aragón (Pardo, Loscos) sobre la tierra en sitios sombrios (v. v.)

### Oscillaria.

#### O. tenuis Ag.

*Hab.* Toda Europa en los sitios pantanosos é inundados y en los charcos desecados (Kg.), (n. v.)

**O. limosa Ag.** *Conferva limosa Roth. C. fontinalis Dillw., t. 64. Oscillatoria Adansonii Vauch. Conf., t. 15, f. 6.*

*Hab.* España (E. Bout., Clem.) y Portugal (Vand.) en los estanques y riachuelos (v. v.)

Cataluña (E. Bout.); Monserrat (E. Bout.)

Valencia (Clem.); Titáguas (Clem.)

Portugal (Vand., D. Bapt.); Coimbra (D. Bapt.)

Nomb. vulg. Val. Limachos (Clem.)

**O. nigra Vauch.** *Conf., t. 15, f. 4. Kg. Tab. Phyc., t. 42, f. 3.*

*Hab.* Toda Europa en los riachuelos de lento curso (Kg.). (n. v.)

### PALMELEAS.

### Palmogloea.

**P. protuberans Kg.** *Tab. Phyc., t. 24, f. 1. Ulva protuberans Sm. Engl. bot., t. 2583. Palmella protuberans Ag.*

*Hab.* Toda Europa en los terrenos montuosos y húmedos cerca de los caminos y entre los musgos (Kg.). (n. v.)

### Tetraspora.

**T. bullosa Ag.** *Kg. Tab. Phyc.*, t. 28, f. 1. *T. minima Desv.* *Ulva bullosa Roth.* *U. minima Vauch. Conf.*, t. 17, f. 1. *Tremella palustris Web.*

*Hab.* Toda Europa en los estanques (Kg.). (n. v.)

**T. cylindrica Ag.** *Kg. Tab. Phyc.*, t. 30, f. 1. *Ulva cylindrica Vahl.* *Rivularia cylindrica Hook.*

*Hab.* España en Galicia en las arenas de los ríos y acequias (L. Seoane). (n. v.)

**T. lubrica Kg.** *Tab. Phyc.*, t. 30, f. 2. *Ulva lubrica Ag.* *Rivularia lubrica DC.* *Confervaria lubrica Roth.*

*Hab.* España en Galicia cerca de Tuy en las aguas (L. Seoane). (n. v.)

### Glæocapsa.

**G. botryoides Kg.** *Tab. Phyc.*, t. 20, f. 4.

*Hab.* Toda Europa en los palos mojados constantemente (Kg.). (n. v.)

**G. montana Kg.** *Tab. Phyc.*, t. 19, f. 2. *Palmella botryoides uva Kg.*

*Hab.* Toda Europa en los montes sobre la tierra y entre los musgos (Kg.). (n. v.)

**G. Magma Kg.** *Tab. Phyc.*, t. 22, f. 2. *Protococcus Magma Breb.* *Palmella montana Ag.* *Ulva montana Lightf. Engl. bot.*, t. 2193.

*Hab.* Toda Europa en los montes sobre las rocas húmedas (Kg.). (n. v.)

### Coccochloris.

**C. stagnina Spr.** *Tab. Phyc.*, t. 18, f. 3. *Palmella globosa Ag.*

*Hab.* Toda Europa en las aguas estancadas (Kg.). (n. v.)

### Palmella.

**P. cruenta Ag.** *Kg. Tab. Phyc., t. 15, f. 2. Telephora sanguinea Pers. Byssus purpurea Lamarck. Tremella cruenta Engl. bot., t. 1800.*

*Hab.* España en Valencia cerca de Titáguas sobre las peñas (Clem.). (n. v.)

**P. botryoides Lyngb.** *Kg. Tab. Phyc., t. 13, f. 1. Tremella botryoides Schreb. Nostoc botryoides Ag. Byssus botryoides L. ex Lag. Brot., etc.*

*Hab.* Toda Europa en los palos húmedos constantemente (Kg.). (n. v.)

**P. hyalina Breb.** *Kg. Tab. Phyc., t. 15, f. 1. Coccochloris hyalina Menegh.*

*Hab.* España en Galicia (L. Seoane) en las aguas estancadas (n. v.)

### Characium.

#### **Ch. angustum A. Br.**

*Hab.* España en Aragón sobre la *Spirogyra majuscula Kg.* (Rabenh., Pardo, Loscos). (n. v.)

### ?Chytridium.

#### **Ch. endogenum A. Br.**

*Hab.* España en Aragón sobre la *Spirogyra majuscula Kg.* (Rabenh., Pardo, Loscos). (n. v.)

### Protococcus.

**P. viridis Ag.** *Kg. Tab. Phyc., t. 3. Mucor virides-cens L.? D. Bapt.*

*Hab.* Toda Europa en los muros y las cortezas de los árboles (Kg.). (v. v.)

#### **P. nivalis Ag.** *Ic., t. 21.*

*Hab.* España (?) en los Pirineos sobre la nieve (n. v.)

## DESMIDIEAS.

**Pediastrum.****P. cruciatum Kg.**

*Hab.* Toda Europa en las aguas (Kg.). (n. v.)

**Hyalotheca.****H. mucosa Ehrenb.** *Desmodium mucosum* Breb. *Conferva disiliens Engl. bot.*

*Hab.* Toda Europa en las aguas cenagosas (Kg.). (n. v.)

**Phycastrum.****Ph. cuspidatum Kg.** *Binatella tricuspidata* Breb.  
*Alg. Fal.*, t. 8.

*Hab.* Toda Europa en las aguas cenagosas (Kg.). (n. v.)

**Ph. paradoxum Kg.** *Staurastrum paradoxum* Ehrenb.  
*Infus.*, t. 10, f. 12.

*Hab.* Toda Europa en los charcos (Kg.). (n. v.)

**Ph. muricatum Kg.** *Staurastrum muricatum* Breb.  
*Ralfs. Trans. Edinb. Bot. Soc.*, t. 14, f. 1, d. e.

*Hab.* Europa en las acequias (Kg.). (n. v.)

**Arthrodeshmus.****A. convergens Ehrenb.** *Infus.*, t. 10, f. 18. *Euastrum convergens* Ky.

*Hab.* Toda Europa en las acequias (Kg.). (n. v.)

**A. Incus Hassall.** *Freschw. Alg.*, t. 85, f. 10. *Cosmarium Incus* Breb. *Euastrum retusum* Ky.

*Hab.* Toda Europa en las aguas cenagosas (Kg.). (n. v.)

### Cosmarium.

- C. cucumis Corda.** *Ralfs. Trans. Edinb. Bot. Soc., t. 16, f. 8. Euastrum lave Ehrenb.*  
*Hab. Toda Europa (Kg.). (n. v.)*
- C. ansatum Ehrenb.** *Infus., t. 12, f. 6.*  
*Hab. Toda Europa (Kg.). (n. v.)*
- C. tetrophthalmum Menegh.** *Euastrum margaritiferum Ehrenb. Infus., t. 12, f. 7.*  
*Hab. Toda Europa en los charcos (Kg.). (n. v.)*

### Euastrum.

- E. binale Kg.** *Heterocarpella binalis Turp. Euastrum didelta Ralfs. Trans. Edinb. Bot. Soc., t. 11, f. 2.*  
*Hab. Toda Europa en las acequias (Kg.). (n. v.)*
- E. Pecten Ehrenb.** *Infus., t. 12, f. 4. Cosmarium oblongum Breb.*  
*Hab. Toda Europa en las acequias (Kg.). (n. v.)*

### Micrasterias.

- M. Rota Menegh.** *Euastrum Rota Ehrenb. Infus., t. 12, f. 1.*  
*Hab. Toda Europa en las aguas (Kg.). (n. v.)*

### Tetmemorus.

- T. Brebissonii Ralfs.** *Trans. Edinb. Bot. Soc., t. 12, f. 1. Closterium Brebissonii Menegh.*  
*Hab. Toda Europa en las aguas cenagosas (Kg.). (v. v.)*
- T. granulatus Ralfs.** *Trans. Edinb. Bot. Soc., t. 12, f. 2, a-g.*  
*Hab. Toda Europa en las aguas cenagosas (Kg.). (n. v.)*

### Stauroceras.

**St. Acus Kg.** *Closterium Acus Nitzsch. C. rostratum Ehrenb. Infus.*, t., 6, f. 10.  
*Hab.* Toda Europa en las lagunas (Kg.). (n. v.)

### Closterium.

**C. Lunula Nitzsch.** *Ehrenb. Infus.*, t. 5, f. 15, 1.  
*Vibrio Lunula Müll. Lunulina vulgaris Bory.*  
*Hab.* Toda Europa en las acequias (Kg.). (n. v.)  
**C. Ehrenbergii Menegh.** *C. Lunula Ehrenb. Infus.*, t. 5, f. 15, 2.  
*Hab.* Toda Europa en las aguas (Kg.). (n. v.)  
**C. turgidum Ehrenb.** *Infus.*, t. 6, f. 7.  
*Hab.* Toda Europa en las aguas cenagosas (Kg.). (n. v.)

### (DIATOMEAS.)



### BIDULFIEAS.



### Odontella.

**O. aurita Ag.** *Kg. Bacill.*, t. 29, f. 88. *Diatoma auritum Lyngb.*, t. 62, f. D. *Biddulphia aurita Breb.*  
*Hab.* Atlántico (Kg.). (n. v.)

### Isthmia.

**I. enervis Ehrenb.** *Infus.*, t. 16, f. 5. *Conferva obliquata Engl. bot.*, t. 1869. *Diatoma obliquata Ag. ex parte Biddulphia obliquata Gray.*  
*Hab.* Atlántico (Kg.). (n. v.)

## ANGULIFERAS.

## Amphitetas.

- A. antediluviana** Ehrenb. *Kg. Bacill.*, t. 19, f. 3.  
t. 29, f. 86. *Isthmia vesicularis* Ag.  
*Hab.* Atlántico en las costas de Europa (Kg.). (n. v.)

## TABELARIEAS.

## Grammatophora.

- G. marina** Kg. *Bacill.*, t. 17, f. 24, 1-6. *Conserva teniaeformis* Engl. *bot.*, t. 1833. *Diatoma marinum* Lyngb., t. 62. *Bacillaria Cleopatrae* Ehrenb. *Infus.*, t. 15, f. 3.  
*Hab.* Atlántico (Kg.). (n. v.)

## Tabellaria.

- T. flocculosa** Kg. *Bacill.*, t. 17, f. 21. *Conserva flocculosa* Roth. *Dilho.*, t. 28. A. D. Engl. *bot.*, t. 1761. *Diatoma flocculosum* Lyng., t. 61. *Bacillaria tabellaris* Ehrenb. *Infus.*, t. 15, f. 7.

*Hab.* Toda Europa en las aguas estancadas ó corrientes (Kg.). (n. v.)

## ESTRIATELAS.

## Striatella.

- St. unipunctata** Ag. *Fragilaria unipunctata* Lyngb., t. 62.  
*Hab.* Atlántico (Kg.). (n. v.)

**Tessella.**

**T. interrupta Ehrenb.** *Kg. Bacill.*, t. 18, f. 4.  
*Hab.* Atlántico (Kg.). (n. v.)

**LICMOFOREAS.****Licmophora.**

**L. radians Kg.** *Bacill.*, t. 11, f. 4, t. 12, f. 1. *Gomphonema flabellatum Kg.* *Syn. Echinella flabellata Ehrenb.* *Infus.*, t. 19, f. 1.  
*Hab.* Atlántico (Kg.). (n. v.)

**Rhipidophora.**

**R. oceanica Kg.** *Bacill.*, t. 10, f. 4.  
*Hab.* Atlántico (Kg.). (n. v.)

**NAVICULEAS.****Schizonema.**

**Sch. helmintosum Chauv.** *Sch. Arbuscula Kg.* *Bacill.*, t. 27, f. 1-3. *Naunema Arbuscula Ehrenb.* *Infus.*, t. 20, f. 14.  
*Hab.* Costas de España en la Coruña (L. Seoane). (n. v.)

**Amphora.**

**A. ovalis Kg.** *Bacill.*, t. 5, f. 35, 39. *Navicula Amphora Ehrenb.* *Infus.*, t. 14, f. 3. *Frustulia ovalis et copulata Kg.* *Syn. Diat.*, f. 5, 6.  
*Hab.* Toda Europa en las aguas dulces (Kg.). (n. v.)

**A. gracilis Ehrenb.** Amer., t. 3. I, 43. Kg. Bacill., t. 29, f. 29.

*Var. β angusta Ehrenb.* España en los ríos (Kg.). (n. v.)

### Stauroneis.

**St. Phœnicenteron Ehrenb.** Amer., t. 2. V, 1. *Bacillaria Phœnicenteron* Nitzsch., t. 4, f. 12, 13. *Navicula Phœnicenteron* Ehrenb. Infus., t. 13, f. 1.

*Hab.* Toda Europa en las aguas dulces (Kg.). (n. v.)

### Amphipleura.

**A. pellucida Kg.** Bacill., t. 3, f. 53, t. 30, f. 84. *Frustulia pellucida* Kg. Syn. Diat., f. 11.

*Hab.* Toda Europa en las aguas dulces (Kg.). (n. v.)

### Navicula.

**N. Petersii Kg.** *Pinnularia Petersii* Ehrenb.

*Hab.* Portugal en la desembocadura del Tajo (Kg.). (n. v.)

**N. cuspidata Kg.** Bacill., t. 3, f. 24, 37. *Frustulia cuspidata* Kg. Syn. Diat., t. 2, f. 26. *Navicula fulva* Ehrenb. Infus., t. 13, f. 6.

*Hab.* Toda Europa en las aguas estancadas (Kg.). (n. v.)

**N. amphisbæna Bory.** Ehrenb. Infus., t. 13, f. 7.

*Frustulia depressa* Kg. Syn. Diat. f. 27.

*Hab.* Toda Europa entre las oscilarias (Kg.). (n. v.)

**N. major Kg.** Bacill., t. 4, f. 19, 20. *Frustulia major* Kg. Syn. Diat., f. 25.

*Hab.* Toda Europa en las aguas dulces (Kg.). (n. v.)

**N. Faba Kg.** *Diploneis Faba* Ehrenb.

*Hab.* Portugal en el Tajo (Kg.). (n. v.)

**N. acuminata Kg.** Bacill., t. 4, f. 26, t. 30, f. 15.

*Bacillaria fusiformis* Ehrenb. *Frustulia acuminata* Kg. Syn. f. 39.

*Hab.* Toda Europa entre las oscilarias (Kg.). (n. v.)

## GONFONEMEAS.

## Gomphonema.

**G. abbreviatum Kg.** *Bacill.*, t. 8, f. 5, 6, 8 a.  
*Echinella? abbreviata Ehrenb.* *Infus.*, t. 19, f. 4.

*Hab.* Toda Europa sobre las algas de agua dulce (Kg.).  
 (n. v.)

**G. olivaceum Kg.** *Bacill.*, t. 7, f. 13, 15. *Echinella olivacea Lyngb.* *Hydr.*, t. 70, f. 1-3. *Frustulia (Sphenella) olivacea Kg.* *Syn. Diat.* f. 31.

*Hab.* Toda Europa en las aguas dulces (Kg.). (n. v.)

**G. curvatum Kg.** *Bacill.*, t. 8, f. 1, 2, 3.

*Hab.* Atlántico y Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

**G. subramosum Ag.** *Kg.* *Bacill.*, t. 8, f. 15. *G. discolor Ehrenb.* *Infus.*, t. 18, f. 8, et *G. clavatum Ehrenb.*, t. 18, f. 6.

*Hab.* Toda Europa sobre las algas de agua dulce (Kg.).  
 (n. v.)

**G. capitatum Ehrenb.** *Infus.*, t. 18, f. 2. *Kg.*  
*Bacill.*, t. 16, f. 2, t. 21, f. 13.

*Hab.* España en Aragón sobre la *Spirogyra majuscula* Kg. (Rabenh., Pardo, Loscos) y otras algas de agua dulce  
 (n. v.)

**G. constrictum Ehrenb.** *G. ophliæforme Kg.* *Syn. Diat.* f. 50.

*Hab.* Toda Europa sobre las algas de agua dulce (Kg.).  
 (n. v.)

**G. acuminatum Ehrenb.** *Infus.*, t. 18, f. 4. *Kg.*  
*Bacill.*, t. 13, f. I, 7.

*Hab.* Toda Europa en las aguas dulces (Kg.). (n. v.)

## CIMBELEAS.

## Cymbella.

**C. maculata** Kg. *Bacill.*, t. 6, f. 2, a. 2, b., t. 29,  
f. 32. *Frustulia maculata* Kg.

*Hab.* Toda Europa en las aguas dulces (Kg.). (n. v.)

## ACHNANTEAS.

## Achnanthes.

**A. minutissima** Kg. *Bacill.*, t. 13, f. 2, c., t. 21,  
f. 2. *Ehrenb. Infus.*, t. 20, f. 5.

*Hab.* Toda Europa sobre las algas de agua dulce (Kg.).  
(n. v.)

## COCONEIDEAS.

## Cocconeis.

**C. Pediculus** Kg. *Bacill.*, t. 5, f. 9, 1. *Ehrenb.*  
*Infus.*, t. 21, f. 11 *ex parte*.

*Hab.* Toda Europa sobre las algas de agua dulce (Kg.).  
(n. v.)

**C. Placentula** Ehrenb. Kg. *Bacill.*, t. 28, f. 13.

*Hab.* España en Aragón sobre la *Spirogyra majuscula*  
(Rabenh., Pardo, Loscos) y otras algas de agua dulce (n. v.)

**C. mediterranea** Kg. *Bacill.*, t. 5, f. 6, 8.

*Hab.* Mediterráneo (Kg.). (n. v.)

## SURIRELEAS.

## Synedra.

**S. acicularis Kg.** *Bacill.*, t. 4, f. 3. *Navicula producta* Breb.

*Hab.* Toda Europa entre las oscilarias y otras diatomeas (Kg.). (n. v.)

**S. gracilis Kg.** *Bacill.*, t. 3, f. 15.

*Hab.* Mediterráneo sobre diversas algas (Kg.). (n. v.)

**S. tenuis Kg.** *Bacill.*, t. 14, f. 12.

*Hab.* España en Aragon sobre la *Spirogyra majuscula* Kg. (Rabenh., Pardo, Loscos) en las aguas dulces (n. v.)

**S. lunaris Ehrenb.** *Infus.*, t. 17, f. 4.

*Hab.* Toda Europa en las aguas estancadas, libre ó parásitica (Kg.). (n. v.)

**S. debilis Kg.** *Bacill.*, t. 3, f. 45.

*Hab.* Toda Europa en los charcos (Kg.). (n. v.)

**S. Vaucheriæ Kg.** *Bacill.*, t. 14, f. 4.

*Hab.* Toda Europa sobre las algas filiformes acuáticas (Kg.). (n. v.)

**S. Ulna Ehrenb.** *Infus.*, t. 17, f. 1. *Kg. Bacill.*, t. 30, f. 28. *Bacillaria Ulna* Nitzsch. *Frustulia Ulna* Kg. *Alg. aq. dulc.*

*Hab.* España en Aragon sobre la *Spirogyra majuscula* (Rabenh., Pardo, Loscos) en las aguas estancadas ó corrientes (n. v.)

**S. splendens Kg.** *Bacill.*, t. 14, f. 16. *Frustulia splendens* Kg. *Syn. f. 23.*

*Hab.* Toda Europa sobre las plantas acuáticas (Kg.). (n. v.)

## Surirella.

**S. solea Breb.** *Frustulia quinquepunctata* Kg. *Syn. Diat. f. 28.* *Navicula Librilis* Ehrenb. *Infus.*, t. 13, f. 22.

*Hab.* Toda Europa en los charcos, particularmente entre las oscilarias (Kg.). (n. v.)

### Campylodiscus.

#### C. Surirella Ehrenb.

*Hab.* España en las fuentes (Ehrenb., Kg.). (n. v.)

### MELOSIREAS.

#### Melosira.

**M. moniliformis** Ag. *Kg. Bacill.*, t. 3, f. 2. *Confervaria moniliformis* Müll. *C. nummuloides* Engl. bot., t. 2287. *Galionella moniliformis* Bory. Ehrenb. *Infus.*, t. 10, f. 5.

*Hab.* Costas occidentales de Europa sobre las algas filiformes (Kg.). (n. v.)

**M. lineata** Ag. *Kg. Bacill.*, t. 2, f. 16; t. 3, f. 1. *Confervaria lineata* Dillw. *Galionella lineata* Ehrenb. *Infus.*, t. 10, f. 2.

*Hab.* Costas occidentales de Europa (Kg.). (n. v.)

**M. varians** Ag. *Kg. Bacill.*, t. 2, f. 10. *Confervaria hyemalis* Roth. *Galionella varians* Ehrenb. ex parte. *Infus.*, t. 10, f. 4.

*Hab.* Toda Europa en las aguas dulces (Kg.). (n. v.)

**M. orichalcea** Kg. *Bacill.*, t. 2, f. 14. *Confervaria orichalcea* Mertens. *Galionella orichalcea* Ehrenb. *Infus.*, t. 10, f. 6.

*Hab.* Toda Europa en las aguas dulces (Kg.). (n. v.)

## FRAGILARIEAS.

## Sigmatella.

**S. Nitzschii Kg.** *Bacillaria sigmaidea* Nitzsch. *Bacill.*, t. 6. *Cymbella sigmaidea* Ag. *Navicula sigmaidea* Ehrenb. *Infus.*, t. 13, f. 15 (mala).

*Hab.* Toda Europa entre las oscilarias (Kg.). (n. v.)

## Diatoma.

**D. hyalinum Kg.** *Bacill.*, 17, f. 20.

*Hab.* Atlántico y Mediterráneo sobre diversas algas (Kg.). (n. v.)

**D. vulgare Kg.** *Bacill.*, t. 17, f. 15. *Conserva flocculosa* Dillw., t. 28, f. B. C. D.? *Bacillaria vulgaris* Ehrenb. *Infus.*, t. 15, f. 2.

*Hab.* Toda Europa en las aguas corrientes (Kg.). (n. v.)

## Fragilaria.

**F. capucina Desmaz.** *Kg.* *Bacill.*, t. 16, f. 3. *F. pectinalis* Lyngb., t. 63. *Conserva pectinalis* Müll. *Bacillaria pectinalis* Nitzsch., t. 6, f. 7. *Diatoma pectinale* Ag.

*Hab.* Toda Europa en las aguas dulces (Kg.). (n. v.)

## EUNOCIEAS.

## Eunotia.

**E. amphioxys Ehrenb.** *Amer.*, t. I, 1, 26. *Kg* *Bacill.*, t. 30, f. 1.

*Hab.* Toda Europa en las aguas dulces (Kg.). (n. v.)

