

Types de cartographie du couvert végétal dans le ravin de la gorge par façonnage d'une réserve naturelle (marais de Lavours, Ain)

HANNEVILLE O. - MASCHAZAK

Bovins rustiques Highland Cattle introduits par gènes en milieu

Aspects méthodologiques du ravin d'évolution.

Anneux marais mis hors d'eau, emmoussu par lipneux - Différenciation
du ravin des states lipneux et herbacées.

* Méthodes d'étude state herbacée :

Relevés linéaires 25 pts / 10 m

state arbustive :

Comptage lipneux à l'int d'un cercle de 8 m de rayon + hauteur moy

(Echantillonnage :

Quadrillage / plots de 2 m, maille variable . 59 stations punctuelles
répétées le long des lipneux



+ stations terrain.

1 relevé/an à 1 state phénologique donné

* Traitement des données

AFC par state herbacée

Analyse de la strate herbacée

* Cartogr. directe :
= zonage

* Cartogr. quantitative :

Relevés linéaires $\rightarrow$ Représentⁿ de clape en ds l'espace / des courbes de surf proportionnelle au nbre de contacts / station : Cartes de répartition

Certaines ex + localisées. Certaines permettent de $\neq$ les groupements
Certains ont 1 répartition difficile à relever avec la cartogr. directe.

AFC

Graphique des valeurs propres de l'AFC $\rightarrow$ 3 facteurs sont à retenir

A clape fact est associé 1 graphe : chaque station est représentée /

1 courbe dont la représentⁿ $\blacksquare$ ou $\square$ est fctn des coordonnées factorielles

Voir tableau des contributions pour interpréter les graphiques.

En superposant les 3 cartes issues de l'AFC on retrouve les fauës délimités
sur le terrain : Bonne concordance des résultats.