

**¿ALCANZA *PULSATILLA VERNALIS* (L.) MILLER
EL SUR DE LA PENÍNSULA?**

Tal suposición se reflejó todavía en «Flora Europaea» (1:220, 1964), con toda evidencia basada en la cita de LANGE (*Vid. Medd. Dansk naturhist. Foren. Kjöbenhavn*, 1865:54), que reitera nuestro manido «Prodromus». Ahora bien, hecha la oportuna pregunta, resulta que no hay material de respaldo en Copenhague (*ita* Hansen, *die* 24-XI-1983, *in litteris ad* Castroviejo), en tanto que O. Socorro y Concepción Morales nos aseguran desde Granada que allí, en la Sierra de Alfácar, lo que Lange vería mediada la primavera de 1852 —¡ha llovido!— es *Adonis vernalis* L. Su «quid pro quo», a estas alturas, resulta evidente: nadie ha visto *Pulsatilla* ninguna en todo el sur de la Península; donde, por otra parte, hay montañas en las que su presencia se diría menos inverosímil que —segundo argumento— en la humilde Sierra de Alfácar.

Un argumento en contra —ciertamente, no hace mucha fuerza— es que a renglón seguido cita el «Pugillus», también de la sierra de Alfácar, *A. vernalis* L.: se ve que Lange duplicó el epíteto, de memoria, en lo que pudo influir el hecho de que *P. vernalis* (L.) Miller, planta danesa, no tenía para él relieve mayor.

Manuel LAÍNZ, S. J., Apartado 425, Gijón (Asturias).

**VALIDATION OF *RANUNCULUS PELTATUS* SUBSP. *PELTATUS*
VAR. *MICROCARPUS* MEIKLE**

R. peltatus subsp. **peltatus** var. **microcarpus** Meikle ex C. D. K. Cook

= *R. peltatus* subsp. *peltatus* var. *microcarpus* Meikle in Notes Royal Bot. Gard. Edinburgh 33:15 (1959), nom. inval. e typo non designato.

Type: Cyprus, Agios Antonios, Sotira, 400 ft., in pool on limestone rocks, 29. Feb. 1982, Merton 624 (holotype: K).

Christopher D. K. COOK, Botanischer Garten und Institut für Systematische Botanik der Universität Zürich, Zollikerstrasse 107, CH-8008, Zürich.

NOVEDADES EN EL GÉNERO *THALICTRUM* L.

Al redactar los *Thalictrum* peninsulares para *Flora Iberica*, me veo en la necesidad de publicar algunas combinaciones y novedades.

Th. foetidum L. var. **nevadense** Font Quer (ined.) ex P. Monts., var. nov.

*A Th. foetido typico satis differt cum tota planta sit magis glandulosa, pilis glanduliferis magnis et densioribus; foliis rigidioribus segmentisque latioribus, acutis; antheris magnis, c. 3,5 mm longis, mucrone crassiore, c. 0,3 mm, leviter curvato. Holotypus: Sierra Nevada, supra Alquife, in schistosis, 1800 m, leg. Gros, 11-VII-1923 (BC 558). Isotypi: BC 63096 et MA 41902. Tiene, típicamente, antera grande, 3-3,8 mm, y mucrón terminal del mismo grueso, algo curvado y de 0,3 mm o muy poco más. Se observan todos los intermedios hacia la subsp. *valentinum*, de hoja con segmentos más pequeños, blandos, glaucos y de olor a ruda.*

Gran parte de las plantas pubescentes peninsulares, en especial de Sierra Nevada —montes béticos, por su glandulosidad extraordinaria y las hojas grandes agrupadas

bajo la mitad del tallo, deben ser consideradas como formando parte de *Th. foetidum*, especie linneana de amplia dispersión en el Mediterráneo occidental.

Th. flavum L. var. **euskarum** Elias et Pau (ined.) ex P. Monts., var. nov.

A *Th. flavo typico differt cum sit planta valde rhizomatosa, stolonibus subterraneis tenuioribus et valde intricatis, foliis minutissime piloso-glandulosis in pagina inferiore, panicula laxiore et carpellis subglobosis*. Holotypus: Nanclores de Oca, pr. flumen Zadorra (Vi), in hb. Pau (MA 41866).

Frecuente en el valle del Zadorra, entre Zurbano y Miranda de Ebro. Alcanza por lo menos Soncillo (Bu), MAF 47946, y Berdún (Hu), JACA 283283.

Es planta de los carrizales muy húmedos con nivel freático constantemente elevado, florece en julio y fructifica ya en septiembre. Presenta unas estipulillas cortas, de 2 mm, en el raquis foliar; pero son muy caedizas. Su glandulosidad debe observarse con gran aumento.

Th. speciosissimum L. subsp. **albini** (Pau) P. Monts., comb. & stat. nov.

Basión: *Th. albini* Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Catalunya, Ser. Bot. 1(1):17 Lám. I (1922). Lectotypus: Canillas de Albaida (MA), leg. Estremera, 30-VII-1919 (MA 41945).

Planta muy bien caracterizada entre las poblaciones glandulosas de Andalucía. Se distingue por su inflorescencia menos densa, anteras pequeñas (1,5-2 mm) y de mucrón grueso, corto (0,2 mm). Destaca su glandulosidad foliar y la práctica glabrie de la inflorescencia. Es propia de las estribaciones meridionales de Sierra Almijara (Ma). Hay un sintipo, BC 486, y varios ejemplares recolectados por Gros en su localidad «Barranco de las presas, ad rivulos», 6-VII-1926 (BC 108302, SALA 21374).

Th. maritimum Léon Dufour. Planta mal conocida, de la Albufera valenciana y marismas litorales, hasta Castellón por lo menos. Se ha confundido con *Th. morisonii* C. C. Gmel., pero es netamente distinta.

Ya se conocía bien a principios del siglo pasado en el Saler y otras partes de la Albufera en Valencia. Aun así, parece posible su introducción en siglos pasados, seguida de una naturalización perfecta junto a los arrozales, tan antiguos. Según C. Pau (in schedis) es el *Th. lucidum* L. (*Sp. Pl.*: 546, 1763) indicado en España.

Pedro MONTSERRAT, Apartado 64, Jaca (Huesca).

NOVELTIES ON *FUMARIOIDEAE*

The following new names and taxa will appear in the treatment of *Fumarioideae* for *Flora Iberica*. They are hereby validated.

Sarcocapnos baetica (Boiss. & Reuter) Nyman subsp. **integrifolia** (Boiss.) Lidén, stat. nov.

Basion: *Aplectrocapsos integrifolius* Boiss., Diagn. Pl. Or. 3(1):13 (1853).

Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén, comb. nov.

Basion: *Fumaria claviculata* L., Sp. Pl.: 701 (1753).

Ceratocapnos claviculata subsp. **picta** (Sampaio) Lidén, comb. nov.

Basion: *Corydalis claviculata* (L.) DC var. *picta* Sampaio, Bol. Soc. Brot., sér. 2, 10:222 (1935).