

Le MONDE des PLANTES

INTERMÉDIAIRE DES BOTANISTES

FONDÉ EN 1898 PAR H. LÉVEILLÉ

TRÉSORERIE :

C. LEREDDE
C.C.P. 1380-78 Toulouse

REDACTION :

C. LEREDDE, Y. MONANGE, H. POUNT

ADRESSE :

FACULTÉ DES SCIENCES
39, allées J.-Guesde. 31400 Toulouse

CATALOGUE-FLORE DES PYRÉNÉES

Publié sous la direction de H. GAUSSEN (Suite)

Rédigé par H. BOUSQUET et P. LE BRUN

Astragalus tragacantha L. (*A. massiliensis* LAMK.)

W. médit. - Sables et rochers du littoral.

MN

Astragalus narbonensis GOUAN.

Ibéro-languedoc - Rocailles arides, garrigues, calc.

0 à 400 m.

Ca : 1,5,15,16, Au: 3,

Astragalus austriacus L.

Eur. centr. - mér., W. as. - Bois, roc. élevées, surt. calc.

Aa: 3 (BUB.) ; 10 (LATORRE)

Présence dans la chaîne douteuse pour WILLK. et COSTE.

Astragalus baionensis LOIS.

Endém. - Sables du littoral.

OF.

Astragalus Glaux L.

W. médit. - Coteaux secs et arides, préf. calc.

Au: 3.

Astragalus purpureus L.

S. W. médit. - atl. - Coteaux calcaires.

Ca : 3,4,5,7,10, Au: 2 ?,
PO : Aa: 3,6,7,

Astragalus incanus L.

Ibéro-provenç. - S.E. alp. - Lieux secs et arides, surt. calc.

Ca : 3,6,10,11,15,16 Aa: 3,11,
PO : (BENTH.) Na: 1,2,
Au: 2,

Astragalus macrorhizus CAV.

Ibéro-N. afr. - Coteaux secs et arides, argileux ou gypseux.

Ca : 16 (Balaguer).

Oxytropis campestris DC. (*Astragalus campestris* L.)

Oroph. eur. - Pelouses et roc. alp. ; préf. sil. 2000 à 2600 m.

Ca : 3,4,8, HG: 4,5,
PO : 4,5,6,8, Aa: 5,7,
Au: 1,2, HP: 2,3,
Ai : 2,3,5, BP: 2,

var. *alpinus* TEN. Ca : 8 ; *villosum* ROUY. Ca : 4,8 ;
Ai : 2.

Oxytropis Halleri BUNGE (*Astragalus variabilis* ROUY)

Oroph. scat. - centreur. - Pelouses et rocallles, surt. sil. 2000 à 2800 m.

Ca : 4,8, HG: 5,
PO : 4,6, Aa: 1,2,5,9,
Au: 1,3, HP: «Pyr. centr.» G.G.; 3
Ai : 5, BP: 3.

Espèce dont la position systématique demeure à étudier dans les Pyrénées ; souvent confondue avec la suivante.

- var. *Nuriæ* SENN. (= *O. Halleri* var. *ochroleuca* COSTA ?). PO : 6.
- *ochroleuca* COSTA. Ca : 3.
- *sericea* DC. (*O. uralensis* DC.). Ca ; PO : 6 ; Ai : 2.

Oxytropis lazica BOISS. (*O. Foucaudi* GILLOT).
Rocailles et pâturages élevés ; préf. calc.

Ca : 8,	HP : 3,
PO : 6,	BP : 3,4,
Au : 1,	

Position systématique encore mal connue, à étudier.

Oxytropis pyrenaica G.G.

Ibér. - ligure ? — Pelouses et rocailles ; préf. sil. 2000 à 2860 m.	
Ca : 4,8,	Aa: 1,2,5,9,12,
PO : 6 ?, 8?	HP : 2,3,4,5,
Au: 1?	BP : 2,3,
Ai : 2?, 3,4,5,	Na:
HG: 4,5,	

Oxytropis Gaudini BUNGE (*O. Parvopassae* PARL.)
Oroph. alpin. — Roc. et pâtur. des hautes mont. sil.
Ca : 8 (BARNOLA) ?

Présence douteuse dans la dition.

Oxytropis montana DC. (*Astragalus montanus* L.)
Oroph. centreur. — Pâtur. de la zone alp., préf. calc.
Ca : 13 ? HP : 2,4 ?
Au : 2 (de MARTR. BP : 2,
DON.) ?
Ai : 4 ? Présence douteuse pour la
HG: ZETT. en fait syn. dition.
d'*O. pyrenaica*.

Phaca alpina L. (*Astragalus penduliflorus* LAM.)
Oroph. alp. — scand. — Pâturages de l'étage alpin.
PO : 6,8 Aa: 1,
HG: 5, HP : 2,

Phaca australis L. (*Astragalus australis* LAMK.)
Oroph. pyr. - alp. - Karp. — Pelouses et roc., sil.
1800 à 2800 m.
Ca : 8, Aa: 1,7,
PO: 6, HP: 2,
Ai : BP : 2,
HG: 5,7,

Phaca astragalina DC. (*Astragalus alpinus* L.)
Oroph. arct. - altaïco-alpin. — Pelouses et roc. ; préf.
sil. 1800 à 2600 m.

Ca : 8,	HG: 4,5,
PO : 4,6,8,	Aa: 1,
Au: 1,	HP : 2,3,4,
Ai : 2,5,	

Biserrula Pelecinus L.
Circummédit. — Lieux secs et arides ; indif.
PO: ?,

Colutea arborescens L.
Eur. centr. - médit. ; W. as., N. afr. — Bois, coteaux
calc. — Souvent cult. et subspont.
Ca : 3,7,10, HG: 4,
PO: 1,2,4, Aa: 3,6,7,10,
Au: 1,2,3,4, BP : 2,
Ai :

Robinia pseudo-acacia L.
N. amér. — Planté et subspont. dans la zone infér.
PO : cult. BP : cult. et subspont.
HG: cult.

Galega officinalis L.
Eur. centr. — mérid. ; W. as. — Fossés, prés humides ;
subspontané.
Ca : 5, HP: (PHIL.)
PO : 2, BP : 7,
HG: 2,3,4,

Glycyrrhiza glabra L.
S. eur., W.-as., N. afr. — Fossés et prairies. Indif. souv.
cult. et subspont.
Aa: 7,12

Psoralea bituminosa L.
S. eur., W.-as., N. afr. — Lieux secs et arides ; indif.
0 à 600 m.
Ca : 2,3,9, HG: 2,3,
PO : 1,2,4, Aa: 2,3,4,8,
Au: 2,3,4, BP : 7,
Ai : 6, Na: 1,2,4,

var. *littoralis* CONILL. PO : 1 ; *plumosa* REICHB.
PO : 1,2,4.

Vicia peregrina L.
Latémédit. — Moissons ; champs et sabl. arides. Indif.
Ca : 2,4,8,10 Aa: 6,
PO: 1, BP : 7,
Au: 3,4, Na: 4,

Vicia hybrida L.
Latémédit. — Bord des champs, lieux herb. ; indif.
Ca : 9, Au: 2,3,4,
PO : 1,2,3,4, HG: 1,

Vicia vestita BOISS.

Ibéro-W. médit. — Bord des champs et des vignes.
Ca : « Catalogne ! » PO : 1 Cerbère (NEYR.)
(COSTE) RR.

Vicia lutea L.

Eur. centr. - mér., W. as., N. afr. — Moissons, lieux sabl. ; indif. 0 à 1300 m.
Ca : 4, HG : 2,4,5,7,
PO : 1,4,6, Aa :
Au : 3, HP : 1,
Ai : C (M.A.) ; 6, BP : « Moissons » (BL.)

var. *hirta* LOIS. PO : 1,2 ; Au : 2,4 ; HG : 3.

Vicia pyrenaica POURR.

Oroph. ibér. — Pelouses et rocallles ; indif. 500 à 2600 m.
Ca : 4, HP : 2,3,4,5,
PO : 5,6, BP : 2,5,6,7,
Au : Na : 1,
Ai :
Aa : 1,3,

Vicia lathyroides L.

Eur., W.-as., N. afr. — Lieux secs et sablonn. ; indif.
Ca : 8, HP : 5,
PO : 1,2,4, BP : 7,
Au : 3, La : 1,3,
HG : 4,5,

var. *Sorediana* CONILL. PO : 2.

Vicia heterophylla PRESL. (*V. cuneata* G.G.)

Médit. — lieux secs et sabl. de la zone infér. orientale.
Indif.

Ca : 2, PO : 1,4,

var. *linearis* ROUY : Au : 3.

Vicia amphicarpa DORTHES

Circummédit. — Coteaux secs, pierreux ; indif.
PO : 1,2, Au : 3,

Vicia angustifolia REICHARDT.

Eur. ; W. as., N. afr. — Lieux secs et arides ; indif.
0 à 1400 m.

Ca : 8, HG : C. dans les moissons
PO : 1,2, (ZETT.) ; 3,
Au : 2,3,4, Aa :
Ai : 2, HP : 1,4,

var. *Bobartii* FORST. PO : 1,4,
— *roseiflora* ROUY. Au : 3.

— *segetalis* KOCH. PO : 1,2 ; Au : 2 ; Ai : 2 ;
HP : 4 ; BP.
— *uncinata* REICHB. BP : 7 ; La : 1.

Vicia sativa L.

Eur., W. as., N. afr. — Champs et coteaux ; indif. ; souv. cult. et subspont. (0 à 1400 m).

Ca : 8, HG : 2,3,5,
PO : 1,2,3,4,5,6,7,8, HP :
Au : 3,4, BP : C. (BL.)
Ai : 1,6,

var. *macrocarpa* MORIS. PO : 1,2 ; BP.

— *torulosa* JORD. Au : 3.
— *cordata* WULF. PO : 1,2.

Vicia bithynica L.

Latémédit. — Bois et pâtur. ; indif.

Ca : HG : 3,4,
PO : 1,2,3,4,8, HP : 1,
Au : 3, BP : « Ça et là » (BL.), 6.
Ai :

Vicia Faba L.

As. — Fréq^t cult. dans la zone infér. et subspont.

Vicia narbonensis L.

Latémédit. — Bois et buissons ; préf. calc.

Au : 3, Aa : 3,
Ai : 6,

var. *serratifolia* JACQ. Ca : 1 ; PO : 1,2 ; Au : 4.

Vicia sepium L.

Eurosib. — Haies, bois, prairies ; indif. 400 à 1600 m.

Ca : 4,8, HG : 2,3,5,
PO : 1,2,3,4,5,6,7,8, Aa :
Au : 1,2,3,4, HP : 1,2,3,4,
Ai : 1,2, BP : 1,7 (CC., BL.)

var. *montana* KOCH. PO : 1,4,8 ; Au : 2,3 ; HG : 3.

Vicia purpurascens DC.

Eur. centr. - mér., W. as., N. afr. — Moissons et champs, cult.

Ca : 4,5,6,9, PO : 7,

Vicia pannonica CRANTZ

Eur. centr. - mér., W. as., N. afr. — Champs et pâtur. ; indif.

Ca : 4, Au : 3,
PO : 6,

Vicia argentea LAP.

Pyr. - ital. — Rocailles et pâtur. élevés des Pyr. Indif.

2100 m à 2500 m.
Aa: 1, HP: 2,3,

Au: 1,2, HG: 4, La: 1,3,

Vicia Orobus DC.
Oroph. atl. — Prairies et pâture. ; sil. 700 à 2000 m.

Ca: 8,9, HG: 4,5,7,
PO: 4,6, Aa: 7,
Au: 1,2,3, HP: 2,4,
Ai: 2, BP: 2,

Vicia villosa ROTH. (*Cracca villosa* G.G.)
Eur. centr. - mér., W. as., N. afr. — Champs, prés, bois ; indif.
Ca: 1,4, Au: 2,
PO: 1,5,6,7,

Vicia onobrychoides L.
S. eur. — N. afr. — Champs et cot., surt. mont. ; calc. 100 à 1600 m.

Ca: 4,5,8,9, HG: 4,5,
PO: 4,6,7,8, Aa: 3,6,8,10,
Au: 1,2,3,4, HP: 1,3,
Ai: 1, BP: 1,

Vicia pseudo-Cracca BERT. (*Cracca Bertolonii* G.G.)
S. eur., N. afr. — Coteaux calc.
Ca: 3,6, PO: 1,2,

Vicia tenuifolia ROTH (*Cracca tenuifolia* G.G.)
Eur. - W. as., N. afr. — Buissons et pâturages ; indif. 0 à 1600 m.

Ca: Aa:
PO: 1,2,4,6,8, HP: 1,5,
Au: 2,3,4, BP: « AC. » (BL.)
Ai: 1, La: 1,
HG: 4,5,

Vicia monanthos DESF. (*Cracca monanthos* G.G.)
Médit. — Champs, moissons ; sil.
PO: 1,4,8, Au: 3,

Vicia Cracca L.
Euras. — Prairies et champs ; 0 à 1400 m.
Ca: HG: 3,4,5,6,7,
PO: 1,2,3,4,5,6,7,8, HP: 1,2,4,
Au: BP:
Ai: 1,2,

Vicia elegantissima SHUTTL.
Ibér. — Bois et broussailles.
PO: 1,

var. *stenophylla* BOISS. Au: 3.
Vicia imbricata GILIB. (pro sp.). PO: 2 ; Au: 3,4,
— *plumosa* ROUY. MN. ; Au: 2.

Vicia tetrasperma MCENENCH (*Ervum tetraspermum* L.)
Euras. - N. afr. — Champs, lieux sabl. ; indif. 0 à 1000 m.
PO: 2,3, Aa:
Au: 3, HP: 1,4,
Ai: 2, BP: 1,7,
HG: 3,4, La: 3,

var. *eriocarpum* G.G. PO: 1.

Vicia Gerardi ALL. (*Cracca Gerardi* GG.)
S. eur. - W. as. — Prairies, taillis, buissons ; calc.
Ca: HG:
PO: 1,3,4,7, Aa:
Au: 1,2,3, HP: 4,5,
Ai: 2, BP: 2,7,

Vicia gracilis LOIS. (*Ervum gracile* DC.)
Euras., N. afr. — Lieux sabl. ; indif.
Ca: Catalogne Aa:
PO: 1,2,4, HP: 1,
Au: 3,4, BP: 1,7,
Ai: 6, La: 1,3,
HG: 4,

Vicia atropurpurea DESF. (*Cracca atropurpurea* G.G.)
Circummédit. — Champs sablonn. ; indif.
Ca: « Catalogne » Au: 3,4,
(COSTE)
PO: 1,2,3, BP: 7,

Vicia pubescens LINK (*Ervum pubescens* DC.)
Circummédit. — Lieux sabl. ; indif.
Ca: Catalogne Au: 3,
PO: 1, BP:

Vicia varia HOST. (*Cracca varia* G.G.)
Eur. centr. - mérid., W. as., N. afr. — Champs et lieux sablonn. ; indif.
Ca: 1,2,4, HP: CC. (DULAC)
PO: 1,2,4,6,8, BP: 7,

Vicia disperma DC. (*Cracca disperma* G.G.)
S. eur., N. afr. — Champs et bois sabl. ; indif.
Ca: Catalogne Au: 3,
PO: 1,2,4,

Vicia hirsuta KOCH (*Cracca minor* G.G.)
Euras., N. afr. — Lieux secs et sabl. ; indif. 0 à 1050 m.
Ca: 8, HG: 2,3,4,5,
PO: 1,2,3, HP: 1,4,

Au: 1,2,3,4, BP: 7,
 Ai: 2,

Vicia ervilia WILLD.

Eur. centr. - mér., W. as., N. afr. — Cult. et subsp. dans la zone inférieure — Moissons et champs ; indif.
 PO: cult. et subsp. HG: 7,
 Au: 3, BP: 7,

Vicia lens (L.) Coss. et GERM. (*Lens esculenta* MÖENCH ; *L. culinaris* MEDIK.)

Cult. et subsp. dans la zone infér. ; indif.
 PO: souv. cult. et subsp. HG: 4,6,7,
 Au: HP:
 Ai: 1 (cult.) BP: cult. et subsp.

Vicia nigricans COSS. et GERM. (*Lens nigricans* GODR.)

S. eur., W. as., N. afr. — Lieux secs et rocheux ; indif.
 Ca: Catalogne PO: 4,

Cicer arietinum L.

E. médit. — Cult. et subspont. dans la zone inf.
 PO: 2 (subsp.) HG: 4 (subspont.)

Pisum arvense L.

Moissons et champs cult. ; souv. subspont.
 Ca: 3, subsp. HP:
 PO: 2, » BP: 6,7, subsp.
 Ai: 1, » La: 1,
 HG: 2,4,7, subsp.

Pisum elatius STEV.

S. eur., W. as., N. afr. — Bois et buiss. de la zone infér. ; indif.
 Ca: « Catalogne » Au: 2,3,
 (COSTA)
 PO: 1,

Lathyrus Aphaca L.

Eur. - W. as. — Moissons et lieux sabl. ; préf. calc.
 0 à 1250 m.
 Ca: 8, HG: 1,2,3,4,5,
 PO: 1,2,3,4, Aa:
 Au: 1,2,3,4, HP: 1,2,5,
 Ai: 1,2,3,4,5,6, BP: 1,2,3,4,5,6,7,

Lathyrus Nissolia L.

S. - centreur., W. as., N. afr. — Bois, prés, moissons ; indif.
 Ca: 4, HP: 1,
 PO: 2,4, BP: 1,
 HG: 2,4, La: 1,

Lathyrus Ochrus DC.

Circummédit. — Bord des champs ; indif.
 PO: 1,2, HG: 2,
 Au: 3,

Lathyrus Clymenum L.

Circummédit. — Coteaux boisés.
 PO: 1,2,3, BP: 7,
 Au: 3,

ssp. *articulatus* L. (prosp.). PO: 1,2 ; Au : 3 ; BP : 7.
 var. *tenuifolius* DESF. PO : 1.

Lathyrus annuus L.

Circummédit. — Lieux secs et arides ; indif.
 PO: 2,3, HG: 2,
 Au: 2,3,

Lathyrus hirsutus L.

Eur. centr. - mér. W. as., N. afr. Moissons et lieux sabl. ; indif.
 Ca: 4, HP: 1,
 Au: 3, BP: 6,7,
 Ai: 2, La: 1,
 Hg: 3,4,

Lathyrus Cicera L.

Eur. centr.-mér., W. as., N. afr. Cot. arides calc.,
 souv. cult.
 Ca: « Catalogne » HG:
 (COSTA) Aa: 10,
 PO: 2,3,4, La: 3,
 Au: 3,4,
 Ai: 6,

Lathyrus sativus L.

Cult. et subspont. Indif.
 PO: cult. et subspont. BP: cult et subspont.
 Au: 3,4, subspont.

Lathyrus sphæricus RETZ.

Eur. centr.-occid., N. afr. Champs et lieux sabl.,
 indif. 0 à 800 m.
 Ca: 2, Ai: 2,
 Po: 1,2, HG: 3,4,5,7,
 Au: 2,3,4, BP:

Lathyrus angulatus L.

Eur. mér. - Champs et lieux sabl. ; indif. 0 à 1200 m.
 Ca: 2,4,8, HG: 4 (LAP. ; à vérif.)
 Au: 3, BP: 7,
 Ai: La: 1,3,

Lathyrus setifolius L.

S. eur., W. as. - Buissons et roc. calc.

Ca : Aa: 8,
PO: 1, Na: 4,
Au: 3,

var. *Gouani* ROUY. Au : 3,

Lathyrus ciliatus GUSS. (*Orobus saxatilis* VENT.)

S. eur. - Coteaux calcaires.

Ca : «Catalogne»
(COSTE) 8, Au: 3,
Po: 2,

Lathyrus pratensis L.

Eur., W.-as., N. et E. afr. - Prairies, haies, bois ; indif.
0 à 1500 m.

Ca: 8, Aa:
Au: 1,2,4, HP: 1,2,4
Ai: 1,2, BP: 1,2,3,4,5,6,7,8,
HG: 2,3,4,5,

var. *velutinus* DC. Po : 1,4 ; Au : 4.

Lathyrus luteus PETERM. (*Orobus luteus* L.)

Oroph. eur. - W. as. - Bois et pâtur. 800 à 1800 m.

Ca: 8,9,12, HG: 2,3,4,5,
Au: 1,2,3, HP: 2,4,
Po: 6,7, BP: 5,6,7,
Au: 1,2,3, Va: 3,
Ai: 1,2,6,

ssp. *Tournefortii* ROUY HP : 1,2.

Lathyrus albus KITT. (*L. asphodeloides* G.G.; *Orobus albus* L. f.)

Eur. centr. mer., W. as. - Prairies humides calcaires ou argil.
Po: 4,

Lathyrus canescens G.G. (*L. filiformis* J. GAY; *Orobus canescens* L. f.)

S. eur., W. as. - Prés et roc. calc., surt. et mont.

Ca: 6, Aa: 1,2,3,
Po: 2,4, HP: 1,
Au: 2,3, BP: 2,3,6,
Ai: ? Na: 1,4,
HG: 4,5,6,

Lathyrus macrorrhizus WIMM. (*Orobus tuberosus* L.)

Eur. - Bois et pâtur., surt. sil. j.q. 2050 m.

Ca: 8, HG: 2,3,4,5,6,7,
Po: 1,3,4,8, Aa:
Au: 2, HP: 1,2,
Ai: 1,2,6, BP: 1,2,3,4,5,6,7,8,

var. *pyrenaicus* DC. Ca : 8; PO: 1; Au: 1,2; Ai: 3;
HG : 3; BP.

var. *tenuifolius* ROTH. Na : 1.

Lathyrus niger BERNH. (*Orobus niger* L.)
Eur. - Bois et pâtur. ; préf. calc. - 0 à 1400 m.
Ca: 2, HG: 3,4,5,7,
Po: 1,4,8, HP: 1,
Au: 1,2,3, BP: 1,7,
Ai: La: 1,

Lathyrus vernus BERNH. (*Orobus vernus* L.)
Eur. - Bois, surt. mont. ; préf. calc.
Ca: 5,8, HP: 1,2,4,
Po: 4,6, BP: 1,6,
Au: 3, La: 3,
HG: 4 (LAP.) ? Na: 3,

Lathyrus tuberosus L.

Euras. - Moissons et champs, surt. de la zone inf.

espagnole.
Ca: 3,4,7,8, HP: C.C. (DULAC), 4,
Au: 2,3, BP: 7,
Ai: 3, La: 1,
Aa: 7,8,12, Na: 2,4,

Lathyrus maritimus BIG.

Haloph. circumbor. - Graviers et galets du litt.

OE : Environs de St-Sébastien (LAG.). Indication à confirmer.

Lathyrus palustris L.

Circumbor. - Prés maréc. ; phragmitaies.

BP : 7 (La Négresse ; BL., ANC.).

Lathyrus cirrosus SER.

Céven. - B.-Pyr. - Bois et cot. sil. ; 400 à 1700 m.

Ca: 3,4,7, Au: 1,2,
Po: 3,4,5,

Lathyrus silvestris L.

Eur. - Bois et cot. ; indif. 400 à 2000 m.

Ca: 8, HG: 4,5,
Po: 1,3,6, HP: 1,3,4,5,
Au: 2, BP: 1,2,6,7,
Ai: 2,

var. *latifolius* PETERM. Po : 1 ; BP : 7.
pyrenaicus JORD. La : 4 ; PO : 4 ; Au : 2.

Lathyrus latifolius L.

S. W. eur. - Bois et cot. ; indif. 0 à 900 m.

Ca: 2,5,8, Aa: 8,
Po: 1,2,3, HP: 1,
Au: 1,2,3,4, BP: 7,
Ai: 2,6, Na: 4,
HG: 3,

var. *angustifolius* BL. BP : 7.
ensifolius BADARRO (prosp) PO : 1 ; Au : 2,3,4.

Lathyrus ensifolius (LAP.) J. GAY

HG : 4 (v. d'Aran ; LAP.) ; 5 Medassoles (LAP.). Espèce à rechercher.

Scorpiurus subvillosus L.

Circummédit. - Champs et coteaux ; indif.
 Ca : 2, BP : 7 (importé ; ANC.)
 PO : 1,2,3,4, La :
 Au : 3,4, Na : 4,

Scorpiurus vermiculatus L.

Médit. - Champs.
 PO : 2, (Perpignan, G.G.) (non retrouvé d'après GAUT.)

Coronilla varia L.

Euras. - Bois et coteaux calcaires.
 Ca : 3,6,7,8,10, HP : 1,
 Au : 3, BP : 3,
 Ai : 6, La : 1,3,
 HG : 2,4, Répart. encore insuff. connue.
 var. *pyrenaica* ROUY. Ai : 6.

Coronilla scorpioides KOCH

S. eur., W. as., N. afr. Champs sablonn. ; indif. 0 à 1300 m.
 Ca : 7, HG:
 PO : 1,3,4, Aa : 3,10,
 Au : 2,3,4, HP : 2,5,
 Ai : 1,2,6, BP : 7,

Coronilla coronata L. (*C. montana* JACQ.)

Eur. centr. - mér., W. as. Bois et cot. calcaires.
 Ca : 5,6,16 (COSTA)
 Présence très dout. dans la dition ; à vérif.

Coronilla minima L.

Eur. centr. - mér., N. afr. - Coteaux et rochers calc.
 0 à 1860 m.
 Ca : C., 8, HG : 5,6,
 Au : 1,2,3,4, Aa : 1,5,6,8,
 Ai : 1,2,3,
 var. *extensa* ROUY : Au : 2 ; *lotoides* KOCH : PO : 2,3,4,5 ; Au : 2,3 ; Ai : 2.

Coronilla Emerus L.

Eur. centr. mér. - Bois et rochers ; préf. calc. 0 à 1470 m.
 Ca : 8, Aa : 1,2,5,6,7,10,
 PO : 1,3,4,5,8, HP : 2,5,
 Au : 1,2,3,4, BP : 2,
 Ai : 1,2,3,4,6, Na : 3,
 HG : 2,3,4,6,7,

Coronilla glauca L.

Circummédit. - Rochers et rocallies calc.
 Ca : 2, 14,15,16 ? (G) Au : 2,3,
 PO : 4, Aa : 11 ? (G), 12,

Hippocratea prostrata BOISS.

Ibér. - Montagnes rocallieuses.
 Aa : 7 (Panticosa ; RODR.) BP : 6 (RICHT.)
 Espece prob^t méconnue, à aire sans doute plus vaste.

Hippocratea scabra DC.

Ibér. - Lieux rocallieux.
 Ca : 2 (Olot ; VAYR.). A rechercher.

Hedysarum obscurum L.

Oroph. arct.-alpin. - Pâtur. et roc. des hautes mont. ; indif.
 Aa : « Aragon » (herb. BOUTIGNY, sec. WILLK. et LGE).
 1 « Bacibé » (LAP.) ? ; 4 « p. de Plan » (LAP.) ?
 Na : « Mts d'Avila » (QUER.) ?
 Présence douteuse pour les Pyrénées.

Hedysarum humile L.

W. médit. - Coteaux secs et arides ; indif.
 Ca : 16, Aa : 8,11,12 ?
 Au : 3, Na : 2,

Hedysarum spinosissimum L.

Circummédit. - Garrigues et lieux arides ; indif.
 Ca : 14, Au : 3,
 PO : 1,2,

Onobrychis caput galli LAMK.

Circummédit. - Lieux secs et arides ; indif.
 PO : 2, Au : 3,4,

Onobrychis saxatilis LAMK. (incl. *O. pyrenaica* SEN.)

Ibéro - N. ital. - Coteaux calc.
 Ca : 5,6,7,8,9,10, HG : 4,
 Po : 4, Aa : 1? , 3,8,12,
 Au : 2,3,

Onobrychis supina DC. (incl. var. *intermedia* LEC. et LAMT. et *O. Senneni* SIRVAE)

Ibéro ital. - Pelouses rocallieuses calcaires.
 Ca : 4,5,6,7? , 8, Aa : 1,5,
 Po : 2,3,4,6,7, BP : 2,
 Au : 3,4,

Onobrychis sativa LAMK.

Pelouses rocallieuses calc. Cult. part. et subspont.
 Po : souv. subsp. (GAUT.) BP :
 Ai : 6,

var. *collina* SAINT-LAGER. Po : 2,3,4 ; Au : 2,3,
pyrenaica SENN. Ca : 5.
montana G.G. Ca : 8,9,10 ; Au : 1,2 ; Ai :
 HG ; Aa : 5,6,7,10 ; HP : 4,5 ; BP : 2,4,5.

PUNICAEAE

Punica Granatum L.

W. as. ; méd.-eur. et afr. (nat.) - Haies.
 Ca : 2,6,14 (nat.) HG : 2 (nat.)
 PO : 1,2,3,4 (nat.)

MYRTACEAE

Myrtus communis L.

Circummédit. - Bois, rochers, maquis ; préf. sil.
 Ca : PO : 1,2,

OENOTHERACEAE

Epilobium spicatum L.

Euras., N. am. - Bois et ravins, surt. mont. 800 à 2300 m.
 Ca : 8, HG : 3,4,5,7,
 PO : 3,4,5,6,7,8, Aa : 4,
 Au : 1,2, HP : 4,
 Ai : 2,5, BP : 2,

Epilobium rosmarinifolium HAENKE

Oroph. centreur. - caucas. - Alluvions, bord des torrents, glaciers.
 «Pyrénées» (GMEL. et RCHB.). Douteux pour COSTE.

Epilobium hirsutum L.

Euras., N. afr. et am. - Lieux hum. 0 à 1500 m.
 Ca : 4,7,8, HG : 2,4,
 PO : 1,3,4,7, HP :
 Au : 1,3,4, BP : 7,
 Ai : 2,

E. hirsutum x parviflorum = *E. sericeum* SCHUMACH. Ca : 4 ; BP : 2.

Epilobium parviflorum SCHREB.

Eur., W. as., N. afr. et am. - Ruiss., fossés, lieux hum. préf. calc. 0 à 1500 m.
 Ca : HG : 2,3,4,5,6,
 PO : 1,2,3,4,5,6, HP :
 Au : 1,2,3,4, BP : C (BL.)
 Ai : 1,2,3,4,

E. parviflorum x roseum = *E. persicinum* REICHB.
 Ca : 4 ; PO : 4.

Epilobium Duriæi GAY.

Oroph. s.w. eur. - Bois des mont. sil. 700 à 2500 m.

Ca : 2,4,	Aa : 1,5,
PO : 5,	HP : 3,4,
Au:	BP : 5,6,
Ai : 2,	Na : 3,
HG : 4,5,	

E. Duriæi x palustre = *XE. udicolum* HAUSSK. HG : 5.

E. Duriæi x montanum = *XE. intersitum* HAUSSKN. HI : 3.

Epilobium montanum L.

Euras. - Bois et lieux frais ; préf. sil. 0 à 1800 m.
 Ca : 8, Aa :
 PO : 8, HP : 3,4,
 Au : 1,2,3, BP : 1,7,
 Ai : 2, Na : 3,
 HG : 2,5,

E. montanum x obscurum = *XE. aggregatum* CELAK.
 Ai : 2.

Epilobium collinum GMEL.

Eur. - Rochers, murs, rocallies ; sil. 400 à 2000 m.
 Ca : 4, HG : 3,4,
 PO : 7,8, Aa :
 Au : 1,2,3,4, HP : 3,4,
 Ai : 2, BP : 2,3,

Epilobium lanceolatum SEB. et MAUR.

W. et S. eur. ; W. as. ; N. afr. - Bois, talus, haies ; sil. 500 à 2000 m.
 Ca : 2,8, Aa :
 PO : 1,2,3,4,5, HP :
 Au : 2,3, BP : 6,7,
 Ai : 2, La : 1,
 HG :

Epilobium roseum SCHREB.

Eur., W. as. - Lieux humides. 0 à 1800 m.
 Ca : 3,4, HG : 4,5,
 PO : 4,5, Aa : 7,
 Au : 2, HP : 2,4,
 Ai : 2, BP : 7,

Epilobium trigonum SCHRANK.

Oroph. euras. - Pelouses roc. hum. subalp.
 Ca : 4, HG : 5,
 PO : Aa : 1,
 Au : HP : 1,2,3,
 Ai :

ABONNEMENT

UN AN :

Normal	15,00 F
De soutien	20,00 F
Etranger	20,00 F

C. Postal : LEREDDE, 1380-78 Toulouse

LES ABONNEMENTS PARTENT DU 1^{er} JANVIER
 Le Gérant : Cl. Leredde.